

採用区分	採用医薬品名
院外	アーリーダ錠60mg
用時	アイクルシグ錠15mg
用時	アイセントレス錠400mg
院外	アイドロイチン3%点眼液
院外	アイピーディカプセル100
院外	アイピーディドライシロップ5%
院外	アイペータ配合点眼液<製造番号 A012 A013以降>
院外	アイミクス配合錠HD
院外	アイミクス配合錠LD
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液
採用	亜鉛華軟膏「ニッコー」
院外	アカルボース錠100mg「サワイ」
院外	アキネトン錠1mg
院外	アクアチムローション1%
用時	アクトシン軟膏3%
用時	アグリリンカプセル0.5mg
院外	アコファイド錠100mg
採用	アサコール錠400mg
採用	アシクロビル眼軟膏3%「ニッター」
採用	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」
院外	アシノン錠150mg
院外	アジマイシン点眼液1%<製造番号 R008以降>
採用	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」
院外	アジルバ錠10mg
採用	アジレクト錠1mg
院外	アスタット軟膏1%
採用	アズノールうがい液4%
採用	アズノール軟膏0.033%
採用	アスパラカリウム錠300mg
院外	アスパラ-CA錠200
採用	アスピリン「ホエイ」
採用	アスベリン散10%
採用	アスベリン錠10
採用	アスベリンシロップ0.5%
院外	アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入
採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
用時	アセチルスピラマイシン錠200
採用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」
採用	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」
採用	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」
採用	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」
用時	アゼプチン錠1mg
採用	アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」
採用	アゾセミド錠60mg「JG」
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液
院外	アダブチノール錠5mg
院外	アダラートCR錠10mg
院外	アタラックス-Pドライシロップ2.5%
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量

採用区分	採用医薬品名
採用	アテノロール錠25mg「日新」
採用	アデホスコーク顆粒10%
院外	アデホスコーク腸溶錠20
用時	アデムバス錠0.5mg
用時	アデムバス錠1.0mg
院外	アテレック錠5
院外	アドエア100ディスクス60吸入用
院外	アドエア250エアゾール120吸入用
院外	アドエア250ディスクス60吸入用
院外	アドエア500ディスクス60吸入用
院外	アドエア50エアゾール120吸入用
院外	アトーゼット配合錠HD
院外	アトーゼット配合錠LD
採用	アドソルビン原末
院外	アドフィードパップ40mg
採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
採用	日点アトロピン点眼液1%
院外	アナストロゾール錠1mg「トーワ」
院外	アナフラニール錠10mg
採用	アナフラニール錠25mg
院外	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用
院外	アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用
院外	アノーロエリプタ30吸入用
院外	アフィニトール錠5mg
用時	アブストラル舌下錠100 μ g
用時	アブストラル舌下錠200 μ g
用時	アブストラル舌下錠400 μ g
採用	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
採用	アプレゾリン錠10mg
採用	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」
採用	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」
用時	アポハイドローション20%
採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
採用	アミティーザカプセル12 μ g
採用	アミティーザカプセル24 μ g
院外	アミノレバンEN配合散
院外	アミュー配合顆粒
用時	アムノレイク錠2mg
採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」
採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」
採用	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」
院外	アメナリーフ錠200mg
採用	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」
採用	アモキシシリン細粒20%「TCK」
用時	アラグリオ顆粒剤分包1.5g
院外	アラバ錠10mg
用時	アリケイス吸入液590mg
院外	アリドネパッチ27.5mg
採用	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」

採用区分	採用医薬品名
用時	アルギU配合顆粒
用時	アルケラン錠2mg
院外	アルサルミン内用液10%
採用	アルスロマチック関節手術用灌流液
採用	アルダクトンA細粒10%
採用	アルト原末(1g)
院外	アルドメット錠125
採用	アルドメット錠250
採用	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」
採用	アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」
採用	アルファロール内用液0.5 μ g/mL
採用	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」
院外	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%
院外	アルメタ軟膏
採用	アルロイドG内用液5%
院外	アレギサル点眼液0.1%
院外	アレグラ錠30mg
院外	アレサガテープ4mg
院外	アレジオンLX点眼液0.1%
用時	アレジオンドライシロップ1%
用時	アレセンサカプセル150mg
採用	アレビアチン散10%
採用	アレビアチン錠100mg
採用	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」
院外	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」
採用	アローゼン顆粒
院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
採用	アロプリノール錠100mg「アメル」
採用	アロプリノール錠50mg「アメル」
院外	アロマシン錠25mg
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)
採用	アンテベート軟膏0.05%
採用	アンテベートローション0.05%
採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」
採用	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」
採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」
用時	アンベック坐剤10mg
用時	アンベック坐剤20mg
院外	EPLカプセル250mg
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
採用	イグザレルトOD錠10mg
採用	イグザレルトOD錠15mg
院外	イクスタンジ錠40mg
院外	イクスタンジ錠80mg
院外	イグラチモド錠25mg「サワイ」
採用	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」
採用	イスコチン錠100mg
採用	イスツリサ錠1mg

採用区分	採用医薬品名
院外	イソジンゲル10%
採用	イソジンシュガーバスタ軟膏
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」
採用	イソバイドシロップ70%分包30mL
院外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
院外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」
採用	イトラコナゾール錠50mg「日医工」
採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」
採用	イナビル吸入粉末剤20mg
院外	イニシク配合錠
院外	イノラス配合経腸用液
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg
院外	イフェクサーSRカプセル75mg
院外	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」
院外	イブランス錠125mg
院外	イブランス錠25mg
用時	イマチニブ錠100mg「サワイ」
院外	イミグラン点鼻液20
院外	イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」
採用	イムノブラダー膀胱注用80mg
用時	イムブルピカカプセル140mg
採用	イムラン錠50mg
院外	イリボー錠2.5 μ g
院外	イリボー錠5 μ g
採用	イルベサルタン錠100mg「トーワ」
採用	イルベサルタン錠50mg「トーワ」
院外	インヴェガ錠3mg
院外	インヴェガ錠6mg
採用	インクレミンシロップ5%
院外	インチュニブ錠1mg
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)
院外	インテバンクリーム1%
院外	インテバン坐剤25
採用	インデラル錠10mg
院外	インフリーSカプセル200mg
用時	インライタ錠5mg
院外	ヴォトリエント錠200mg
院外	ヴォリプリス錠2.5mg
用時	ウブレチド点眼液1%
院外	ウラリット配合錠
院外	ウリアデック錠40mg
採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」
採用	ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」
採用	ウルティプロ吸入用カプセル
院外	ウロカルン錠225mg
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)
院外	エイベリス点眼液0.002%
院外	エースコール錠2mg
院外	エカード配合錠LD

採用区分	採用医薬品名
院外	エキザルベ
院外	エクア錠50mg
院外	エクフィナ錠50mg
院外	エクメット 配合錠HD
院外	エクメット 配合錠LD
院外	エクラープラスター20 μ g/cm ²
院外	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用
院外	エクロックゲル5%
採用	エコリシン眼軟膏
採用	エサンブトール錠250mg
院外	S・M配合散
採用	エスクレ坐剤「250」
院外	エスクレ注腸用キット「500」
採用	SG配合顆粒
採用	エシタロプラムOD錠10mg「トーワ」
院外	エズピクロン錠1mg「DSEP」
院外	エズピクロン錠3mg「DSEP」
院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」
院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」
用時	エストラーナテープ0.09mg(使用期限 2024年3月以降)
用時	エストラーナテープ0.18mg(使用期限 2024年9月以降)
用時	エストラーナテープ0.36mg(使用期限 2024年9月以降)
院外	エストラーナテープ0.72mg
院外	エストラサイトカプセル156.7mg
採用	SPトローチ0.25mg「明治」
採用	エスワнтаイホウ配合OD錠T20
採用	エスワнтаイホウ配合OD錠T25
採用	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」
採用	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」
採用	消毒用エタノール液IP
採用	エチゾラム錠0.5mg「アメル」
院外	エチゾラム錠1mg「アメル」
院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
用時	エドルミズ錠50mg
用時	エナジア吸入用カプセル高用量
用時	エナジア吸入用カプセル中用量
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」
院外	エナロイ錠2mg
採用	エネーボ配合経腸用液
採用	エネマスター注腸散
用時	エバスチンOD錠10mg「NP」
用時	エバスチンOD錠5mg「NP」
採用	エパルレスタット錠50mg「JG」
採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
採用	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」
院外	エビリファイOD錠3mg
院外	エビリファイ錠1mg
院外	エピレオプチマル散50%
採用	エフィエントOD錠20mg
採用	エフィエント錠3.75mg

採用区分	採用医薬品名
用時	エプクルーサ配合錠
採用	エフピーOD錠2.5
採用	エブランチルカプセル15mg
採用	エプレレノン錠25mg「杏林」
採用	エベレンゾ錠100mg
採用	エベレンゾ錠20mg
採用	エベレンゾ錠50mg
採用	MS温シップ「タイハウ」
採用	MS冷シップ「タイハウ」
採用	エムラクリーム
採用	エリキユース錠2.5mg
院外	エリキユース錠5mg
院外	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用
採用	エリスロシン錠200mg
採用	エリスロシンドライシロップW20%
採用	エルカルチンFF錠100mg
院外	エルカルチンFF錠250mg
採用	エルサメットS配合錠
採用	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」
用時	エルロチニブ錠100mg「NK」
用時	エルロチニブ錠150mg「NK」
院外	エルロチニブ錠25mg「NK」
採用	エレンタール配合内用剤
採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤
採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」
院外	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
採用	エンシュア・H
院外	エンシュア・リキッド
採用	エンタカポン錠100mg「トーワ」
採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」
用時	エンドキサン錠50mg
採用	エンレスト錠100mg
院外	エンレスト錠200mg
院外	エンレスト錠50mg
院外	オイラックスHクリーム
採用	オイラックスクリーム10%
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
院外	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入
採用	オーグメンチン配合錠250RS
用時	オキサトミド錠30mg「CH」
院外	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」
院外	オキサロールローション25 μ g/g
採用	オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」
用時	オキシコンチンTR錠10mg
用時	オキシコンチンTR錠5mg
採用	オキノーム散10mg
採用	オキノーム散2.5mg

採用区分	採用医薬品名
採用	オキノーム散5mg
院外	オスポロット錠50mg
採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」
院外	オダイン錠125mg
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
院外	オテズラ錠10mg
院外	オテズラ錠20mg
院外	オテズラ錠30mg
院外	オドリック錠1mg
用時	オフエブカプセル100mg
用時	オフエブカプセル150mg
用時	オプスミット錠10mg
採用	オプソ内服液10mg
用時	オプソ内服液5mg
採用	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッター」
採用	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」
採用	オベプリム
採用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」
院外	オメプラール錠20
採用	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション25mL
院外	オラペネム小児用細粒10%
採用	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」
採用	オランザピンOD錠5mg「トーワ」
採用	オリブ油「ヨシダ」
採用	オルケディア錠1mg
院外	オルケディア錠2mg
院外	オルケディア錠4mg
用時	オルセノン軟膏0.25%
院外	オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用
採用	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用
院外	オルミエント錠2mg
院外	オルミエント錠4mg
採用	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」
採用	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」
採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「JG」
採用	オロパタジン点眼液0.1%「杏林」
採用	オンジェンティス錠25mg
用時	オンプレス吸入用カプセル150 μ g
採用	ガスコン錠40mg
採用	ガスコンドロップ内用液2%
院外	ガストローム顆粒66.7%
採用	ガストログラフィン経口・注腸用
用時	カタプレス錠75 μ g
採用	ガチフロ点眼液0.3%
採用	クラシエ葛根湯エキス細粒
院外	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒
採用	カデックス軟膏0.9%
院外	カデュエット配合錠4番
院外	カナグル錠100mg
用時	カナマイシンカプセル250mg「明治」

採用区分	採用医薬品名
院外	カナリア配合錠
採用	ガバペン錠200mg
用時	ガバペン錠400mg
採用	【院内製剤】カプト点眼 2mL
採用	カプトリル錠25mg
採用	カペシタビン錠300mg「サワイ」
採用	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」
採用	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」
用時	カボメティクス錠20mg
用時	カボメティクス錠60mg
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
採用	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」
採用	カリメート経口液20%
院外	カリメートドライシロップ92.59%
用時	カルケンスカプセル100mg
院外	カルスロット錠20
院外	カルチコール末
採用	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
採用	カルナクリン錠50
採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」
院外	カルビスケン錠5mg
採用	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」
採用	カルベジロール錠10mg「トーワ」
採用	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」
採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」
院外	カルボシステインシロップ5%「JG」
採用	カルボシステインDS50%「タカタ」
用時	カログラ錠120mg
採用	カロナール細粒20%
採用	カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」
採用	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」
採用	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)
採用	キシロカイン液「4%」
採用	キシロカインゼリー2%
採用	【院内製剤】4%キシロカイン点眼 5mL
採用	キシロカインビスカス2%
採用	キシロカインポンプスプレー8%
採用	逆性石ケン液10「ヨシダ」
採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」
院外	キューバール100エアゾール
採用	希ヨードチンキ「ニッコー」

採用区分	採用医薬品名
採用	キンダベート軟膏0.05%
院外	ゲーフィス錠5mg
採用	クエチアピン錠100mg「FFP」
採用	クエチアピン錠25mg「FFP」
採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
院外	グラアルファ配合点眼液
院外	グラクティブ錠25mg
採用	グラクティブ錠50mg
用時	グラセプターカプセル0.5mg
用時	グラセプターカプセル1mg
院外	グラナテック点眼液0.4%
採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ
院外	クラビット点眼液0.5%
院外	グラマリール細粒10%
採用	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
院外	クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」
採用	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」
院外	グランダキシン錠50
院外	クリアナール錠200mg
採用	グリクラジド錠40mg「トーワ」
採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL
採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL
採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL
採用	グリセリン「ニッコー」
採用	グリセリン「ヨシダ」
採用	グリチロン配合錠
採用	クリプトン(81mKr)ジェネレータ
院外	グリメサゾン軟膏
採用	グリメピリド錠0.5mg「NP」
採用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」
採用	グルコンサンK細粒4mEq/g
院外	グルベス配合錠
院外	グレースビット細粒10%
用時	クレセンバカプセル100mg
採用	クレナフィン爪外用液10%
院外	クレメジン速崩錠500mg
採用	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」
採用	クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
院外	クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」
採用	クロマイ腔錠100mg
院外	クロミッド錠50mg
採用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
院外	クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)
院外	ケイキサレートドライシロップ76%
院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
採用	ケイツーシロップ0.2%

採用区分	採用医薬品名
院外	K.C.L.エリキシル(10W/V%)
採用	ゲーベッククリーム1%
院外	ケタスカプセル10mg
院外	ケタス点眼液0.01%
採用	ケトコナゾールクリーム2%「JG」
採用	ケトコナゾールローション2%「JG」
院外	ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」
院外	ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」
採用	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」
用時	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」
採用	ケフラール細粒小児用100mg
採用	ケレンディア錠10mg
採用	ケレンディア錠20mg
採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
採用	コートリル錠10mg
院外	コールタイジン点鼻液
採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)
採用	コスパノンカプセル40mg
採用	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」
院外	コムクロシャンプー0.05%
用時	コムレクス耳科用液1.5%
院外	コメリアンコーワ錠100
用時	コララン錠2.5mg
院外	コランチル配合顆粒
採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
院外	コレクチム軟膏0.25%
院外	コレクチム軟膏0.5%
用時	コレチメント錠9mg
院外	コレバインミニ83%
用時	コロフオート内用懸濁液25%
院外	コンサータ錠18mg
院外	コントミン糖衣錠12.5mg
院外	コントミン糖衣錠25mg
院外	コンブラビン配合錠
用時	ザーコリカプセル200mg
用時	ザーコリカプセル250mg
院外	ザーネ軟膏0.5%
採用	サーファクテン気管注入用120mg
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)
院外	ザイティガ錠250mg
院外	ザイティガ錠500mg
院外	サイトテック錠200
採用	サイプレジン1%点眼液
院外	クラシエ柴朴湯エキス細粒
採用	クラシエ柴苓湯エキス細粒
院外	サイレース錠2mg
採用	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」
院外	ザクラス配合錠HD

採用区分	採用医薬品名
院外	ザクラス配合錠LD
院外	ザジテン点鼻液0.05%
用時	サデルガカプセル100mg
院外	サノレックス錠0.5mg
用時	サムスカOD錠15mg
院外	サムスカOD錠30mg
用時	サムスカOD錠7.5mg
用時	サムチレール内用懸濁液15%
院外	ザラカム配合点眼液
採用	サラザック配合顆粒
院外	サラジェン錠5mg
採用	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg 「NIG」
院外	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg 「NIG」
院外	サラゾピリン坐剤500mg
採用	サラゾピリン錠500mg
採用	サリグレンカプセル30mg
院外	サリベートエアゾール
院外	サルコートカプセル外用50 μ g
採用	サルタノールインヘラー100 μ g
採用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg 「トーワ」
採用	サレドカプセル100
院外	酸化マグネシウム錠250mg 「ヨシダ」
採用	酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシダ」
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)
採用	サンドールP点眼液
採用	【院内製剤】3%酢酸液 500mL
院外	サンピロ点眼液0.5%
院外	サンピロ点眼液1%
採用	サンピロ点眼液2%
採用	ジアゼパム錠2mg 「アメル」
採用	ジアゼパム錠5mg 「アメル」
採用	シアノコバラミン点眼液0.02% 「センジュ」
院外	シアリス錠5mg
採用	シーブリ吸入用カプセル50 μ g
用時	ツムラ紫雲膏
院外	ジェニナック錠200mg
採用	ジェノゲスト錠1mg 「モチダ」
院外	ジェミーナ配合錠
採用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5% 「CEO」
用時	ジオトリフ錠20mg
用時	ジオトリフ錠30mg
用時	ジカディア錠150mg
院外	ジクアスLX点眼液3%
院外	ジクアス点眼液3%
用時	ジクトルテープ75mg
用時	シクレスト舌下錠5mg
採用	シクロスポリンカプセル10mg 「サンド」
採用	シクロスポリンカプセル25mg 「サンド」
院外	シクロスポリンカプセル50mg 「サンド」
採用	ジクロフェナクNa錠25mg 「トーワ」
採用	ジクロフェナクNa点眼液0.1% 「ニッター」

採用区分	採用医薬品名
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
院外	ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」
用時	【院内製剤】【5倍】希釈自己血清点眼 5mL
用時	【院内製剤】【10倍】希釈自己血清点眼 5mL
院外	ジゴシン散0.1%
採用	ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」
採用	ジスロマック細粒小児用10%
用時	ジスロマック錠600mg
用時	ジセラカ錠100mg
採用	ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」
用時	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
用時	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
採用	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」
採用	シナール配合顆粒
採用	シナール配合錠
用時	シプロキサシン錠200mg
採用	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」
院外	シムビコートタービュヘイラー60吸入
用時	シメチジン細粒20%「ツルハラ」
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
用時	ジャカビ錠5mg
採用	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒
採用	ジャディアンス錠10mg
院外	ジャディアンス錠25mg
用時	臭化カリウム「ヤマゼン」
採用	重カマ「ヨシダ」
採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)
院外	ジュリナ錠0.5mg
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)
採用	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」
採用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
採用	【院内製剤】10%硝酸銀液 10mL
採用	【院内製剤】40%硝酸銀液 10mL
採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)
用時	【院内製剤】3%食塩点眼液 5mL
採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
院外	ジルテック錠10
院外	ジルテック錠10
採用	ジルテックドライシロップ1.25%
用時	シルデナフィル錠20mgRE「JG」
採用	ジレニアカプセル0.5mg
採用	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」
採用	シロドシンOD錠4mg「ケミファ」
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)
採用	人工涙液マイティア点眼液

採用区分	採用医薬品名
用時	親水ワセリン「ホエイ」
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)
採用	新レシカルボン坐剤
院外	スイニー錠100mg
院外	スイニー錠100mg
採用	スインプロイク錠0.2mg
院外	スーグラ錠25mg
院外	スージャヌ配合錠
用時	スーテントカプセル12.5mg
採用	スーブレン吸入麻醉液
院外	スタレボ配合錠L100
院外	スタレボ配合錠L50
用時	スチバーガ錠40mg
院外	ストラテラカプセル10mg
院外	ストラテラカプセル25mg
院外	ストラテラカプセル40mg
採用	ストロカイン錠5mg
用時	ストロメクトール錠3mg
院外	スピール膏M
採用	スピオルトレスピマット60吸入
採用	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
院外	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
採用	スピロノラクトン錠25mg「日医工」
院外	スピロベント錠10 μ g
院外	ズファジラン錠10mg
用時	スプリセル錠20mg
採用	スマトリプタン錠50mg「アメル」
採用	スルピリド錠50mg「サワイ」
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)
用時	【院内製剤】生食点眼液 5mL
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
用時	ゼスラン錠3mg
院外	ゼスラン小児用細粒0.6%
院外	ゼスラン小児用シロップ0.03%
院外	セディール錠10mg
採用	セパミット-Rカプセル10
院外	セパミット-R細粒2%
院外	ゼビアックスローション2%
採用	セファドール錠25mg
採用	セファランチン錠1mg
採用	セファレキシнкаプセル250mg「トーワ」
用時	ゼフィックス錠100
採用	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
院外	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」
院外	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」
院外	セフゾン細粒小児用10%
用時	【院内製剤】2%セフタジジム点眼液 5mL
院外	ゼフナート外用液2%
院外	ゼフナートクリーム2%
用時	セムブリックス錠20mg

採用区分	採用医薬品名
用時	セムブリックス錠40mg
採用	セルセプトカプセル250
採用	セルトラリン錠25mg「ケミファ」
院外	セルニルトン錠
採用	ゼルフォーム(No.12)
院外	ゼルヤンツ錠5mg
院外	セレクトール錠200mg
採用	セレコキシブ錠100mg「オーハラ」
採用	セレコキシブ錠200mg「オーハラ」
院外	セレスタミン配合シロップ
採用	セレニカR顆粒40%
院外	セレネース錠0.75mg
採用	セレネース錠1.5mg
院外	セレネース錠3mg
院外	セレベント50ディスクス
院外	セロケンL錠120mg
院外	セロシオンカプセル10
用時	ゼンタコートカプセル3mg
採用	センノシド錠12mg「トーワ」
用時	ゾスパタ錠40mg
採用	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」
採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」
採用	ゾニサミド散20%「アメル」
採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」
採用	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」
採用	ゾビラックス錠200
採用	ソフラチュール貼付剤10cm
院外	ソランタール錠100mg
採用	ソリタ-T配合顆粒3号
採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」
院外	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」
用時	ゾリンザカプセル100mg
採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」
院外	ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「トーワ」
院外	ソレトン錠80
用時	ダーブロック錠1mg
採用	ダーブロック錠2mg
院外	ダーブロック錠4mg
院外	ダーブロック錠6mg
院外	ダイアコート軟膏0.05%
採用	ダイアアップ坐剤4
採用	ダイアアップ坐剤6
採用	ダイアモックス錠250mg
用時	タイケルブ錠250mg
採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
院外	タウリン散98%「大正」
院外	ダクチル錠50mg
用時	タグリッソ錠80mg
院外	タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」
院外	タケキャブOD錠10mg
採用	タケキャブOD錠20mg

採用区分	採用医薬品名
院外	タケルダ配合錠
採用	ダサチニブ錠50mg「NK」
用時	タシグナカプセル150mg
用時	タシグナカプセル200mg
院外	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」
院外	タダラフィル錠20mgAD「杏林」
院外	タチオン点眼液2%
用時	タナドーバ顆粒75%
院外	タナトリル錠5
用時	タバリス錠100mg
用時	タバリス錠150mg
院外	タプコム配合点眼液
用時	タプネオスカプセル10mg
採用	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」
院外	タプロスミニ点眼液0.0015%
採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
院外	タモキシフェン錠20mg「DSEP」
採用	ダラシнкаプセル150mg
採用	タリージェOD錠15mg
採用	タリージェOD錠5mg
院外	タリムス点眼液0.1%
採用	タルチレリンOD錠5mg「JG」
採用	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
院外	炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」
採用	単シロップ
採用	ダントリウムカプセル25mg
採用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」
採用	チアブリド錠25mg「NIG」
採用	0.025W/V%チアミトール水
採用	チウラジール錠50mg
院外	チガソнкаプセル10
院外	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」
院外	チモプトール点眼液0.25%
採用	チモロール点眼液0.5%「テイカ」
用時	チャンピックス錠0.5mg
用時	チャンピックス錠1mg
院外	クラシエ猪苓湯エキス細粒
採用	チラーヂンS錠25 μ g
採用	チラーヂンS錠50 μ g
用時	5mcgチロナミン錠
採用	沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」
採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
採用	ツイミーグ錠500mg
用時	ツインラインNF配合経腸用液
院外	ツートラム錠25mg
院外	ツベルミン錠100mg
採用	ツルバダ配合錠
採用	ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」
採用	ツロブテロールテープ1mg「VTRS」

採用区分	採用医薬品名
採用	ツロブテロールテープ2mg「VTRS」
採用	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」
院外	ディビゲル1mg
採用	ディフェリングル0.1%
院外	ディレグラ配合錠
院外	デエビゴ錠10mg
院外	デエビゴ錠2.5mg
採用	デエビゴ錠5mg
用時	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」
採用	テオロン錠100mg
採用	デカドロン錠0.5mg
採用	デカドロン錠4mg
採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」
採用	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」
用時	テクフィデラカプセル120mg
用時	テクフィデラカプセル240mg
採用	テグレート細粒50%
採用	テグレート錠100mg
採用	デスマプレシン・スプレー10協和
用時	【院内製剤】デスマプレシン点鼻液25 μ g/mL 10mL
採用	【院内製剤】25%トリクロロ酢酸液 20mL
採用	【院内製剤】80%トリクロロ酢酸液 10mL
採用	デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」
用時	デソバン錠60mg
院外	デタントール0.01%点眼液
院外	テトラミド錠10mg
院外	デトルシールカプセル4mg
院外	テネリアOD錠20mg
院外	テノーミン錠50
院外	テノゼット錠300mg
採用	デノタスチュアブル配合錠
採用	デパケンR錠100mg
採用	デパケンR錠200mg
採用	デパケンシロップ5%
院外	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」
用時	テプミトコ錠250mg
採用	テプレノンカプセル50mg「トーワ」
院外	テプレノン細粒10%「トーワ」
院外	デベルザ錠20mg
用時	デムサーカプセル250mg
用時	テモダールカプセル100mg
用時	テモダールカプセル20mg
院外	デュアック配合ゲル
院外	デュオトラバ配合点眼液
採用	デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」
院外	デュファストン錠5mg
採用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」
院外	テリルジー100エリプタ14吸入用
採用	テリルジー100エリプタ30吸入用
院外	テリルジー200エリプタ14吸入用
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用

採用区分	採用医薬品名
採用	テルネリン錠1mg
採用	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」
採用	テルピナフィン錠125mg「サワイ」
採用	テルミサルタン錠20mg「ニプロ」
採用	テルミサルタン錠40mg「ニプロ」
院外	デルモベートスカルプローション0.05%
院外	テレミンソフト坐薬2mg
採用	トアラセット配合錠「DSEP」
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
採用	トウモロコシデンブ「ホエイ」
採用	ドキサゾシン錠0.5mg「EMEC」
採用	ドキサゾシン錠1mg「トーワ」
院外	ドグマチール錠100mg
採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」
採用	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」
採用	トスフロ点眼液0.3%
採用	ドネベジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」
採用	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」
採用	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
採用	ドバコール配合錠L100
用時	ドバトン散98.5%
院外	トビエース錠4mg
院外	トピナ錠50mg
採用	ドプスOD錠100mg
用時	トブラシン点眼液0.3%
院外	トフラニール錠25mg
院外	ドボネックス軟膏50 μ g/g
院外	ドボベットゲル
院外	ドボベット軟膏
院外	ドラール錠15
採用	トラゼンタ錠5mg
採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
院外	トラディアンス配合錠AP
院外	トラディアンス配合錠BP
採用	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」
採用	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」
採用	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
院外	トラベルミン配合錠
採用	トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」
採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」
採用	トランサミン散50%
採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」
院外	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μ g「大正」
院外	トリキュラー錠28
採用	トリクロリールシロップ10%
採用	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」
院外	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」
院外	トリプタノール錠10

採用区分	採用医薬品名
院外	トリプタノール錠25
採用	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「NIG」
採用	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
院外	トリンテリックス錠10mg
採用	トルソプト点眼液1%
採用	トルバプタンOD錠15mg「トーワ」
採用	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
採用	ドルモロール配合点眼液「わかもと」
採用	トレーランG液50g
採用	トレーランG液75g
院外	トレリーフOD錠50mg
採用	トロピカミド点眼液0.4%「日点」
採用	トロンビン液モチダソフトボトル1万
採用	経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」
採用	ドンペリドン錠10mg「NIG」
採用	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」
採用	ナイキサン錠100mg
院外	ナウゼリンOD錠10
採用	ナウゼリン坐剤10
採用	ナウゼリン坐剤30
採用	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」
採用	ナゼアOD錠0.1mg
採用	ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」
院外	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」
用時	ナルサス錠12mg
採用	ナルサス錠2mg
採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「フソー」
採用	ナルラピド錠1mg
用時	ナルラピド錠4mg
用時	ニコチネルTTS10
用時	ニコチネルTTS20
用時	ニコチネルTTS30
採用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」
採用	ニコランジル錠5mg「サワイ」
採用	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
採用	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」
採用	ニトロベン舌下錠0.3mg
院外	ニバジール錠2mg
院外	ニバジール錠4mg
院外	ニフェジピンL錠20mg「KPI」
採用	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
採用	ニフラン点眼液0.1%
採用	ニフレック配合内用剤
採用	乳酸カルシウム「VTRS」原末
採用	乳糖水和物「ホエイ」
院外	ニュープロバッチ13.5mg
院外	ニュープロバッチ2.25mg
採用	ニュープロバッチ4.5mg
院外	ニュープロバッチ9mg
院外	ニューレプチル細粒10%
採用	ニューレプチル錠5mg

採用区分	採用医薬品名
院外	ニューベクオ錠300mg
採用	尿素クリーム20%「SUN」
院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒
用時	ニンラーロカプセル2.3mg
用時	ニンラーロカプセル3mg
用時	ニンラーロカプセル4mg
採用	ネイサート坐剤
院外	ネイリンカプセル100mg
用時	ネオーラル25mgカプセル
用時	ネオーラル50mgカプセル
用時	ネオーラル内用液10%
院外	ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)
採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液
院外	ネオフィリン錠100mg
採用	ネオメドロールEE軟膏
用時	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
用時	ネクサバル錠200mg
採用	ネシーナ錠12.5mg
院外	ネシーナ錠25mg
院外	ネシーナ錠6.25mg
採用	ネリザ軟膏
院外	ネリゾナ軟膏0.1%
院外	ノアルテン錠(5mg)
院外	ノイエル細粒40%
採用	ノイロトロピン錠4単位
用時	ノウリアスト錠20mg
採用	ノバミン錠5mg
採用	ノベルジン顆粒5%
院外	ノルスパンテープ10mg
院外	ノルスパンテープ5mg
採用	ハーフジゴキシンKY錠0.125
用時	ハーボニー配合錠
院外	バイアグラ錠50mg
採用	バイアスピリン錠100mg
用時	バイシリンG顆粒40万単位
採用	ハイセチンP軟膏
採用	ハイドレアカプセル500mg
用時	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)
院外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%
採用	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」
院外	パキシルCR錠12.5mg
院外	パキシルCR錠25mg
院外	パキシル錠5mg
採用	パキロビッドパック300
採用	パキロビッドパック600
採用	白色ワセリン
採用	バクスミー点鼻粉末剤3mg
採用	バクトラミン配合顆粒
採用	バクトラミン配合錠
採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%
採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)

採用区分	採用医薬品名
院外	バンメット錠1mg
院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒
採用	ハッカ油「ケンエー」
用時	【院内製剤】パッチテスト
採用	バナルジン錠100mg
院外	バナンドライシロップ5%
院外	バナンドライシロップ5%
用時	バニマイシン点眼液0.3%
院外	バピロックミニ点眼液0.1%
採用	バファリン配合錠A81
院外	バフセオ錠150mg
院外	バフセオ錠300mg
採用	バラシクロピル顆粒50%「トーワ」
採用	バラシクロピル錠500mg「SPKK」
採用	バラマイシン軟膏
採用	パラミゼンカプセル300mg
採用	バリキサ錠450mg
採用	バリテスターA240散
採用	バルギン発泡顆粒
院外	ハルシオン0.25mg錠
採用	バルタンM錠0.125mg
採用	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
院外	バルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入
院外	バルモディアXR錠0.2mg
院外	バルモディアXR錠0.4mg
採用	バルモディア錠0.1mg
院外	ハルロピテープ24mg
採用	ハルロピテープ8mg
採用	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」
採用	パロキセチンOD錠20mg「トーワ」
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒
採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
用時	バンコマイシン眼軟膏1%
用時	【院内製剤】1%バンコマイシン点眼液 5mL
採用	バンテチン錠100mg「シオエ」
採用	調剤用パンピタン末
採用	ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」
採用	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」
院外	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」
院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%
採用	PA・ヨード点眼・洗眼液
採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
院外	ビーゼットシー糖衣錠2mg
院外	ピートル顆粒分包250mg
院外	ピートルチュアブル錠250mg
採用	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL
用時	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL
採用	【院内製剤】ピオクタニンプルー液0.5% 5mL

採用区分	採用医薬品名
採用	【院内製剤】ピオクタニンブルー液2% 100mL
採用	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」
院外	ピオスリー配合散
採用	ピオスリー配合錠
院外	ピオチン散0.2%「フソー」
採用	ピオフェルミンR散
院外	ピオフェルミンR錠
採用	ピカルタミドOD錠80mg「ケミファ」
院外	ピクシリンカプセル250mg
用時	ピジクリア配合錠
採用	ビスコート0.5眼粘弾剤
院外	ピソノテープ2mg
採用	ピソノテープ4mg
採用	ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」
採用	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」
院外	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」
採用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」
用時	ビタミンB6散10%「マルイシ」
院外	ピタメジン配合カプセルB25
採用	ピダラビン軟膏3%「SW」
院外	ヒダントールF配合錠
院外	ヒダントール錠25mg
採用	ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」
採用	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」
院外	ビビアント錠20mg
院外	ビベスピエアロスフィア28吸入
院外	ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」
用時	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」
用時	ピマリシン点眼液5%「センジュ」
採用	ビムパット錠50mg
院外	ビムパットドライシロップ10%
院外	ピメノールカプセル50mg
採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」
院外	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒
院外	ビラノア錠20mg
用時	ビラフトビカプセル50mg
用時	ビラフトビカプセル75mg
採用	ビラマイド原末
採用	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」
採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」
採用	ヒルドイドローション0.3%
用時	ビルトリシド錠600mg
用時	ビルフェニドン錠200mg「日医工」
院外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入
採用	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
院外	ビレチア錠(25mg)
採用	ビレノキシシン懸濁性点眼液0.005%「参天」
院外	ビンダケルカプセル20mg
院外	ファスティック錠90
用時	ファミシクロピル錠250mg「トーワ」
採用	ファミチジン散10%「サワイ」

採用区分	採用医薬品名
採用	ファモチジンD錠10mg「EMEC」
採用	ファモチジンD錠20mg「EMEC」
院外	ファロム錠200mg
院外	ファロムドライシロップ小児用10%
採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL
採用	フィコンパ錠2mg
用時	フィコンパ錠4mg
用時	【院内製剤】 ブイフェンド点眼液 5mL
採用	フィブラストスプレー500
院外	フェアストーン錠40
採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」
採用	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」
院外	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
院外	フェノバールエリキシル0.4%
採用	フェノバール散10%
採用	フェノバール錠30mg
採用	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
採用	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」
院外	フェマーラ錠2.5mg
採用	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」
院外	フェルピナクパップ70mg「NP」
採用	フェロ・グラデュメット錠105mg
採用	フェロベリン配合錠
採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」
用時	フェントステープ0.5mg
用時	フェントステープ1mg
用時	フェントステープ4mg
採用	フォシーガ錠10mg
採用	フォシーガ錠5mg
採用	フォリアミン錠
用時	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
用時	ブコラム口腔用液10mg
用時	ブコラム口腔用液2.5mg
用時	ブコラム口腔用液5mg
用時	ブコラム口腔用液7.5mg
採用	フスコデ配合錠
採用	ブスコパン錠10mg
院外	ブセレリン点鼻液0.15%「F」
採用	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」
採用	ブラケニル錠200mg
採用	ブラザキサカプセル110mg
採用	ブラザキサカプセル75mg
採用	フラジール錠250mg
採用	フラジール内服錠250mg
院外	ブラダロン錠200mg
院外	ブラノバール配合錠
院外	ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」
院外	ブラビックス錠25mg
採用	ブラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」
採用	ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」

採用区分	採用医薬品名
院外	フランドル錠20mg
院外	ブランルカスト錠112.5mg「AFP」
採用	ブランルカスト錠225mg「AFP」
採用	ブランルカストDS10%「タカタ」
院外	フリバスOD錠75mg
院外	ブリビナ液0.05%
院外	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」
採用	ブリモボラン錠5mg
採用	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニッター」
採用	フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」
採用	フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」
採用	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」
用時	【院内製剤】0.2%フルコナゾール点眼 5mL
採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
用時	フルタイド100ディスクス
院外	フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用
用時	フルタイド200ディスクス
採用	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用
採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「トーワ」56噴霧用
採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用
用時	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
院外	ブルフェン錠100
院外	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」
採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」
院外	フルメタ軟膏
院外	フルメタローション
採用	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」
採用	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」
採用	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」
採用	プレグランディン腔坐剤1mg
採用	プレドニゾン散「タケダ」1%
採用	プレドニゾン錠1mg(旭化成)
採用	プレドニゾン錠2.5mg「NP」
院外	プレドニン眼軟膏
採用	プレドニン錠5mg
用時	プレドネマ注腸20mg
用時	プレバイミス錠240mg
院外	プレマリン錠0.625mg
院外	プレミネント配合錠HD
院外	プレミネント配合錠LD
採用	プロウベス腔用剤10mg
院外	プロクトセディル坐薬
採用	プログラフカプセル0.5mg
採用	プログラフカプセル1mg
院外	フロジン外用液5%
院外	プロスターールL錠50mg
採用	プロスターール錠25
採用	プロスタンディン軟膏0.003%
採用	フロセミド細粒4%「EMEC」
採用	フロセミド錠10mg「NP」

採用区分	採用医薬品名
採用	フロセミド錠20mg「NIG」
院外	プロチアデン錠25
採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用
院外	プロナンセリン錠4mg「アメル」
院外	プロノン錠150mg
院外	プロベシア錠0.2mg
院外	プロベシア錠1mg
院外	プロペト
院外	プロペラ錠2.5mg
用時	フロベン顆粒8%
用時	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg
採用	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」
採用	ブロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
院外	ブロムペリドール錠1mg「アメル」
院外	ブロムペリドール錠3mg「アメル」
用時	ブロメライン軟膏5万単位/g
採用	ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」
用時	フロリドゲル経口用2%
採用	フロリド膣坐剤100mg
院外	フロリドDクリーム1%
採用	フロリネフ錠0.1mg
院外	ページニオ錠100mg
院外	ページニオ錠150mg
院外	ページニオ錠50mg
採用	ベオーバ錠50mg
採用	ベサコリン散5%
院外	ベザトールSR錠200mg
用時	ベサノイドカプセル10mg
採用	ベストロン点眼用0.5%
院外	ベセルナクリーム5%
採用	ベタセレミン配合錠
採用	ベタニス錠25mg
院外	ベタニス錠50mg
採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」
採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
院外	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」
採用	ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」
採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
用時	ベネクレクスタ錠100mg
用時	ベネクレクスタ錠10mg
用時	ベネクレクスタ錠50mg
院外	ベネット錠17.5mg
院外	ベネット錠75mg
採用	ベノキシール点眼液0.4%
採用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」
採用	ヘパンED配合内用剤
院外	ベピオゲル2.5%
院外	ベプリコール錠100mg
採用	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」

採用区分	採用医薬品名
採用	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」
採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
採用	ベムリディ錠25mg
採用	ヘモポリゾン軟膏
院外	ベラサスLA錠60 μ g
用時	ペラゾリン細粒400mg
採用	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
採用	ベラプロストNa錠20 μ g「VTRS」
院外	ペリアクチンシロップ0.04%
院外	ベリキューボ錠10mg
採用	ベリキューボ錠2.5mg
院外	ベリキューボ錠5mg
院外	ベリチーム配合顆粒
採用	ベリプラストPコンビセット組織接着用0.5mL製剤
院外	ベルサンチン錠100mg
採用	ベルサンチン錠25mg
院外	ベルジピンLAカプセル20mg
院外	ベルジピンLAカプセル40mg
採用	ベルソムラ錠15mg
採用	ベルソムラ錠20mg
採用	ベルベゾロンF点眼・点鼻液
院外	ヘルベッサ錠30
用時	ベルマックス錠250 μ g
用時	ベレキシブル錠80mg
採用	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
院外	ペロテックエロゾル100
採用	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」
用時	ペンタサ顆粒94%
用時	ペンタサ坐剤1g
院外	ペンタサ注腸1g
用時	ペンレステープ18mg
院外	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
採用	ボースデル内用液10
院外	ホーリン錠1mg
採用	ホーリンV腔用錠1mg
院外	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
採用	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」
採用	ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」
用時	ボシュリフ錠100mg
院外	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」
院外	ホスミシンS耳科用3%
採用	【院内製剤】0.02%ボスミン液 100mL
採用	ボスミン外用液0.1%
採用	【院内製剤】0.02%ボスミンキシロカイン液 25mL
採用	【院内製剤】0.02%ボスミン生食 25mL
採用	ホスリボン配合顆粒
採用	ポセンタン錠62.5mg「VTRS」
用時	ボチシート20%
採用	クラシエ補中益気湯エキス細粒
院外	ポノサップパック400

採用区分	採用医薬品名
院外	ポノサップバック800
院外	ポノテオ錠1mg
院外	ポノピオンバック
採用	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」
採用	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」
採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」
採用	ポピヨドンスクラブ7.5%
用時	ポマリストカプセル2mg
用時	ポマリストカプセル3mg
用時	ポマリストカプセル4mg
院外	ボラキス錠3
院外	ボラザG軟膏
採用	ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」
院外	ボララミンドライシロップ0.2%
用時	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」
採用	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」
採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉
採用	ポリフル錠500mg
院外	ボルタレンSRカプセル37.5mg
院外	ボルタレンサポ25mg
採用	ボルタレンローション1%
採用	ボルヒール組織接着用(3mL)
採用	ボルヒール組織接着用(5mL)
採用	【院内製剤】5%ホルマリンアルコール 100mL
院外	ボンアルファクリーム2 μ g/g
院外	ボンアルファ軟膏2 μ g/g
院外	ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g
院外	ボンアルファハイローション20 μ g/g
院外	ボンアルファローション2 μ g/g
用時	ボンゾール錠100mg
院外	ボンタールシロップ3.25%
院外	マーデュオックス軟膏
院外	マイコスポールクリーム1%
院外	マイザークリーム0.05%
採用	マイザー軟膏0.05%
院外	マイスタン細粒1%
院外	マイスタン細粒1%
採用	マイスタン錠5mg
用時	マイテラーゼ錠10mg
採用	マヴィレット配合錠
院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
採用	マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「タカタ」
院外	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)
採用	マグコロール散68%分包50g
用時	【院内製剤】0.02%マスキ点眼液 5mL
採用	マックメット懸濁用配合DS
用時	マブリン散1%
院外	マリゼブ錠12.5mg
院外	マリゼブ錠25mg

採用区分	採用医薬品名
採用	ミオコールスプレー0.3mg
採用	ミオナール錠50mg
院外	ミオピン点眼液
院外	ミカトリオ配合錠
院外	ミカムロ配合錠AP
院外	ミカムロ配合錠BP
院外	ミグシス錠5mg
採用	ミグリトールOD錠25mg「サワイ」
採用	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
用時	小児用ミケラン細粒0.2%
院外	ミケルナ配合点眼液
用時	ミコブティンカプセル150mg
院外	ミコンビ配合錠AP
院外	ミコンビ配合錠BP
採用	ミゾリピン錠50mg「サワイ」
採用	ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」
用時	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
用時	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」
採用	ミドリンP点眼液
用時	ミニプレス錠0.5mg
院外	ミニリンメルトOD錠120 μ g
院外	ミニリンメルトOD錠25 μ g
院外	ミニリンメルトOD錠50 μ g
採用	ミニリンメルトOD錠60 μ g
院外	ミネプロOD錠2.5mg
院外	ミネプロOD錠5mg
院外	ミネプロOD錠1.25mg
採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」
採用	ミノドロロン酸錠50mg「ニプロ」
採用	ミヤBM細粒
採用	ミヤBM錠
院外	ミラベックスLA錠0.375mg
院外	ミラベックスLA錠1.5mg
院外	ミリステープ5mg
採用	ミルタザピン錠15mg「明治」
採用	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」
採用	ミレーナ52mg
採用	ミンクリア内用散布液0.8%
院外	ムコスタ点眼液UD2%
院外	ムコソルバン錠15mg
院外	ムコフィリン吸入液20%
用時	ムルブレタ錠3mg
用時	ムンデシンカプセル100mg
院外	メイラックス錠1mg
用時	メーゼント錠0.25mg
用時	メーゼント錠2mg
採用	メキシチールカプセル100mg
院外	メキシチールカプセル50mg
用時	メクトビ錠15mg
採用	メコバラミン錠500「トーワ」

採用区分	採用医薬品名
院外	メサデルム軟膏0.1%
院外	メサデルムローション0.1%
採用	メサラジン錠500mg「ケミファ」
採用	メスチノン錠60mg
院外	メソトレキセート錠2.5mg
院外	メタルカプターゼカプセル100mg
院外	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」
院外	メトアナ配合錠HD
院外	メトアナ配合錠LD
院外	メトグルコ錠500mg
採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」
採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」
採用	メトピロンカプセル250mg
院外	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」
採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」
用時	メドロール錠2mg
院外	メドロール錠4mg
院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」
採用	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」
採用	メプチンエア-10 μ g吸入100回
院外	メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回
採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL
採用	メプチン吸入液ユニット0.5mL
採用	メプチンスイグヘラー10 μ g吸入100回
採用	メプチンドライシロップ0.005%
院外	メプチンミニ錠25 μ g
院外	メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ソルハラ」
採用	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」
採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」
院外	メラトベル顆粒小児用0.2%
採用	メルカゾール錠5mg
院外	メロキシカム錠10mg「NP」
院外	メンタックス外用液1%
院外	メンタックスクリーム1%
用時	【院内製剤】 モーズ軟膏 120g
採用	モーラステープL40mg
院外	モーラスパップXR120mg
院外	モーラスパップXR120mg
院外	モーラスパップXR240mg
採用	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」
採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」
院外	モビコール配合内用剤HD
採用	モビコール配合内用剤LD
採用	モビブレップ配合内用剤
採用	モメタゾン点鼻液50 μ g「トーワ」56噴霧用
用時	【倍散】 モルヒネ塩酸塩水和物散1%(10mg/g)
用時	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
用時	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末
採用	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」
採用	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」

採用区分	採用医薬品名
採用	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」
院外	ヤーズフレックス配合錠
院外	ヤクバンテープ60mg
採用	薬用炭「日医工」
院外	ユーエフティ配合カプセルT100
院外	ユーゼル錠25mg
用時	ユービット錠100mg
院外	ユニシア配合錠HD
院外	ユニシア配合錠LD
採用	ユニフィルLA錠200mg
院外	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」
採用	ユベラNソフトカプセル200mg
用時	ユベラ軟膏
院外	ユリス錠0.5mg
採用	ユリス錠1mg
院外	ユリス錠2mg
採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
採用	ヨウ素「コザカイ・M」
採用	ヨードカプセル-123
採用	複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」
用時	タマガワヨードホルムガーゼ
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
院外	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒
採用	ラキソベロン錠2.5mg
採用	ラキソベロン内用液0.75%
採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」
採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g
院外	ラクリミン点眼液0.05%
採用	ラゲブリオカプセル200mg
採用	ラコールNF配合経腸用液
採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤
院外	ラジカット内用懸濁液2.1%
院外	ラシックス錠40mg
院外	ラジレス錠150mg
用時	ラステットSカプセル25mg
採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」
採用	ラツータ錠20mg
採用	ラックビー微粒N
採用	ラフチジン錠10mg「トーワ」
採用	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」
院外	ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」
院外	ラミクタール錠100mg
院外	ラミシール外用液1%
採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
採用	ラモトリギン錠25mg「トーワ」
用時	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」
採用	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」
採用	ラリキシンドライシロップ小児用20%
院外	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」

採用区分	採用医薬品名
採用	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」
採用	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」
用時	リアルダ錠1200mg
採用	リーバクト配合顆粒
院外	リーバクト配合経口ゼリー
採用	リーマス錠100
院外	リーマス錠200
採用	リオナ錠250mg
採用	リオレサール錠5mg
採用	リクシアナOD錠30mg
採用	リクシアナOD錠60mg
院外	リクシアナ錠15mg
採用	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」
用時	リザベン細粒10%
院外	リスパダール錠1mg
採用	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」
採用	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」
採用	リスミー錠1mg
院外	リスモダンカプセル50mg
院外	リズモンTG点眼液0.5%
採用	リタリン錠10mg
採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
用時	リテインパ耳科用250 μ gセット
採用	リドカインテープ18mg「NP」
用時	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%
採用	リドメックスコーワ軟膏0.3%
院外	リドメックスコーワローション0.3%
用時	リネゾリド錠600mg「サワイ」
採用	リパクレオン顆粒300mg分包
院外	リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」
院外	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」
採用	リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」
採用	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」
院外	リバゼブ配合錠HD
院外	リバゼブ配合錠LD
採用	リファンピシカプセル150mg「サンド」
用時	【院内製剤】0.2%リファンピシン人工血管液 60mL
採用	リフキシマ錠200mg
院外	リフヌア錠45mg
院外	リベルサス錠14mg
採用	リベルサス錠3mg
院外	リベルサス錠7mg
採用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用
採用	リボトリール細粒0.1%
採用	リボトリール錠0.5mg
院外	リポバス錠5
採用	リポフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」
院外	リマチル錠100mg
院外	リマチル錠50mg
採用	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」

採用区分	採用医薬品名
院外	リムパーザ錠100mg
院外	リムパーザ錠150mg
採用	【院内製剤】0.5%硫酸アトロピン点眼 5mL
院外	ツムラ荅桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)
採用	リルゾール錠50mg「AA」
院外	リレンザ
院外	リンヴォック錠15mg
院外	リンヴォック錠7.5mg
採用	リン酸水素カルシウム「エビス」
院外	リンゼス錠0.25mg
院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏
院外	リンデロン坐剤0.5mg
院外	リンデロン坐剤1.0mg
採用	リンデロンシロップ0.01%
採用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
採用	リンデロン-Vクリーム0.12%
採用	リンデロン-VGローション
採用	リンデロン-V軟膏0.12%
院外	リンデロン-Vローション
院外	リンラキサール錠125mg
採用	【院内製剤】2.5%ルゴール液 20mL
院外	ルコナック爪外用液5%
院外	ルジオミール錠10mg
院外	ルジオミール錠25mg
院外	ルセフィ錠2.5mg
院外	ルセフィ錠5mg
採用	ルナベル配合錠LD
院外	ルナベル配合錠ULD
院外	ルパフィン錠10mg
院外	ルブラック錠4mg
院外	ルミガン点眼液0.03%
採用	ルリクールVG軟膏0.12%
院外	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」
院外	ルリコン軟膏1%
院外	ルリッド錠150
院外	レイボー錠100mg
院外	レイボー錠50mg
採用	レキサルティOD錠1mg
院外	レキソタン錠1
採用	レキソタン錠2
院外	レキソタン錠5
院外	レキップCR錠8mg
用時	レクタブル2mg注腸フォーム14回
採用	レクチゾール錠25mg
用時	レグナイト錠300mg
院外	レザルタス配合錠HD
院外	レザルタス配合錠LD
院外	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏
採用	レスタミンコーワクリーム1%
採用	レナジェル錠250mg
採用	レナデックス錠4mg

採用区分	採用医薬品名
採用	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」
院外	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」
採用	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」
採用	レバミピド錠100mg「EMEC」
採用	レブラミドカプセル5mg
採用	レベチラセタム錠250mg「トーワ」
採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」
院外	レベチラセタムDS50%「トーワ」
用時	レベトールカプセル200mg
院外	レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」
採用	レボカルニチンFF内用液10%「アメル」
採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」
採用	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」
採用	レボトミン錠25mg
院外	レボトミン錠5mg
採用	レボフロキサシン錠250mg「杏林」
採用	レボフロキサシン錠500mg「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
採用	レボレード錠12.5mg
院外	レルパックス錠20mg
院外	レルベア100エリプタ14吸入用
院外	レルベア100エリプタ30吸入用
院外	レルベア200エリプタ14吸入用
採用	レルベア200エリプタ30吸入用
院外	レルミナ錠40mg
用時	レンビマカプセル10mg
用時	レンビマカプセル4mg
用時	ロイケリン散10%
院外	ロイコン錠10mg
院外	ローコール錠20mg
用時	ローブレナ錠100mg
院外	ロキソニンバップ100mg
採用	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」
採用	ロケルマ懸濁用散分包10g
採用	ロケルマ懸濁用散分包5g
院外	ロコアテープ
院外	ロコアテープ
院外	ロコイド軟膏0.1%
院外	ロコルナール錠100mg
採用	ロサルタンK錠25mg「トーワ」
院外	ロスーゼット配合錠HD
院外	ロスーゼット配合錠LD
採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」
採用	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」
院外	ロゼックスゲル0.75%
用時	ロタテック内用液
採用	ロタリックス内用液

採用区分	採用医薬品名
採用	ロドピン錠25mg
院外	ロナセンテープ20mg
院外	ロナセンテープ30mg
採用	ロナセンテープ40mg
用時	ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」
院外	ロピニロールOD錠1mg「アメル」
採用	ロピニロール徐放錠2mg「KMP」
採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」
院外	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」
採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
採用	ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」
院外	ロラメット錠1.0
院外	ロルノキシカム錠4mg「KO」
院外	ロレルコ錠250mg
院外	ロンサーフ配合錠T15
院外	ロンサーフ配合錠T20
採用	ワーファリン錠0.5mg
採用	ワーファリン錠1mg
用時	ワコビタール坐剤30
院外	ワントラム錠100mg