

区分 販売名
採用 1%塩酸プロカイン注射液「ニッシン」
用時 10%デヒドロコール酸注「ニッシン」
採用 20%マンニトール注射液「YD」
採用 ACD-A液 500mL
採用 DTビック
採用 Dドライ透析剤2.5S
採用 EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)
用時 HMG注射用75IU「フェリング」
採用 KCL注20mEqキット「テルモ」
採用 LH-RH注0.1mg「タナベ」
用時 アービタックス注射液100mg
用時 アイモビーグ皮下注70mgペン
採用 アイリーア硝子体内注射液40mg/mL
採用 アキネトン注射液5mg
採用 アクテムラ点滴静注用200mg
採用 アクテムラ点滴静注用400mg
採用 アクテムラ点滴静注用80mg
採用 アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
採用 アクトヒブ
採用 アクメインD輸液(500mLプラスチックボトル)
用時 アクラシノン注射用20mg
採用 アコアラン静注用1800
採用 アザクタム注射用1g
採用 アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」
用時 アジヨビ皮下注225mgシリンジ
採用 アスコルビン酸注500mgPB「日新」
採用 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL)
採用 アセリオ静注液1000mgバッグ
用時 アセレンド注100 μ g
採用 アタラックス-P注射液(25mg/ml)
採用 アタラックス-P注射液(50mg/ml)
院外 アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」
採用 アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」
用時 アディノベイト静注用キット1000
採用 アディノベイト静注用キット2000
用時 アディノベイト静注用キット3000
用時 アディノベイト静注用キット500
採用 アデホス-Lコーワ注40mg

区分	販売名
用時	アドセトリス点滴静注用50mg
採用	アトニン-O注5単位
用時	アドベイト静注用キット1000
用時	アドベイト静注用キット1500
採用	アドベイト静注用キット2000
用時	アドベイト静注用キット250
用時	アドベイト静注用キット3000
採用	アドベイト静注用キット500
採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)
採用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(1mL)
採用	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
採用	アネメトロ点滴静注液500mg
採用	アバスチン点滴静注用100mg/4mL
採用	アバスチン点滴静注用400mg/16mL
院外	アピドラ注100単位/mL
採用	アピドラ注ソロスター
採用	アブラキサン点滴静注用100mg
採用	アプレゾリン注射用20mg
用時	アボネックス筋注30 μ gペン
採用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
採用	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」
採用	アミサリン注200mg
採用	アミニック輸液
採用	アムビゾーム点滴静注用50mg
用時	アラセナ-A点滴静注用300mg
用時	アラノンジー静注用250mg
採用	アリナミン注射液10mg
採用	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」
採用	アルギU点滴静注20g
用時	アルケラン静注用50mg
採用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」
採用	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」
採用	アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」
採用	アレビアチン注250mg
採用	アンチレクス静注10mg
採用	イオパミドール300注20mL「F」
採用	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
採用	イオパミドール370注100mL「F」

区分	販売名
採用	イオパミロン注300(100mL)
採用	イオパミロン注300シリンジ(100mL)
採用	イオパミロン注370(100mL)
採用	イオパミロン注370シリンジ(100mL)
採用	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」
採用	イオメロン300注100mL
用時	イオメロン350注シリンジ135mL
用時	イジュド点滴静注25mg
用時	イジュド点滴静注300mg
用時	イスコチン注100mg
用時	イストダックス点滴静注用10mg
用時	イスパロクト静注用1500
用時	イスパロクト静注用2000
用時	イスパロクト静注用3000
採用	イソゾール注射用0.5g
採用	イソビスト注300
用時	イダマイシン静注用5mg
用時	イデルビオン静注用1000
用時	イデルビオン静注用2000
用時	イデルビオン静注用250
用時	イデルビオン静注用3500
用時	イデルビオン静注用500
用時	イノレット30R注
用時	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」
採用	イブリーフ静注20mg
用時	イベニティ皮下注105mgシリンジ
用時	イミフィンジ点滴静注120mg
用時	イミフィンジ点滴静注500mg
用時	イモバックスポリオ皮下注
採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」
採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」
用時	イロクテイト静注用1000
用時	イロクテイト静注用1500
用時	イロクテイト静注用2000
用時	イロクテイト静注用250
用時	イロクテイト静注用3000
用時	イロクテイト静注用500
用時	イロクテイト静注用750

区分	販売名
院外	インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」
採用	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」
院外	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」
採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
用時	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」
用時	インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」
採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
採用	インダシン 静注用1mg
採用	インデラル 注射液2mg
採用	イントラリポス 輸液20%(100mL袋)
採用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
用時	ウィフガート 点滴静注400mg
用時	ウテメリン 注50mg
採用	ウログラフィン 注60%(20mL)
採用	ウロナーゼ 静注用6万単位
採用	ウロミテキサン 注400mg
用時	エイフスチラ 静注用2000
用時	エイフスチラ 静注用250
用時	エイフスチラ 静注用500
用時	エイムゲン
用時	エクザール 注射用10mg
用時	エクストラニール 腹膜透析液(1.5L)
採用	エクストラニール 腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)
用時	エクストラニール 腹膜透析液(2L)
用時	エクストラニール 腹膜透析液(2L排液用バッグ付)
用時	エジャイモ 点滴静注1.1g
採用	エスポー 注射液750
採用	エスポー 皮下用24000シリンジ
採用	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」
採用	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」
用時	エトキシスクレロール1%注射液
採用	エトポシド 点滴静注液100mg「SN」
採用	エナルモンデポー 筋注125mg
用時	エナルモンデポー 筋注250mg
用時	エヌジェンラ 皮下注24mgペン
用時	エヌジェンラ 皮下注60mgペン
用時	エピペン 注射液0.15mg
用時	エピペン 注射液0.3mg

区分 販売名
用時 エビリファイ持続性水懸筋注用300mgシリンジ
用時 エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ
採用 エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」
採用 エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」
採用 エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」
採用 エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液)
採用 エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
用時 エムプリシティ点滴静注用300mg
用時 エムプリシティ点滴静注用400mg
用時 エリスロシン点滴静注用500mg
用時 エルカルチンFF静注1000mgシリンジ
用時 エルシトニン注20Sディスプレイ
採用 エルシトニン注40単位
採用 エルネオパNF1号輸液(1000mLキット)
採用 エルネオパNF1号輸液(1500mLキット)
採用 エルネオパNF2号輸液(1000mLキット)
採用 エルネオパNF2号輸液(1500mLキット)
用時 エンスプリング皮下注120mgシリンジ
採用 エンタイビオ点滴静注用300mg
用時 エンハーツ点滴静注用100mg
院外 エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
採用 エンブレル皮下注25mgペン0.5mL
院外 エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL
院外 エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
採用 オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」
採用 オキサリプラチン点滴静注200mg「トーワ」
採用 オキサリプラチン点滴静注50mg「トーワ」
採用 オキシコドン注射液10mg「第一三共」
採用 オキシコドン注射液50mg「第一三共」
採用 オクトレオチド皮下注100 μ g「あすか」
採用 オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」
採用 オゼンピック皮下注2mg
採用 オノアクト点滴静注用50mg
採用 オビソート注射用0.1g
採用 オフサグリーン静注用25mg
用時 オプジーボ点滴静注120mg
用時 オプジーボ点滴静注20mg
用時 オプジーボ点滴静注240mg

区分	販売名
採用	オブチレイ320注100mL
採用	オブチレイ320注シリンジ100mL
採用	オムニパーク240注10mL
採用	オムニパーク300注シリンジ100mL
採用	オムニパーク300注シリンジ150mL
採用	オムニパーク350注20mL
採用	オムニパーク350注シリンジ70mL
採用	オメプラゾール注用20mg「NP」
採用	オルダミン注射用1g
用時	オールドレブ点滴静注用150mg
用時	オルプロリクス静注用250
用時	オルプロリクス静注用3000
用時	オルプロリクス静注用500
採用	オレンシア点滴静注用250mg
採用	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
採用	オンコビン注射用1mg
採用	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」
採用	オンデキサ静注用200mg
用時	オンボ一点滴静注300mg
用時	オンボ一皮下注100mgオートインジェクター
用時	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
採用	カーボスター透析剤・L(6L)
採用	カーミパック生理食塩液L(1300mL)
用時	カイプロリス点滴静注用10mg
用時	カイプロリス点滴静注用40mg
用時	ガザイバ点滴静注1000mg
用時	カドサイラ点滴静注用100mg
用時	カドサイラ点滴静注用160mg
採用	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL
採用	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL
採用	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
採用	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」
採用	カルシトリオール静注液0.5 μ g「F」
用時	カルセド注射用20mg
用時	カルセド注射用50mg
採用	カルチコール注射液8.5%10mL
採用	カルチコール注射液8.5%5mL
採用	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」

区分	販売名
採用	カルボカインアンプル注1%(10mL)
採用	カルボカインアンプル注2%(5mL)
採用	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
採用	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」
採用	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
用時	カンサイダス点滴静注用50mg
用時	カンサイダス点滴静注用70mg
採用	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
採用	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」
用時	キイトルーダ点滴静注100mg
採用	キシロカイン注シリンジ1%
採用	キシロカイン注ポリアンプ1%(5mL)
採用	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1：100,000)含有
採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1：100,000)含有
採用	キドミン輸液(200mL袋)
採用	キリット注5%(500mL)
用時	キロサイド注20mg
採用	キンダリー透析剤AF4号(6L)
採用	グラニセトロン静注液1mg「NIG」
採用	クラフォラン注射用1g
用時	クリアクター静注用80万
用時	クリースビータ皮下注10mg
用時	クリースビータ皮下注20mg
用時	クリースビータ皮下注30mg
採用	グリセレブ配合点滴静注(200mL)
採用	クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」
採用	グルカゴンGノボ注射用1mg
採用	グルトパ注1200万
採用	クレキササン皮下注キット2000IU
用時	クレセンバ点滴静注用200mg
用時	グロウジェクト皮下注12mg
用時	グロウジェクト皮下注6mg
用時	クロスエイトMC静注用1000単位
用時	クロスエイトMC静注用2000単位
採用	ケイセントラ静注用1000
採用	ケイセントラ静注用500
採用	ケイツーN静注10mg
用時	ケシンプタ皮下注20mgペン

区分 販売名
採用 ケタラル静注用50mg
採用 ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
採用 ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
用時 ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター
用時 ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
採用 ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サンド」
採用 ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サンド」
採用 ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」
採用 コアテック注5mg
採用 コアベータ静注用12.5mg
用時 コートロシンZ筋注0.5mg
採用 コートロシン注射用0.25mg
用時 コセンティクス皮下注150mgペン
採用 ゴナックス皮下注用120mg
用時 ゴナックス皮下注用240mg
採用 ゴナックス皮下注用80mg
用時 ゴナトロピン注用5000単位
用時 コバルトトリイ静注用1000
用時 コバルトトリイ静注用2000
用時 コバルトトリイ静注用3000
用時 コバルトトリイ静注用500
用時 コパキソン皮下注20mgシリンジ
採用 コンファクトF静注用1000単位(高濃度品)
用時 コンファクトF静注用250単位(高濃度品)
用時 コンファクトF静注用500単位(高濃度品)
用時 サークリサ点滴静注100mg
用時 サークリサ点滴静注500mg
用時 サイビスクディスポ関節注2mL
用時 サイモグロブリン点滴静注用25mg
採用 サイラムザ点滴静注液100mg
採用 サイラムザ点滴静注液500mg
用時 サイレース静注2mg
用時 ザバクサ配合点滴静注用
採用 サビーン点滴静注用500mg
用時 サフネロー点滴静注300mg
採用 サブパック血液ろ過用補充液-Bi(2020mL)
採用 サムタス点滴静注用16mg
採用 サムタス点滴静注用8mg

区分 販売名
用時 ザルトラップ点滴静注100mg
用時 ザルトラップ点滴静注200mg
用時 サンディミュン点滴静注用250mg
用時 サンドスタチンLAR筋注用キット10mg
用時 サンドスタチンLAR筋注用キット20mg
用時 サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
採用 サンリズム注射液50
採用 ジアグノグリーン注射用25mg
採用 ジアゼパム注射液10mg 「NIG」
採用 ジアゼパム注射液5mg 「NIG」
採用 シアノコバラミン注射液1000 μ g 「トーワ」
採用 ジーラスタ皮下注3.6mg
用時 ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド
採用 ジェービックV
採用 ジェノトロピンゴークイック注用12mg
採用 ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg
用時 ジェブタナ点滴静注60mg
採用 シオゾール注25mg
用時 ジオン注無痛化剤付
用時 シグニフォーLAR筋注用キット10mg
用時 シグニフォーLAR筋注用キット20mg
用時 シグニフォーLAR筋注用キット30mg
用時 シグニフォーLAR筋注用キット40mg
採用 ジゴシン注0.25mg
採用 シスプラチン点滴静注10mg 「マルコ」
採用 シスプラチン点滴静注50mg 「マルコ」
採用 ジスロマック点滴静注用500mg
採用 シタラビン点滴静注液1g 「NIG」
採用 シタラビン点滴静注液400mg 「NIG」
採用 シナジス筋注液100mg
採用 シナジス筋注液50mg
採用 ジノプロスト注射液1000 μ g 「F」
用時 ジビイ静注用2000
用時 ジビイ静注用3000
用時 ジフォルタ注射液20mg
採用 ジプレキサ筋注用10mg
採用 シプロフロキサシン点滴静注液400mg 「ニプロ」
用時 シベノール静注70mg

区分 販売名
採用 シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」
採用 シムジア皮下注200mgオートクリックス
院外 シムジア皮下注200mgシリンジ
採用 シルガード9水性懸濁筋注シリンジ
採用 ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」
用時 シングリックス筋注用
採用 シンビット静注用50mg
採用 シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
院外 シンポニー皮下注50mgシリンジ
用時 スキリージ点滴静注600mg
用時 スキリージ皮下注360mgオートドージャー
用時 スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL
用時 ステラーラ点滴静注130mg
採用 ステラーラ皮下注45mgシリンジ
用時 ストレンジック皮下注28mg/0.7mL
用時 ストレンジック皮下注40mg/1mL
用時 ストレンジック皮下注80mg/0.8mL
用時 スミフェロン注DS300万IU
用時 スミフェロン注DS600万IU
採用 スルバシリン静注用1.5g
採用 スルバシリン静注用3g
採用 セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」
採用 セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」
採用 セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」
採用 セフォセフ静注用1g
採用 セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」
採用 セфтаジジム静注用1g「VTRS」
採用 セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」
採用 セフメタゾールNa静注用1g「NP」
用時 ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ
用時 ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ
用時 ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ
用時 ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ
用時 ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ
用時 セレザイム静注用400単位
用時 ソグルーヤ皮下注10mg
用時 ソグルーヤ皮下注5mg
採用 ソセゴン注射液15mg

区分	販売名
採用	ソナゾイド注射用16 μ L
用時	ソマチュリン皮下注120mg
用時	ソマチュリン皮下注90mg
用時	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル
用時	ソマバート皮下注用10mg
用時	ソマバート皮下注用20mg
採用	ゾラデックス1.8mgデポ
採用	ゾラデックス3.6mgデポ
採用	ゾラデックスLA10.8mgデポ
院外	ソリクア配合注ソロスター
用時	ソリリス点滴静注300mg
採用	ソル・コーテフ注射用100mg
採用	ソル・メドロール静注用1000mg
採用	ソル・メドロール静注用125mg
採用	ソル・メドロール静注用40mg
採用	ソル・メドロール静注用500mg
採用	ソルアセトF輸液(500mL)
採用	ソルデム1輸液(200mL)
採用	ソルデム1輸液(500mL)
採用	ソルデム3AG輸液(500mL)
採用	ソルデム3A輸液(200mL)
採用	ソルデム3A輸液(500mL)
採用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
採用	ソルマルト輸液(500mL)
採用	ゾレア皮下注150mgシリンジ
用時	ゾレア皮下注75mgシリンジ
採用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーフ」
用時	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)
用時	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2.5L)
用時	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2.5L排液用バッグ付)
用時	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2L)
用時	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(2L排液用バッグ付)
用時	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液(5L)
用時	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(1.5L排液用バッグ付)
用時	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(2.5L)
用時	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液(2L排液用バッグ付)
採用	ダイアモックス注射用500mg
用時	タイサブリ点滴静注300mg

区分 販売名
採用 タイロゲン筋注用0.9mg
採用 ダウノマイシン静注用20mg
採用 ダカルバジン注用100
用時 タケプロン静注用30mg
採用 タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」
採用 タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」
採用 ダットスキャン静注
採用 ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」
用時 ダラキューロ配合皮下注
用時 ダラザレックス点滴静注100mg
用時 ダラザレックス点滴静注400mg
採用 ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」
採用 ダルベポエチンアルファ注10 μ gシリンジ「KKF」
採用 ダルベポエチンアルファ注120 μ gシリンジ「KKF」
採用 ダルベポエチンアルファ注180 μ gシリンジ「KKF」
採用 ダルベポエチンアルファ注30 μ gシリンジ「KKF」
採用 ダルベポエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」
採用 ダントリウム静注用20mg
採用 タンボコール静注50mg
採用 チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」
用時 チラーヂンS静注液200 μ g
用時 テイコプラニン点滴静注用400mg「NP」
採用 デキサート注射液1.65mg
採用 デキサート注射液3.3mg
採用 デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
採用 デスモプレシン静注4 μ g「フェリング」
用時 テゼスパイア皮下注210mgシリンジ
用時 テセントリク点滴静注1200mg
採用 テタノブリンIH静注250単位
用時 デファイテリオ静注200mg
採用 デュピクセント皮下注300mgペン
用時 テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」
用時 テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」
採用 テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター
用時 テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付製品)
採用 テルフィス点滴静注(500mL)
採用 テルモ生食(1000mL)
採用 テルモ生食(500mL)

区分	販売名
用時	ドキシル注20mg
採用	ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」
採用	ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」
採用	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」
採用	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」
採用	ドパストン静注25mg
採用	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」
採用	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」
採用	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」
採用	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」
採用	ドプラム注射液400mg
採用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
採用	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
採用	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」
用時	トリセノックス点滴静注12mg
採用	トリビック
採用	トリフリード輸液(1000mL袋)
用時	トルツ皮下注80mgオートインジェクター
採用	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
採用	トレアキシシン点滴静注液100mg/4mL
採用	トレシーバ注フレックスタッチ
院外	トレシーバ注ペンフィル
用時	トレムフィア皮下注100mgシリンジ
採用	ドロレプタン注射液25mg
採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AFP」
用時	ナルベイン注2mg
採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」
採用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」
用時	ニコペリック腹膜透析液(2000mL)
用時	ニコペリック腹膜透析液(2000mL)(排液用バッグ付)
採用	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
採用	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」
採用	ニコリン注射液500mg
採用	ニトプロ持続静注液6mg
採用	ニトロール注5mgシリンジ
採用	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」
採用	ニューモバックスNPシリンジ
採用	ヌーカラ皮下注100mgペン

区分	販売名
採用	ネオシネジンコーワ注1mg
採用	ネオビタカイン注シリンジ5mL
採用	ネオファーゲン静注20mL
採用	ネオフィリン注250mg
用時	ネスプ注射液120 μ gプラシリンジ
用時	ネスプ注射液180 μ gプラシリンジ
用時	ネスプ注射液60 μ gプラシリンジ
採用	ノイアート静注用1500単位
用時	ノイトロジン注100 μ g(溶解液付)
用時	ノイトロジン注250 μ g(溶解液付)
用時	ノイトロジン注50 μ g(溶解液付)
採用	ノイロトロピン注射液3.6単位
採用	ノーベルバール静注用250mg
用時	ノバクトM静注用2000単位
用時	ノバントロン注20mg
用時	ノボエイト静注用1500
用時	ノボエイト静注用2000
用時	ノボエイト静注用250
用時	ノボエイト静注用3000
採用	ノボセブンHI静注用1mgシリンジ
用時	ノボセブンHI静注用2mgシリンジ
採用	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ
院外	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
用時	ノボラピッド30ミックス注ペンフィル
院外	ノボラピッド注100単位/mL
用時	ノボラピッド注イノレット
採用	ノボラピッド注フレックスタッチ
院外	ノボラピッド注ペンフィル
院外	ノボリン30R注フレックスペン
院外	ノボリンN注フレックスペン
採用	ノボリンR注フレックスペン
採用	ノルアドリナリン注1mg
採用	ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg
用時	ノルデイトロピンフレックスプロ注5mg
採用	パーサビブ静注透析用5mg
採用	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg
採用	パージェタ点滴静注420mg/14mL
院外	バイエッタ皮下注10 μ gペン300

区分 販売名
院外 バイエッタ皮下注5 μ gペン300
用時 ハイカムチン注射用1.1mg
用時 バイクロット配合静注用
用時 ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
用時 ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
用時 パオスクレー内痔核内注射用250mg
採用 バクトラミン注
採用 パクリタキセル注射液100mg「NP」
採用 パクリタキセル注射液30mg「NP」
用時 パドセブ点滴静注用30mg
採用 パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
用時 バビースモ硝子体内注射液120mg/mL
採用 ハプトグロビン静注2000単位「JB」
用時 バベンチオ点滴静注200mg
採用 ハラヴェン静注1mg
採用 パルタンM注0.2mg
採用 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」
採用 ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
採用 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
採用 パンテノール注500mg「KCC」
採用 ハンプ注射用1000
採用 ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」
採用 ビーフリード輸液(500mLバッグ)
用時 ビームゲン注0.25mL
用時 ビームゲン注0.5mL
用時 ビーリンサイト点滴静注用35 μ g
採用 ビヴラッツ点滴静注液150mg
採用 ビカーボン輸液
採用 ビカネイト輸液(1L)
採用 ビクシリン注射用0.25g
採用 ビクシリン注射用1g
採用 ビクトーザ皮下注18mg
採用 ビジパーク270注50mL
用時 ピシバニール注射用1KE(溶解液付)
用時 ピシバニール注射用5KE(溶解液付)
採用 ビダーザ注射用100mg
採用 ビタジェクト注キット
採用 ビタメジン静注用

区分 販売名
採用 ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」
採用 ピトレシン注射液20
採用 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」
採用 ピノルビン注射用10mg
採用 ピノルビン注射用30mg
採用 ピペラシリンNa注用2g「トーワ」
採用 ビムパット点滴静注100mg
採用 ヒューマリンR注100単位/mL
用時 ヒューマログミックス25注ミリオペン
採用 ヒューマログミックス50注ミリオペン
採用 ヒューマログ注ミリオペン
用時 ヒューマログ注ミリオペンHD
院外 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
採用 ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
用時 ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
用時 ビルテプソ点滴静注250mg
採用 ヒルナミン筋注25mg
用時 ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター
採用 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」
採用 ファセンラ皮下注30mgシリンジ
用時 ファブラザイム点滴静注用35mg
用時 ファブラザイム点滴静注用5mg
採用 ファモチジン注射液20mg「トーワ」
採用 フィジオ140輸液(500mL)
採用 フィジオ35輸液(250mL)
採用 ブイフェンド200mg静注用
採用 フィブリノゲンHT静注用1g「JB」
採用 フィプロガミンP静注用
採用 フィルグラスチムBS注150 μ gシリンジ「NIG」
用時 フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「NIG」
採用 フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「NIG」
用時 フェインジェクト静注500mg
採用 フェジン静注40mg
採用 フェソロデックス筋注250mg
採用 フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
採用 ブスルフェクス点滴静注用60mg
採用 ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」
採用 ブプレノルフィン注0.2mg「日新」

区分	販売名
用時	フラビタン注射液20mg
採用	プラリア皮下注60mgシリンジ
採用	プリズバインド静注液2.5g
採用	ブリディオ静注200mg
採用	フルービックHAシリンジ
採用	フルオレサイト静注500mg
採用	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
採用	フルオロウラシル注250mg「トーワ」
採用	フルコナゾール静注液100mg「サワイ」
用時	フルダラ静注用50mg
採用	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」
採用	フルマリンキット静注用1g
採用	フルマリン静注用0.5g
採用	プレアミン-P注射液
用時	ブレオ注射用15mg
採用	プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」
用時	プレバイミス点滴静注240mg
採用	プレベナー13水性懸濁注
用時	プログラフ注射液5mg
採用	プロジフ静注液100
採用	フロセミド注20mg「NIG」
採用	プロタノールL注0.2mg
採用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
採用	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」
採用	プロハンス静注シリンジ17mL
採用	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」
採用	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」
採用	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
採用	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
採用	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL
用時	ペガシス皮下注180 μ g
用時	ペガシス皮下注90 μ g
用時	ベクティビックス点滴静注100mg
用時	ベクティビックス点滴静注400mg
用時	ベスポンサ点滴静注用1mg
採用	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
採用	ベナンバックス注用300mg
採用	ベネフィクス静注用1000

区分 販売名
用時 ベネフィクス静注用2000
用時 ベネフィクス静注用500
採用 ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL
採用 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
採用 ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
採用 ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」
採用 ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
採用 ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」
採用 ヘブスブリンIH静注1000単位
採用 ヘブスブリン筋注用200単位
採用 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL
採用 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL
用時 ヘムライブラ皮下注105mg
用時 ヘムライブラ皮下注150mg
用時 ヘムライブラ皮下注30mg
用時 ヘムライブラ皮下注60mg
用時 ヘムライブラ皮下注90mg
採用 ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」
採用 ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」
用時 ベリナートP静注用500
用時 ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
用時 ポートラーザ点滴静注液800mg
採用 ホストイン静注750mg
採用 ボスミン注1mg
用時 ボックスゾゴ皮下注用0.4mg
用時 ボックスゾゴ皮下注用0.56mg
用時 ボックスゾゴ皮下注用1.2mg
用時 ポテリジオ点滴静注20mg
採用 ボトックス注用50単位
採用 ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL
採用 ポプスカイン0.5%注50mg/10mL
採用 ポプスカイン0.75%注75mg/10mL
採用 ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」
用時 ポライビー点滴静注用140mg
用時 ポライビー点滴静注用30mg
採用 ポララミン注5mg
採用 ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」
採用 ボルベン輸液6%(シングルポート)

区分 販売名
用時 ボンベンディ 静注用1300
採用 マーカイン注脊麻用0.5%高比重
採用 マーカイン注脊麻用0.5%等比重
用時 マイトマイシン注用2mg
用時 マキサカルシトール静注透析用5 μ g「NIG」
採用 マキュエイド眼注用40mg
採用 マグセント注100mL
採用 マグネスコープ静注38%シリンジ15mL
用時 マンジャロ皮下注10mgアテオス
用時 マンジャロ皮下注12.5mgアテオス
用時 マンジャロ皮下注15mgアテオス
採用 マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
採用 マンジャロ皮下注5mgアテオス
用時 マンジャロ皮下注7.5mgアテオス
採用 ミオテクター冠血管注
採用 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
採用 ミダゾラム注射液10mg「NIG」
採用 ミダフレッサ静注0.1%
用時 ミチーガ皮下注用60mgシリンジ(旧製品：注射針を同梱していない)
用時 ミッドペリックL135腹膜透析液(2.5L)
用時 ミッドペリックL135腹膜透析液(2L排液用バッグ付)
用時 ミッドペリックL250腹膜透析液(2.5L)
用時 ミッドペリックL250腹膜透析液(2L排液用バッグ付)
採用 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」
採用 ミラクリッド注射液5万単位
用時 ミリプラ動注用70mg
用時 ミリプラ用懸濁用液4mL
採用 ミルセラ注シリンジ100 μ g
用時 ミルセラ注シリンジ200 μ g
採用 ミルリノン注22.5mgバッグ「タカタ」
採用 メイロン静注7%(20mLアンプル)
採用 メイロン静注7%(250mLバッグ)
用時 メソトレキセート点滴静注液1000mg
採用 メソトレキセート点滴静注液200mg
採用 メチコバル注射液500 μ g
採用 メトクロプラミド注10mg「NIG」
採用 メドレニック注
院外 メドレニック注シリンジ

区分 販売名
用時 メルカゾール注10mg
採用 メロペネム点滴静注用0.5g「明治」
用時 メンクアッドファイ筋注
用時 モゾビル皮下注24mg
用時 モノヴァー静注1000mg
採用 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」
用時 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」
用時 ヤーボイ点滴静注液50mg
採用 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
用時 ユルトミリスHI点滴静注1100mg/11mL
用時 ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL
採用 ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
採用 ラクテック注(500mL)
採用 ラジカット点滴静注バッグ30mg
用時 ラスリテック点滴静注用1.5mg
用時 ラスリテック点滴静注用7.5mg
採用 ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
採用 ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg
採用 ランタスXR注ソロスター
採用 ランマーク皮下注120mg
院外 リキスミア皮下注300 μ g
採用 リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)
採用 リコモジュリン点滴静注用12800
用時 リスパダールコンスタ筋注用37.5mg
用時 リスパダールコンスタ筋注用50mg
採用 リスモダンP静注50mg
採用 リゾビスト注
用時 リツキサン点滴静注100mg
用時 リツキサン点滴静注500mg
採用 リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」
採用 リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」
採用 リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
採用 リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
採用 リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」
採用 リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」
採用 リノロサル注射液4mg(0.4%)
用時 リハビックス-K2号輸液
採用 リピオドール480注10mL

区分 販売名
用時 リプレガル点滴静注用3.5mg
採用 リメタゾン静注2.5mg
採用 リュープリンPRO注射用キット22.5mg
採用 リュープリンSR注射用キット11.25mg
採用 リュープリン注射用キット1.88mg
採用 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
採用 リン酸Na補正液0.5mmol/mL
用時 ルテストデポー注
採用 ルムジェブ注ミリオペン
採用 レギチーン注射液5mg
採用 レギュニールLCa1.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))
用時 レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2.5L)
用時 レギュニールLCa1.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))
用時 レギュニールLCa1.5腹膜透析液(5L)
用時 レギュニールLCa2.5腹膜透析液(1.5L(排液用バッグ付))
用時 レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2.5L)
用時 レギュニールLCa2.5腹膜透析液(2L(排液用バッグ付))
用時 レギュニールLCa2.5腹膜透析液(5L)
採用 レスピア静注・経口液60mg
用時 レパーサ皮下注140mgペン
用時 レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー
用時 レフィキシア静注用1000
用時 レフィキシア静注用2000
用時 レフィキシア静注用500
採用 レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」
用時 レベミル注イノレット
採用 レベミル注フレックスペン
採用 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
採用 レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」
採用 レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」
採用 レミケード点滴静注用100
採用 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
採用 ロイコボリン注3mg
用時 ロイナーゼ注用5000
採用 ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL
採用 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
用時 ロゼウス静注液40mg
採用 ロピオン静注50mg

区分 販売名
採用 エフェドリン「ナガキ」注射液40mg
採用 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
採用 乾燥まむし抗毒素「KMB」
採用 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
採用 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
採用 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」
採用 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」
採用 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
採用 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」
採用 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL
採用 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
採用 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
採用 献血グロベニン-I静注用5000mg
採用 献血ノンスロン500注射用
採用 献血ベニロン-I静注用5000mg
採用 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
採用 水溶性プレドニン10mg
採用 水溶性プレドニン20mg
採用 生食注シリンジ「オーツカ」10mL
採用 生食注シリンジ「オーツカ」20mL
採用 生理食塩液「ヒカリ」(1000mLプラスチックボトル広口開栓型)
採用 生理食塩液「ヒカリ」(20mLプラスチックアンプル)
採用 生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)
採用 大塚蒸留水(100mL瓶)
採用 大塚蒸留水(20mL管)
採用 大塚食塩注10%
採用 大塚生食注(100mL瓶)
採用 大塚生食注(250mL袋)
採用 大塚生食注(50mL瓶)
採用 大塚生食注2ポート100mL
採用 大塚糖液10%(20ml管)
採用 大塚糖液10%(500mL袋)
採用 大塚糖液20%(20mL管)
採用 大塚糖液5%(100mL瓶)
採用 大塚糖液5%(20mL管)
採用 大塚糖液5%(250mL袋)
採用 大塚糖液5%(500mL袋)
採用 大塚糖液5%(50mL瓶)

区分 販売名
採用 大塚糖液50%(200mL袋)
採用 大塚糖液50%(20mL管)
採用 大塚糖液50%(500mL袋)
採用 大塚糖液70%(350mL袋)
採用 注射用GHRP科研100
用時 注射用イホマイド1g
採用 注射用エンドキサン100mg
採用 注射用エンドキサン500mg
用時 注射用サイメリン100mg
用時 注射用サイメリン50mg
用時 注射用フィルデシン1mg
用時 注射用フィルデシン3mg
採用 注射用ペニシリンGカリウム100万単位
採用 注射用メソトレキセート50mg
採用 注射用メソトレキセート5mg
採用 注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型)
採用 注射用水バッグ「フソー」
採用 沈降破傷風トキソイド「生研」
採用 低分子デキストランL注(500mL)
用時 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
採用 動注用アイエーコール100mg
採用 無水エタノール注「フソー」
採用 硫酸Mg補正液1mEq/mL
用時 硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」
採用 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」