

採用区分	販売名
院外	アーリーダ錠60mg
用時	アイクルシグ錠15mg
採用	アイセントレス錠400mg
院外	アイドロイチン3%点眼液
院外	アイピーディカプセル100
院外	アイピーディドライシロップ5%
院外	アイベータ配合点眼液
院外	アイミクス配合錠HD
院外	アイミクス配合錠LD
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液
院外	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」
採用	亜鉛華軟膏「ニッコー」
院外	アカルボース錠50mg「サワイ」
院外	アキネトン錠1mg
院外	アクアチム軟膏1%
用時	アクトシン軟膏3%
用時	アグリリンカプセル0.5mg
院外	アコファイド錠100mg
採用	アサコール錠400mg
採用	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」
院外	アシノン錠150mg
院外	アジマイシン点眼液1%<製造番号 R008以降>
採用	亜硝酸アミル「AFP」
採用	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」
院外	アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」
院外	アジルバ錠10mg
採用	アジレクト錠1mg
院外	アスタット軟膏1%
採用	アズノールうがい液4%
採用	アズノール軟膏0.033%
採用	アスピラカリウム錠300mg
院外	アスピラ-CA錠200
採用	アスピリン「ホエイ」
採用	アスペリン散10%
採用	アスペリン錠10
院外	アスペリンシロップ0.5%
院外	アズマネックスツイストヘラー200 μg60吸入
採用	アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」
用時	アセチルスピラマイシン錠200
採用	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」
採用	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」
採用	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」
採用	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」
用時	アゼブチン錠1mg
採用	アゼルニジビン錠8mg「ケミファ」
採用	アゾセミド錠60mg「JG」
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液

院外	アダプチノール錠5mg
院外	アダラートCR錠10mg
院外	アタラックス-Pドライシロップ2.5%
院外	アテキュラ吸入用カプセル高用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル中用量
院外	アテキュラ吸入用カプセル低用量
採用	アテノロール錠25mg「日新」
採用	アデホスコーワ顆粒10%
院外	アデホスコーワ腸溶錠20
用時	アデムパス錠0.5mg
用時	アデムパス錠1.0mg
院外	アテレック錠5
院外	アドエア100ディスカス60吸入用
院外	アドエア250エアゾール120吸入用
院外	アドエア250ディスカス60吸入用
院外	アドエア500ディスカス60吸入用
院外	アドエア50エアゾール120吸入用
院外	アトーゼット配合錠HD
院外	アトーゼット配合錠LD
院外	アドフィードパップ40mg
採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
採用	日点アトロピン点眼液1%
院外	アナストロゾール錠1mg「トーワ」
院外	アナフラニール錠10mg
採用	アナフラニール錠25mg
院外	アニュイティ 100 $\mu\text{g}$ エリプタ30吸入用
院外	アニュイティ 200 $\mu\text{g}$ エリプタ30吸入用
院外	アノーロエリプタ30吸入用
院外	アフィニトール錠5mg
用時	アブストラル舌下錠100 $\mu\text{g}$
用時	アブストラル舌下錠200 $\mu\text{g}$
用時	アブストラル舌下錠400 $\mu\text{g}$
採用	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
用時	アプレゾリン錠10mg
採用	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」
採用	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」
用時	アポハイドローション20%
用時	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
採用	アミティーザカプセル12 $\mu\text{g}$
採用	アミティーザカプセル24 $\mu\text{g}$
院外	アミノレバソEN配合散
院外	アミュー配合顆粒
用時	アムノレイク錠2mg
院外	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」
採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」
採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」

採用	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」
院外	アメナリーフ錠200mg
採用	アモキシシリソルカプセル250mg「TCK」
採用	アモキシシリソル細粒20%「TCK」
用時	アラグリオ内用剤1.5g
院外	アラバ錠10mg
用時	アリケイス吸入液590mg
院外	アリッサ配合錠
採用	アリドネパッチ27.5mg
採用	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」
用時	アルギU配合顆粒
用時	アルケラン錠2mg
院外	アルサルミン内用液10%
採用	アルスロマチック関節手術用灌流液
採用	アルダクトンA細粒10%
院外	アルダクトンA錠50mg
採用	アルト原末(1g)
院外	アルドメット錠125
採用	アルドメット錠250
採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」
採用	アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」
採用	アルファロール内用液0.5μg/mL
採用	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」
院外	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%
院外	アルメタ軟膏
採用	アルロイドG内用液5%
院外	アレギサール点眼液0.1%
院外	アレグラ錠30mg
院外	アレサガテープ4mg
院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%
用時	アレセンサカプセル150mg
採用	アレビアチン散10%
採用	アレビアチン錠100mg
採用	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」
院外	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」
採用	アローゼン顆粒
院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
採用	アロプリノール錠100mg「アメル」
採用	アロプリノール錠50mg「アメル」
院外	アロマシン錠25mg
用時	アンコチル錠500mg
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)
採用	アンテベート軟膏0.05%
採用	アンテベートローション0.05%
採用	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」
院外	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」
採用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」
用時	アンペック坐剤10mg

用時	アンペック坐剤20mg
院外	EPLカプセル250mg
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
用時	イグザレルトOD錠10mg
用時	イグザレルトOD錠15mg
用時	イグザレルト錠2.5mg
院外	イクスタンジ錠40mg
院外	イクスタンジ錠80mg
院外	イグラチモド錠25mg「サワイ」
採用	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」
採用	イスコチン錠100mg
採用	イスツリサ錠1mg
採用	イソジンガーグル液7%
採用	イソジンシュガーパスタ軟膏
院外	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」
採用	イソバイドシロップ70%分包30mL
院外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
院外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」
採用	イトラコナゾール錠50mg「日医工」
採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」
採用	イナビル吸入粉末剤20mg
院外	イニシンク配合錠
採用	イノソリッド配合経腸用半固体剤
院外	イノラス配合経腸用液
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg
院外	イフェクサーSRカプセル75mg
院外	イフエンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」
院外	イブランス錠125mg
院外	イブランス錠25mg
用時	イマチニブ錠100mg「サワイ」
院外	イミグラン点鼻液20
院外	イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」
採用	イムノプラダー膀胱用80mg
用時	イムブルビカカプセル140mg
採用	イムラン錠50mg
院外	イリボー錠 $2.5\mu\text{g}$
院外	イリボー錠 $5\mu\text{g}$
採用	イルベサルタン錠100mg「トーワ」
院外	イルベサルタン錠200mg「トーワ」
採用	イルベサルタン錠50mg「トーワ」
院外	インヴェガ錠3mg
院外	インヴェガ錠6mg
採用	インクレミンシロップ5%
院外	インチュニブ錠1mg
院外	ツムラ菌ちん五苓散エキス顆粒(医療用)
院外	インテバンクリーム1%

院外	インテバン坐剤25
採用	インデラル錠10mg
用時	インライタ錠5mg
採用	ワインタミン細粒(10%)
院外	ヴォトリエント錠200mg
院外	ヴォリブリス錠2.5mg
用時	ウブレチド点眼液1%
院外	ウラリット配合錠
院外	ウリアデック錠40mg
採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg 「NIG」
採用	ウルソデオキシコール酸錠50mg 「NIG」
採用	ウルティプロ吸入用カプセル
院外	ウロカルン錠225mg
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)
院外	エイペリス点眼液0.002%
院外	エースコール錠2mg
院外	エカード配合錠LD
院外	エキザルベ
院外	エクセグラント散20%
院外	エクセグラント錠100mg
院外	エクフィナ錠50mg
院外	エクラープラスター20 μg/cm <sup>2</sup>
院外	エクリラ400 μgジェヌエア60吸入用
院外	エクロックゲル5%
用時	エコリシン眼軟膏
用時	エザルミア錠100mg
用時	エザルミア錠50mg
採用	エサンプトール錠250mg
院外	S・M配合散
採用	エスクレ坐剤「250」
院外	エスクレ注腸用キット「500」
採用	SG配合顆粒
採用	エシタロプラムOD錠10mg 「トーワ」
院外	エスピピクロン錠1mg 「DSEP」
院外	エスピピクロン錠3mg 「DSEP」
院外	エスタゾラム錠2mg 「アメル」
用時	エストラーナテープ0.09mg
用時	エストラーナテープ0.18mg
用時	エストラーナテープ0.36mg
院外	エストラーナテープ0.72mg
採用	SPトローチ0.25mg 「明治」
用時	エスワンタイホウ配合OD錠T20
用時	エスワンタイホウ配合OD錠T25
採用	エゼチミブOD錠10mg 「トーワ」
採用	エソメプラゾールカプセル20mg 「サワイ」
採用	消毒用エタノール液IP
採用	エチゾラム錠0.5mg 「アメル」

院外	エチゾラム錠1mg 「アメル」
院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
用時	エドルミズ錠50mg
採用	エナジア吸入用カプセル高用量
用時	エナジア吸入用カプセル中用量
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg 「トーワ」
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg 「トーワ」
採用	エナロイ錠2mg
採用	エネーボ配合経腸用液
採用	エネマスター注腸散
用時	エバスチンOD錠10mg 「NP」
用時	エバスチンOD錠5mg 「NP」
院外	エパデールEMカプセル2g
採用	エパルレストット錠50mg 「JG」
院外	エピナステチン塩酸塩LX点眼液0.1% 「SEC」
採用	エピナステチン塩酸塩錠20mg 「ケミファ」
用時	エピナステチン塩酸塩点眼液0.05% 「ニットー」
院外	エビリファイOD錠3mg
院外	エビリファイ錠1mg
院外	エピレオプチマル散50%
採用	エフィエントOD錠20mg
採用	エフィエント錠3.75mg
採用	エフィナコナゾール爪外用液10% 「科研」
用時	エプクルーサ配合錠
採用	エフピーOD錠2.5
採用	エブランチルカプセル15mg
採用	エプレレノン錠25mg 「杏林」
採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg 「NIG」
採用	エペレンゾ錠100mg
採用	エペレンゾ錠20mg
採用	エペレンゾ錠50mg
採用	MS温シップ 「タイホウ」
採用	MS冷シップ 「タイホウ」
採用	エムラクリーム
採用	エリキュース錠2.5mg
院外	エリキュース錠5mg
院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用
採用	エリスロシン錠200mg
採用	エリスロシンドライシロップW20%
院外	エルカルチンFF錠100mg
院外	エルカルチンFF錠250mg
院外	エルサメットS配合錠
採用	エルデカルシートールカプセル0.75μg 「サワイ」
用時	エルロチニブ錠100mg 「NK」
用時	エルロチニブ錠150mg 「NK」
院外	エルロチニブ錠25mg 「NK」
採用	エレンタール配合内用剤
採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤

採用	塩化カリウム徐放錠600mg 「St」
院外	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用
採用	エンシュア・H
院外	エンシュア・リキッド
採用	エンタカポン錠100mg 「トーワ」
採用	エンテカビル錠0.5mg 「EE」
用時	エンドキサン錠50mg
採用	エンレスト錠100mg
院外	エンレスト錠200mg
院外	エンレスト錠50mg
院外	オイラックスHクリーム
採用	オイラックスクリーム10%
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
院外	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入
採用	オーグメンチン配合錠250RS
院外	オキサトミドDS小児用2% 「サワイ」
院外	オキサロールローション25μg/g
採用	オキシコドン徐放カプセル10mg 「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル20mg 「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル40mg 「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル5mg 「テルモ」
用時	オキシコンチンTR錠10mg
用時	オキシコンチンTR錠5mg
採用	オキシドール 「ヨシダ」
採用	オキノーム散10mg
採用	オキノーム散2.5mg
採用	オキノーム散5mg
院外	オスポロット錠50mg
採用	オゼックス点眼液0.3%
採用	オセルタミビルカプセル75mg 「サワイ」
採用	オセルタミビルDS3% 「サワイ」
院外	オダイン錠125mg
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
院外	オテズラ錠10mg
院外	オテズラ錠20mg
院外	オテズラ錠30mg
院外	オドリック錠1mg
用時	オフェブカプセル100mg
用時	オフェブカプセル150mg
用時	オプスマット錠10mg
用時	オプソ内服液10mg
採用	オプソ内服液5mg
採用	オフロキサシン眼軟膏0.3% 「ニットー」
用時	オペプリム
用時	オムジャラ錠100mg(14錠瓶)
用時	オムジャラ錠150mg
用時	オムジャラ錠200mg

採用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」
院外	オメプラール錠20
採用	オラネジン液1.5%OR消毒用アブリケータ25mL
院外	オラペネム小児用細粒10%
採用	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」
採用	オランザピンOD錠5mg「トーワ」
採用	オリブ油「ヨシダ」
採用	オルケディア錠1mg
院外	オルケディア錠2mg
院外	オルケディア錠4mg
用時	オルセノン軟膏0.25%
院外	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用
採用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用
院外	オルミエント錠2mg
院外	オルミエント錠4mg
採用	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」
採用	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」
院外	オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」
院外	オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」
採用	オロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」
採用	オロパタジン点眼液0.1%「杏林」
採用	オンジェンティス錠25mg
用時	オンプレス吸入用カプセル150μg
院外	カイロック細粒40%
採用	ガスコン錠40mg
採用	ガスコンドロップ内用液2%
採用	ガストログラフィン経口・注腸用
用時	カタプレス錠75μg
採用	ガチフロ点眼液0.3%
採用	クラシエ葛根湯エキス細粒
院外	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒
採用	カデックス軟膏0.9%
院外	カデュエット配合錠4番
院外	カナグル錠100mg
用時	カナマイシンカプセル250mg「明治」
院外	カナリア配合OD錠
採用	ガバペン錠200mg
用時	ガバペン錠400mg
採用	カプトリル錠25mg
採用	カペシタビン錠300mg「サワイ」
採用	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」
採用	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」
用時	カボメティクス錠20mg
用時	カボメティクス錠60mg
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」

院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
採用	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」
採用	カリメート経口液20%
院外	カリメートドライシロップ92.59%
用時	カルケンス錠100mg
院外	カルスロット錠20
採用	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
採用	カルナクリン錠50
採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」
採用	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」
採用	カルベジロール錠10mg「トーワ」
採用	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」
採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」
院外	カルボシステインシロップ5%「JG」
採用	カルボシステインDS50%「タカタ」
用時	カログラ錠120mg
採用	カロナール細粒20%
採用	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」
採用	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)
採用	キシロカイン液「4%」
採用	キシロカインゼリー2%
採用	キシロカインビスカス2%
採用	キシロカインポンプスプレー8%
院外	キックリンカプセル250mg
採用	逆性石ケン液10「ヨシダ」
院外	キャブピリン配合錠
採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」
院外	キュバール100エアゾール
採用	希ヨードチンキ「ニッコー」
院外	クービビック錠25mg
採用	クービビック錠50mg
採用	グーフィス錠5mg
採用	クエチアピン錠100mg「日新」
採用	クエチアピン錠12.5mg「アメル」
採用	クエチアピン錠25mg「日新」
採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
院外	グラアルファ配合点眼液
院外	グラクティブ錠25mg
採用	グラクティブ錠50mg
採用	グラケーカプセル15mg
用時	グラセプターカプセル0.5mg
用時	グラセプターカプセル1mg

採用	グラナテック点眼液0.4%
採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ <sup>®</sup>
院外	クラビット点眼液0.5%
採用	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
院外	クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」
採用	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」
院外	グランダキシン錠50
院外	クリアナール錠200mg
採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL
採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL
採用	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL
採用	グリセリン「ケンエー」
採用	グリセリン「ニッコー」
採用	グリチロン配合錠
用時	クリプトン(81mKr)ジェネレータ
院外	グリミクロン錠40mg
院外	グリメサゾン軟膏
採用	グリメピリド錠0.5mg「NP」
採用	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」
採用	グルコンサンK細粒4mEq/g
院外	グルベス配合錠
院外	グレースピット細粒10%
用時	クレセンバカプセル100mg
院外	クレメジン速崩錠500mg
採用	クロチアゼパム錠5mg「トーア」
採用	クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
院外	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
院外	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」
採用	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」
院外	クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」
採用	クロマイ膣錠100mg
採用	クロマイ-P軟膏
院外	クロミッド錠50mg
採用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
院外	クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」
採用	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)
院外	ケイキサレートドライシロップ76%
院外	ツムラ桂枝加芍藥湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)
採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
採用	ケイツーシロップ0.2%
院外	K.C.L.エリキシル(10W/V%)
採用	ゲーベンクリーム1%
院外	ケタスカプセル10mg
院外	ケタス点眼液0.01%

採用	ケトコナゾールクリーム2%「JG」
採用	ケトコナゾールローション2%「JG」
院外	ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」
院外	ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」
採用	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」
用時	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」
採用	ケフラール細粒小児用100mg
採用	ケレンディア錠10mg
採用	ケレンディア錠20mg
採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
採用	コートリル錠10mg
院外	コールタイジン点鼻液
採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)
採用	コスパノンカプセル40mg
院外	コソプトミニ配合点眼液
採用	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」
院外	コムクロシャンプー0.05%
採用	コムレクス耳科用液1.5%
院外	コメリアンコーワ錠100
用時	コララン錠2.5mg
採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
院外	コレクチム軟膏0.25%
院外	コレクチム軟膏0.5%
用時	コレチメント錠9mg
院外	コレバインミニ83%
用時	コロンフォート内用懸濁液25%
院外	コンサー タ錠18mg
院外	コンサー タ錠27mg
院外	コントミン糖衣錠12.5mg
院外	コントミン糖衣錠25mg
院外	コンプラビン配合錠
用時	ザーコリカプセル200mg
用時	ザーコリカプセル250mg
院外	サーティカン錠0.25mg
院外	ザーネ軟膏0.5%
採用	サーファクテン気管注入用120mg
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)
院外	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒
院外	ザイティガ錠250mg
院外	ザイティガ錠500mg
院外	サイトテック錠200
院外	サイバインコ錠100mg
採用	サイプレジン1%点眼液
院外	クラシエ柴朴湯エキス細粒
採用	クラシエ柴苓湯エキス細粒
院外	サイレース錠2mg

用時	酢酸亜鉛顆粒5%「ノーベル」
採用	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」
院外	ザクラス配合錠HD
院外	ザクラス配合錠LD
院外	ザジテン点鼻液0.05%
用時	サデルガカプセル100mg
院外	サノレックス錠0.5mg
用時	サムスカOD錠15mg
院外	サムスカOD錠30mg
用時	サムスカOD錠7.5mg
用時	サムチレール内用懸濁液15%
院外	ザラカム配合点眼液
採用	サラザック配合顆粒
院外	サラジエン錠5mg
採用	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」
院外	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」
院外	サラゾピリン坐剤500mg
院外	サラゾピリン錠500mg
採用	サリグレンカプセル30mg
院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊
院外	サリベートエアゾール
院外	サルコートカプセル外用50μg
採用	サルタノールインヘラー100μg
採用	サルプレップ配合内用液
採用	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」
採用	サレドカプセル100
院外	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
採用	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)
採用	サンドールP点眼液
院外	サンピロ点眼液1%
採用	サンピロ点眼液2%
採用	ジアゼパム錠2mg「アメル」
採用	ジアゼパム錠5mg「アメル」
採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」
院外	シアリス錠5mg
用時	シーブリ吸入用カプセル50μg
用時	ツムラ紫雲膏
院外	ジェニナック錠200mg
採用	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」
院外	ジェミーナ配合錠
採用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」
用時	ジオトリフ錠20mg
用時	ジオトリフ錠30mg
用時	ジカディア錠150mg
採用	ジクアスLX点眼液3%
院外	ジクアス点眼液3%
採用	ジクトルテープ75mg

採用	シクレスト舌下錠5mg
採用	シクロスボリンカプセル10mg 「サンド」
採用	シクロスボリンカプセル25mg 「サンド」
院外	シクロスボリンカプセル50mg 「サンド」
採用	ジクロフェナクNa錠25mg 「トーワ」
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg 「JG」
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「JG」
院外	ジクロフェナクナトリウムテープ30mg 「ユートク」
院外	ジゴシン散0.1%
採用	ジスチグミン臭化物錠5mg 「NIG」
採用	ジスロマック細粒小児用10%
用時	ジスロマック錠600mg
用時	ジセレカ錠100mg
用時	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
用時	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
採用	シタフロキサシン錠50mg 「サワイ」
採用	シナール配合顆粒
採用	シナール配合錠
院外	ジピリダモール錠100mg 「トーワ」
採用	ジピリダモール錠25mg 「トーワ」
用時	シプロキサン錠200mg
採用	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg 「サワイ」
院外	シムビコートタービュヘイラー60吸入
院外	ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
用時	ジャイパーカ錠100mg
用時	ジャイパーカ錠50mg
用時	ジャカビ錠5mg
採用	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒
採用	ジャディアنس錠10mg
院外	ジャディアنس錠25mg
用時	臭化カリウム「ヤマゼン」
採用	重カマ「ヨシダ」
採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)
院外	ジュリナ錠0.5mg
院外	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)
採用	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg 「St」
採用	硝酸イソソルビドテープ40mg 「EMEC」
採用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)
採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg 「サワイ」
院外	ジルテック錠10
院外	ジルテック錠10
用時	ジルテックドライシロップ1.25%
用時	シルデナフィル錠20mgRE 「JG」

採用	ジレニアカプセル0.5mg
採用	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」
採用	シロドシンOD錠4mg「ケミファア」
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)
採用	人工涙液マイティア点眼液
用時	親水ワセリン「ホエイ」
院外	ジンタス錠50mg
院外	シンバスタチン錠5mg「SW」
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)
採用	新レシカルポン坐剤
院外	スイニー錠100mg
院外	スイニー錠100mg
採用	スインプロイク錠0.2mg
院外	スーグーラ錠25mg
院外	スージャヌ配合錠
用時	スーテントカプセル12.5mg
採用	スープレン吸入麻酔液
院外	スタレボ配合錠L100
院外	スタレボ配合錠L50
用時	スチバーガ錠40mg
採用	ステリゾール液2%
院外	ストラテラカプセル10mg
院外	ストラテラカプセル25mg
院外	ストラテラカプセル40mg
採用	ストロカイン錠5mg
用時	ストロメクトール錠3mg
用時	スニチニブ錠12.5mg「NK」
院外	スピール膏M
採用	スピオルトレスピマット60吸入
採用	スピリーバ2.5 μgレスピマット60吸入
院外	スピリーバ吸入用カプセル18 μg
採用	スピロノラクトン錠25mg「日医工」
院外	スピロペント錠10 μg
採用	ズファジラン錠10mg
採用	スマトリップタン錠50mg「アメル」
用時	スミスリンローション5%
採用	スルピリド錠50mg「サワイ」
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
用時	ゼスラン錠3mg
院外	ゼスラン小児用細粒0.6%
院外	ゼスラン小児用シロップ0.03%
院外	セタネオ点眼液0.002%
院外	セディール錠10mg
採用	セパミット-R細粒2%
院外	ゼビアックスローション2%
採用	セファドール錠25mg

採用	セファランチン錠1mg
採用	セファレキシンカプセル250mg「トーワ」
用時	ゼフィックス錠100
採用	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
院外	セフジトレン ピボキシル錠100mg「SW」
院外	セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「SW」
院外	セフゾン細粒小児用10%
院外	ゼフナート外用液2%
院外	ゼフナートクリーム2%
採用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
用時	セムブリックス錠20mg
用時	セムブリックス錠40mg
採用	セルセプトカプセル250
院外	セルタッチパップ70
採用	セルトラリンOD錠25mg「アメル」
院外	セルニルトン錠
採用	ゼルフォーム(No.12)
院外	ゼルヤンツ錠5mg
院外	セレクトール錠200mg
採用	セレコキシブ錠100mg「オーハラ」
採用	セレコキシブ錠200mg「オーハラ」
用時	セレスタミン配合シロップ
採用	セレニカR顆粒40%
院外	セレネース錠0.75mg
採用	セレネース錠1.5mg
院外	セレネース錠3mg
院外	セレベント50ディスカス
院外	セロケンL錠120mg
院外	セロシオンカプセル10
用時	ゼンタコートカプセル3mg
採用	センノシド錠12mg「トーワ」
院外	ソーティクツ錠6mg
院外	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)
用時	ゾスパタ錠40mg
採用	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」
採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」
院外	ゾニサミド散20%「アメル」
採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」
採用	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」
採用	ゾビラックス眼軟膏3%
採用	ゾビラックス錠200
採用	ソフラチュール貼付剤10cm
院外	ゾフルーザ顆粒2%分包
用時	ゾフルーザ錠20mg
院外	ソランタール錠100mg
採用	ソリタ-T配合顆粒3号
採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」
院外	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」

用時	ゾリンザカプセル100mg
採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」
院外	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」
院外	ソレトン錠80
用時	ターゼナカプセル0.25mg
用時	ターゼナカプセル1mg
用時	ダーブロック錠1mg
採用	ダーブロック錠2mg
院外	ダーブロック錠4mg
院外	ダーブロック錠6mg
院外	ダイアコート軟膏0.05%
採用	ダイアップ坐剤4
採用	ダイアップ坐剤6
採用	ダイアモックス錠250mg
用時	タイケルブ錠250mg
採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
採用	「山善」第二リン灰
院外	タウリン散98%「大正」
採用	ダクチル錠50mg
用時	タグリッソ錠80mg
院外	タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」
院外	タケキャブOD錠10mg
採用	タケキャブOD錠20mg
院外	タケルダ配合錠
採用	タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm 1枚(フラットタイプ: レギュラーサイズ)
用時	ダサニブ錠20mg「NK」
採用	ダサニブ錠50mg「NK」
用時	タシグナカプセル150mg
用時	タシグナカプセル200mg
院外	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」
院外	タダラフィル錠20mgAD「杏林」
用時	タナドーパ顆粒75%
院外	タナトリル錠5
用時	タバリス錠100mg
用時	タバリス錠150mg
用時	ダフクリア錠200mg
院外	タブコム配合点眼液
用時	タブネオスカプセル10mg
採用	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」
院外	タプロスミニ点眼液0.0015%
採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
院外	タモキシフェン錠20mg「DSEP」
採用	ダラシンカプセル150mg
採用	タリージェOD錠15mg
採用	タリージェOD錠5mg
院外	タリムス点眼液0.1%
採用	タルチレリンOD錠5mg「JG」
採用	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末

採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」
採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
院外	炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」
採用	単シロップ
採用	ダントリウムカプセル25mg
採用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」
院外	チアブリド細粒10%「サワイ」
採用	チアブリド錠25mg「NIG」
採用	0.025W/V%チアミートール水
採用	チウラジール錠50mg
院外	チガソンカプセル10
院外	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」
採用	チザニジン錠1mg「日医工」
院外	チモプトール点眼液0.25%
採用	チモロール点眼液0.5%「ティカ」
用時	チャンピックス錠0.5mg
用時	チャンピックス錠1mg
院外	クラシエ猪苓湯エキス細粒
採用	チラーチンS錠25 μg
採用	チラーチンS錠50 μg
用時	5mcgチロナミン錠
採用	沈降炭酸カルシウム「ケンエー」
採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
採用	ツイミーグ錠500mg
用時	ツインラインNF配合経腸用液
院外	ツートラム錠25mg
院外	ツベルミン錠100mg
採用	ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」
採用	ツロブテロールテープ1mg「VTRS」
採用	ツロブテロールテープ2mg「VTRS」
採用	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」
採用	ディスオーパ消毒液0.55%
院外	ディナゲスト錠0.5mg
院外	ディビゲル1mg
院外	ディフェリングル0.1%
院外	ディレグラ配合錠
院外	デエビゴ錠10mg
採用	デエビゴ錠2.5mg
採用	デエビゴ錠5mg
院外	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」
用時	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」
採用	テオロング錠100mg
採用	デカドロン錠0.5mg
採用	デカドロン錠4mg
採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」
採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」
用時	テクフィデラカプセル120mg
用時	テクフィデラカプセル240mg

採用	テグレトール細粒50%
採用	テグレトール錠100mg
採用	デシコビ配合錠HT
採用	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg 「フェリング」
用時	デソパン錠60mg
院外	デタントール0.01%点眼液
院外	テトラミド錠10mg
院外	テネリアOD錠20mg
院外	テノーミン錠50
院外	テノゼット錠300mg
採用	デノタスチアブル配合錠
採用	デパケンR錠100mg
採用	デパケンR錠200mg
採用	デパケンシロップ5%
院外	デフェラシロクス顆粒分包360mg 「サンド」
用時	テプミトコ錠250mg
採用	テプレノンカプセル50mg 「トーワ」
院外	テプレノン細粒10% 「トーワ」
院外	デベルザ錠20mg
用時	デムーカカプセル250mg
用時	テモゾロミド錠100mg 「NK」
用時	テモゾロミド錠20mg 「NK」
院外	デュアック配合ゲル
院外	デュオトラバ配合点眼液
採用	デュタステリドカプセル0.5mgAV 「トーワ」
院外	デュファストン錠5mg
採用	デュロキセチンOD錠20mg 「ニプロ」
院外	テリルジー100エリプタ14吸入用
採用	テリルジー100エリプタ30吸入用
院外	テリルジー200エリプタ14吸入用
採用	テリルジー200エリプタ30吸入用
採用	テルビナфин塩酸塩外用液1% 「サワイ」
採用	テルビナфин塩酸塩クリーム1% 「JG」
院外	テルビナфин錠125mg 「サワイ」
採用	テルミサルタン錠20mg 「ニプロ」
採用	テルミサルタン錠40mg 「ニプロ」
院外	テルミサルタン錠80mg 「ニプロ」
院外	テレミンソフト坐薬2mg
採用	トアラセット配合錠「オーハラ」
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
採用	トウモロコシデンプン 「ヨシダ」
採用	ドキサゾシン錠0.5mg 「トーワ」
採用	ドキサゾシン錠1mg 「トーワ」
院外	ドキサゾシン錠2mg 「トーワ」
院外	ドキサゾシン錠4mg 「トーワ」

院外	ドグマチール錠100mg
採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」
採用	トスフロキサシントシリ酸塩細粒小児用15%「トーワ」
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
採用	ドパコール配合錠L100
用時	ドバストン散98.5%
院外	トビエース錠4mg
院外	トピナ錠50mg
採用	ドブスOD錠100mg
用時	ドブテレット錠20mg
採用	トブラシン点眼液0.3%
院外	トフラニール錠10mg
院外	ドボネックス軟膏50μg/g
院外	ドボベットゲル
院外	ドボベット軟膏
院外	ドボベットフォーム
院外	ドラール錠15
院外	トラセミドOD錠4mg「TE」
採用	トラゼンタ錠5mg
採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
院外	トラディアنس配合錠AP
院外	トラディアنس配合錠BP
採用	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」
採用	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
院外	トラベルミン配合錠
院外	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」
採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」
採用	トランサミン散50%
採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」
院外	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」
院外	トリキュラー錠28
採用	トリクロリールシロップ10%
採用	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」
院外	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」
院外	トリプタノール錠10
院外	トリプタノール錠25
採用	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「NIG」
採用	トリメブチニンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
院外	トリンテリックス錠10mg
用時	トルカブ錠160mg
用時	トルカブ錠200mg
採用	トルソプト点眼液1%
採用	トルバブタンOD錠15mg「トーワ」
採用	トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」
採用	ドルモロール配合点眼液「わかもと」
採用	トレーランG液50g

採用	トレーランG液75g
院外	トレリーフOD錠50mg
採用	トロピカミド点眼液0.4%「日点」
採用	トロンビン液モチダソフトボトル1万
採用	経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」
採用	ドンペリドン錠10mg「NIG」
採用	ナイキサン錠100mg
院外	ナウゼリンOD錠10
採用	ナウゼリン坐剤10
採用	ナウゼリン坐剤30
院外	ナウゼリンドライシロップ1%
採用	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」
採用	ナゼアOD錠0.1mg
院外	ナディック錠30mg
院外	ナテグリニド錠90mg「日医工」
採用	ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」
院外	ナラトリピタン錠2.5mg「KO」
用時	ナルサス錠12mg
用時	ナルサス錠2mg
採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」
用時	ナルラピド錠1mg
用時	ナルラピド錠4mg
用時	ニコチネルTTS10
用時	ニコチネルTTS20
用時	ニコチネルTTS30
採用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」
採用	ニコランジル錠5mg「サワイ」
採用	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
採用	ニトラゼパム錠5mg「NIG」
採用	ニトロベン舌下錠0.3mg
院外	ニバジール錠2mg
院外	ニバジール錠4mg
院外	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」
院外	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」
採用	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
院外	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」
採用	ニフラン点眼液0.1%
採用	ニフレック配合内用剤
採用	乳酸カルシウム「VTRS」原末
採用	乳糖水和物「ホエイ」
院外	ニュープロパッチ13.5mg
院外	ニュープロパッチ2.25mg
採用	ニュープロパッチ4.5mg
院外	ニュープロパッチ9mg
院外	ニューレプチル細粒10%
採用	ニューレプチル錠5mg
院外	ニュベクオ錠300mg
採用	尿素クリーム20%「SUN」

院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒
用時	ニンラーロカプセル2.3mg
用時	ニンラーロカプセル3mg
用時	ニンラーロカプセル4mg
採用	ネイサート坐剤
院外	ネイリンカプセル100mg
用時	ネオーラル25mgカプセル
用時	ネオーラル50mgカプセル
用時	ネオーラル内用液10%
院外	ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)
採用	ネオシネジンコーウ5%点眼液
採用	ネオ消アル「ヨシダ」
院外	ネオフィリン錠100mg
採用	ネオメドロールEE軟膏
用時	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
用時	ネクサバール錠200mg
採用	ネシーナ錠12.5mg
院外	ネシーナ錠25mg
院外	ネシーナ錠6.25mg
院外	ネリゾナ軟膏0.1%
院外	ノアルテン錠(5mg)
採用	ノイロトロピン錠4単位
用時	ノウリアスト錠20mg
院外	ノックビン原末
採用	ノバミン錠5mg
院外	ノルスパンテープ10mg
院外	ノルスパンテープ5mg
採用	ハーフジゴキシンKY錠0.125
用時	ハーボニー配合錠
院外	バイアグラ錠50mg
採用	バイアスピリン錠100mg
採用	ハイドレアカプセル500mg
用時	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)
院外	ハイパジールコーウ点眼液0.25%
採用	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」
院外	パキシルCR錠12.5mg
院外	パキシルCR錠25mg
採用	パキロビッドパック300
採用	パキロビッドパック600
採用	バクスミー点鼻粉末剤3mg
採用	バクトラミン配合顆粒
採用	バクトラミン配合錠
用時	バクトロバン鼻腔用軟膏2%
採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
院外	バソメット錠1mg
院外	バソレーターテープ27mg
院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒
採用	ハッカ油「ケンエー」

用時	パッチテスト試薬金属塩化亜鉛2%
用時	パッチテスト試薬金属塩化アルミニウム2%
用時	パッチテスト試薬金属塩化金酸0.2%
用時	パッチテスト試薬金属塩化コバルト2%
用時	パッチテスト試薬金属塩化第二水銀0.05%
用時	パッチテスト試薬金属塩化第二スズ1%
用時	パッチテスト試薬金属塩化第二鉄2%
用時	パッチテスト試薬金属塩化白金酸0.5%
用時	パッチテスト試薬金属塩化パラジウム1%
用時	パッチテスト試薬金属塩化マンガン2%
用時	パッチテスト試薬金属三塩化インジウム1%
用時	パッチテスト試薬金属臭化銀2%
用時	パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム0.5%
用時	パッチテスト試薬金属四塩化イリジウム1%
用時	パッチテスト試薬金属硫酸銅1%
用時	パッチテスト試薬金属硫酸ニッケル5%
用時	パッチテストパネル(S)
院外	バナンドライシロップ5%
用時	パニマイシン点眼液0.3%
院外	バフセオ錠150mg
院外	バフセオ錠300mg
採用	バラシクロビル顆粒50%「トーワ」
採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」
採用	バラマイシン軟膏
採用	バラミヂンカプセル300mg
採用	バリエース発泡顆粒
採用	バリキサ錠450mg
採用	バリテスターA240散
院外	ハルシオン0.25mg錠
採用	パルタノM錠0.125mg
院外	バルバーサ錠3mg
院外	バルバーサ錠4mg
院外	バルバーサ錠5mg
採用	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
院外	バルミコート200μgタービュヘイラ-56吸入
院外	バルモディアXR錠0.2mg
院外	バルモディアXR錠0.4mg
採用	バルモディア錠0.1mg
院外	ハルロピテープ24mg
採用	ハルロピテープ8mg
採用	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」
採用	パロキセチンOD錠20mg「トーワ」
院外	パロキセチンOD錠5mg「トーワ」
院外	パロキセチン錠5mg「トーワ」
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒
採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」

用時	バンコマイシン眼軟膏1%
採用	パンテチン錠100mg 「シオエ」
採用	調剤用パンビタン末
採用	ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV 「わかもと」
採用	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1% 「トーワ」
院外	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1% 「日点」
院外	ヒアレイン点眼液0.3%
院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%
採用	PA・ヨード点眼・洗眼液
採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
院外	ピーゼットシー糖衣錠2mg
院外	ピートル顆粒分包250mg
院外	ピートルチュアブル錠250mg
採用	ヒーロン眼粘弾剤1%シリソジ0.6mL
用時	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリソジ0.6mL
採用	ピオグリタゾンOD錠15mg 「トーワ」
院外	ビオスリー配合散
採用	ビオスリー配合錠
院外	ビオチン散0.2% 「フソー」
採用	ビオフェルミンR散
院外	ビオフェルミンR錠
採用	ビカルタミドOD錠80mg 「ケミファ」
院外	ビクシリソカプセル250mg
採用	ピコスルファートNa内用液0.75% 「NIG」
用時	ビジクリア配合錠
採用	ビスコート0.5眼粘弾剤
院外	ビソノテープ2mg
採用	ビソノテープ4mg
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg 「サワイ」
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 「サワイ」
院外	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg 「トーワ」
採用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg 「トーワ」
用時	ビタミンB6散10% 「マルイシ」
院外	ビタメジン配合カプセルB25
採用	ビダラビン軟膏3% 「SW」
院外	ヒダントールF配合錠
院外	ヒダントール錠25mg
採用	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg 「DSEP」
採用	ヒドロキシジンバモ酸塩錠25mg 「日新」
採用	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg 「トーワ」
院外	ビビアント錠20mg
採用	ビブラマイシン錠100mg
院外	ビベスピエアロスフィア120吸入
院外	ビペリデン塩酸塩錠2mg 「サワイ」
用時	ピマリシン眼軟膏1% 「センジュ」
用時	ピマリシン点眼液5% 「センジュ」
採用	ビムパット錠50mg

院外	ビムパットドライシロップ10%
院外	ピメノールカプセル50mg
採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」
院外	クラシエ白虎加入参湯エキス細粒
院外	ビラノア錠20mg
用時	ビラフトビカプセル50mg
用時	ビラフトビカプセル75mg
採用	ピラマイド原末
採用	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」
採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」
院外	ビルダグリブチン錠50mg「サワイ」
院外	ビルタサ懸濁用散分包8.4g
院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
院外	ヒルドイドフォーム0.3%
採用	ヒルドイドローション0.3%
用時	ビルトリシド錠600mg
院外	ヒルナミン錠(5mg)
用時	ピルフェニドン錠200mg「日医工」
院外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入
採用	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
院外	ピレチア錠(25mg)
採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」
院外	ビンダケルカプセル20mg
院外	ビンマックカプセル61mg
用時	ファビハルタカプセル200mg
用時	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」
採用	ファモチジン散10%「サワイ」
採用	ファモチジンD錠10mg「EMEC」
採用	ファモチジンD錠20mg「EMEC」
院外	ファロム錠200mg
院外	ファロムドライシロップ小児用10%
採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL
採用	フィコンパ錠2mg
用時	フィコンパ錠4mg
院外	ブイタマークリーム1%
採用	フィプラスストスプレー500
用時	フィンテプラ内用液2.2mg/mL
院外	フェアストン錠40
採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」
採用	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」
院外	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
院外	フェノバールエリキシル0.4%
採用	フェノバール散10%
採用	フェノバール錠30mg
採用	フェノフィブラー錠80mg「武田テバ」
採用	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」
院外	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」
院外	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」

採用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
採用	フェロ・グラデュメット錠105mg
採用	フェロベリン配合錠
採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」
用時	フェントステープ0.5mg
用時	フェントステープ1mg
用時	フェントステープ4mg
採用	フォシーガ錠10mg
採用	フォシーガ錠5mg
院外	フォゼベル錠10mg
院外	フォゼベル錠20mg
院外	フォゼベル錠5mg
採用	フォリアミン錠
用時	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
採用	ブコラム口腔用液10mg
採用	ブコラム口腔用液2.5mg
採用	ブコラム口腔用液5mg
採用	ブコラム口腔用液7.5mg
採用	フスコデ配合錠
院外	ブセレリン点鼻液0.15%「F」
採用	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」
採用	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」
用時	プラザキサカプセル110mg
用時	プラザキサカプセル75mg
採用	フラジール腔錠250mg
採用	フラジール内服錠250mg
院外	プラダロン錠200mg
院外	プラノバール配合錠
院外	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」
院外	プラビックス錠25mg
採用	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」
院外	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」
院外	フランドル錠20mg
院外	プランルカスト錠112.5mg「AFP」
採用	プランルカスト錠225mg「AFP」
採用	プランルカストDS10%「タカタ」
採用	ブリィビアクト錠25mg
院外	フリバスOD錠75mg
院外	プリビナ液0.05%
院外	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」
採用	プリモボラン錠5mg
採用	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」
採用	プリンペラン錠5
採用	フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」
採用	フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」
院外	ブルキンザカプセル80mg
採用	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」

採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
用時	フルタイド100ディスカス
院外	フルタイド100μgエアゾール60吸入用
用時	フルタイド200ディスカス
採用	フルタイド50μgエアゾール120吸入用
採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」56噴霧用
採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用
院外	フルティフォーム50エアゾール56吸入用
用時	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
院外	ブルフェン錠100
院外	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」
採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」
採用	フルミスト点鼻液
院外	フルメタ軟膏
院外	フルメタローション
採用	フレカニド酢酸塩錠50mg「KO」
採用	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」
採用	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」
採用	プレグランディン腔坐剤1mg
院外	プレディニン錠50
採用	プレドニゾロン散「タケダ」1%
採用	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
採用	プレドニゾロン錠2.5mg「NP」
院外	プレドニン眼軟膏
採用	プレドニン錠5mg
用時	プレドネマ注腸20mg
用時	プレバイミス錠240mg
院外	プレマリン錠0.625mg
院外	プレミネット配合錠HD
院外	プレミネット配合錠LD
採用	プロウペス腔用剤10mg
院外	プロクトセディル坐薬
採用	プロクトセディル軟膏
採用	プログラフカプセル0.5mg
採用	プログラフカプセル1mg
院外	プログラフ顆粒0.2mg
院外	フロジン外用液5%
院外	プロスターL錠50mg
用時	プロスター錠25
採用	プロスタグラジンE2錠0.5mg「科研」
採用	プロスタンディン軟膏0.003%
採用	フロセミド細粒4%「EMEC」
採用	フロセミド錠10mg「NP」
採用	フロセミド錠20mg「NIG」
採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用
採用	プロナーゼMS
院外	プロナンセリン錠4mg「アメル」

院外	プロノン錠150mg
院外	プロペシア錠0.2mg
院外	プロペシア錠1mg
採用	プロペト
院外	プロベラ錠2.5mg
用時	フロベン顆粒8%
用時	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg
採用	プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」
採用	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
院外	プロムペリドール錠1mg「アメル」
院外	プロムペリドール錠3mg「アメル」
用時	プロメライン軟膏5万単位/g
用時	プロモクリップチン錠2.5mg「トーワ」
用時	フロリードゲル経口用2%
採用	フロリード腔坐剤100mg
院外	フロリードDクリーム1%
採用	フロリネフ錠0.1mg
院外	ベージニオ錠100mg
院外	ベージニオ錠150mg
院外	ベージニオ錠50mg
採用	ベオーバ錠50mg
採用	ベサコリン散5%
院外	ベザトールSR錠200mg
用時	ベサノイドカプセル10mg
採用	ベストロン点眼用0.5%
院外	ベセルナクリーム5%
採用	ベタセレミン配合錠
院外	ベタニス錠25mg
院外	ベタニス錠50mg
採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」
採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
院外	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」
採用	ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」
採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
用時	ベネクレクスタ錠100mg
用時	ベネクレクスタ錠10mg
用時	ベネクレクスタ錠50mg
院外	ベネット錠17.5mg
院外	ベネット錠75mg
採用	ベノキシール点眼液0.4%
採用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」
採用	ヘパンED配合内用剤
院外	ベピオウォッシュゲル5%
院外	ベピオローション2.5%
院外	ベプリコール錠100mg
採用	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
採用	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」

採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
採用	ペムリディ錠25mg
採用	ヘモポリゾン軟膏
院外	ペラサスLA錠60μg
用時	ペラゾリン細粒400mg
採用	ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
採用	ペラプロストNa錠20μg「VTRS」
院外	ペリアクチンシロップ0.04%
院外	ベリキューボ錠10mg
採用	ベリキューボ錠2.5mg
院外	ベリキューボ錠5mg
院外	ベリチーム配合顆粒
用時	ベリプラスTPコンビセット組織接着用0.5mL製剤
院外	ペルジピンLAカプセル20mg
院外	ペルジピンLAカプセル40mg
採用	ペルソムラ錠15mg
採用	ペルソムラ錠20mg
採用	ペルベゾロンF点眼・点鼻液
院外	ヘルベッサー錠30
用時	ペルマックス錠250μg
用時	ペレキシブル錠80mg
採用	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
院外	ペロテックエロゾル100
採用	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」
用時	ペンタサ顆粒94%
院外	ペンタサ坐剤1g
院外	ペンタサ注腸1g
用時	ベンレステープ18mg
用時	ボイデヤ錠50mg
院外	ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
採用	ボースデル内用液10
院外	ホーリン錠1mg
採用	ホーリンV腔用錠1mg
院外	ホクナリンテープ0.5mg
院外	ホクナリンテープ1mg
院外	ホクナリンテープ2mg
院外	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
採用	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」
採用	ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」
用時	ボシュリフ錠100mg
院外	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」
院外	ホスマシンS耳科用3%
採用	ボスミン外用液0.1%
採用	ホスリボン配合顆粒
採用	ボセンタン錠62.5mg「VTRS」
用時	ボチシート20%
採用	クラシエ補中益氣湯エキス細粒

院外	ボノサップパック400
院外	ボノサップパック800
院外	ボノテオ錠1mg
院外	ボノピオンパック
採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」
採用	ポピヨドングル10%
採用	ポピヨドンスクラブ7.5%
用時	ポマリストカプセル2mg
用時	ポマリストカプセル3mg
用時	ポマリストカプセル4mg
院外	ポラキス錠3
採用	ボラザG軟膏
採用	ボラプレジンクOD錠75mg「サワイ」
院外	ボララミンドライシロップ0.2%
用時	ボリコナゾール錠200mg「トーワ」
採用	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」
採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g <ハチ>
採用	ポリフル錠500mg
院外	ボルタレンSRカプセル37.5mg
院外	ボルタレンサポ25mg
採用	ボルタレンローション1%
採用	ボルヒール組織接着用(3mL)
採用	ボルヒール組織接着用(5mL)
院外	ボンアルファクリーム2μg/g
院外	ボンアルファ軟膏2μg/g
院外	ボンアルファハイ軟膏20μg/g
院外	ボンアルファハイローション20μg/g
院外	ボンアルファローション2μg/g
用時	ボンゾール錠100mg
院外	ポンタールシロップ3.25%
院外	マーテュオックス軟膏
院外	マイコスポールクリーム1%
院外	マイザークリーム0.05%
採用	マイザーソフト0.05%
院外	マイスタン細粒1%
院外	マイスタン細粒1%
採用	マイスタン錠5mg
用時	マイテラーゼ錠10mg
用時	マイトイシン眼科外用液用2mg
用時	マヴィレット配合錠
院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
採用	マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」
院外	ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)
採用	マグコロール散68%分包50g
用時	0.02W/V%マスキン水
採用	マスキンスクラブ4%

院外	マドパー配合錠L100
用時	マブリン散1%
院外	マリゼブ錠12.5mg
院外	マリゼブ錠25mg
採用	ミオコールスプレー0.3mg
院外	ミオピン点眼液
院外	ミカトリオ配合錠
院外	ミカムロ配合錠AP
院外	ミカムロ配合錠BP
院外	ミグシス錠5mg
採用	ミグリトールOD錠25mg 「サワイ」
採用	ミグリトールOD錠50mg 「サワイ」
用時	小児用ミケラン細粒0.2%
院外	ミケルナ配合点眼液
用時	ミコブティンカプセル150mg
院外	ミコンビ配合錠AP
院外	ミコンビ配合錠BP
採用	ミチグリニドCa・OD錠10mg 「JG」
用時	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
用時	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg 「オーハラ」
採用	ミドリンP点眼液
用時	ミニプレス錠0.5mg
院外	ミニリンメルトOD錠120 μg
院外	ミニリンメルトOD錠25 μg
院外	ミニリンメルトOD錠50 μg
採用	ミニリンメルトOD錠60 μg
院外	ミネプロOD錠1.25mg
院外	ミネプロOD錠2.5mg
院外	ミネプロOD錠5mg
採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg 「サワイ」
採用	ミノドロン酸錠50mg 「ニプロ」
採用	ミヤBM細粒
採用	ミヤBM錠
院外	ミラペックスLA錠0.375mg
院外	ミラペックスLA錠1.5mg
採用	ミルタザピン錠15mg 「明治」
採用	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg 「アメル」
採用	ミレーナ52mg
採用	ミンクリア内用散布液0.8%
院外	ムコスタ点眼液UD2%
院外	ムコソルバーン錠15mg
院外	ムコフィリン吸入液20%
用時	ムルプレタ錠3mg
用時	ムンデシンカプセル100mg
院外	メイラックス錠1mg
用時	メーゼント錠0.25mg
用時	メーゼント錠2mg

採用	メキシチールカプセル100mg
院外	メキシチールカプセル50mg
用時	メクトビ錠15mg
採用	メコバラミン錠500「トーワ」
院外	メサデルム軟膏0.1%
院外	メサデルムローション0.1%
採用	メサラジン錠500mg「ケミファ」
採用	メスチノン錠60mg
院外	メソトレキセート錠2.5mg
院外	メタルカプターゼカプセル100mg
院外	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」
院外	メトアナ配合錠HD
院外	メトアナ配合錠LD
院外	メトグルコ錠500mg
採用	メトレキサート錠2mg「タナベ」
用時	メトピロンカプセル250mg
院外	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」
採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」
用時	メドロール錠2mg
院外	メドロール錠4mg
院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」
院外	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」
院外	メノエイドコンビパッチ
採用	メブチンエアー10μg吸入100回
院外	メブチンキッドエアー5μg吸入100回
採用	メブチン吸入液ユニット0.3mL
採用	メブチン吸入液ユニット0.5mL
採用	メブチングリーンヘラー10μg吸入100回
採用	メブチンドライシロップ0.005%
院外	メブチミニ錠25μg
院外	メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」
院外	メホビル配合錠HD「TCK」
院外	メホビル配合錠HD「トーワ」
院外	メホビル配合錠HD「日新」
院外	メホビル配合錠HD「日新」
院外	メホビル配合錠LD「TCK」
院外	メホビル配合錠LD「トーワ」
院外	メホビル配合錠LD「日新」
院外	メホビル配合錠LD「日新」
採用	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」
採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」
院外	メラトベル顆粒小児用0.2%
採用	メルカゾール錠5mg
院外	メロキシカム錠10mg「NP」
院外	メンタックスクリーム1%
用時	モイゼルト軟膏0.3%
用時	モイゼルト軟膏1%
採用	モーラステープL40mg

院外	モーラスパップXR120mg
院外	モーラスパップXR120mg
院外	モーラスパップXR240mg
採用	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」
採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」
院外	モディオダール錠100mg
院外	モディオダール錠100mg
院外	モビコール配合内用剤HD
採用	モビコール配合内用剤LD
採用	モビプレップ配合内用剤
採用	モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用
用時	【倍散】モルヒネ塩酸塩水和物散1%(10mg/g)
用時	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
用時	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末
採用	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」
採用	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」
採用	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」
院外	ヤーズフレックス配合錠
院外	ヤクバンテープ60mg
採用	薬用炭「日医工」
院外	ユーエフティ配合カプセルT100
院外	ユーゼル錠25mg
用時	ユービット錠100mg
院外	ユニシア配合錠HD
院外	ユニシア配合錠LD
院外	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」
採用	ユベラNソフトカプセル200mg
院外	ユベラ軟膏
院外	ユリス錠0.5mg
採用	ユリス錠1mg
院外	ユリス錠2mg
採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
採用	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」
用時	ヨウ化ナトリウムカプセル-1号
用時	ヨウ化ナトリウムカプセル-30号
用時	ヨウ化ナトリウムカプセル-3号
用時	ヨウ化ナトリウムカプセル-50号
用時	ヨウ化ナトリウムカプセル-5号
採用	ヨウ素「コザカイ・M」
用時	ヨードカプセル-123
採用	複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」
用時	タマガワヨードホルムガーゼ
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
院外	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒
採用	ラキソベロン錠2.5mg

採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」
採用	ラグノスNF経口ゼリ一分包12g
採用	ラゲブリオ錠400mg
採用	ラコールNF配合経腸用液
院外	ラジカット内用懸濁液2.1%
院外	ラシックス錠40mg
院外	ラジレス錠150mg
用時	ラステットSカプセル25mg
採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」
採用	ラツーダ錠20mg
採用	ラックビー微粒N
院外	ラピフォートワイプ2.5%
採用	ラフチジン錠10mg「トーワ」
用時	ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」
採用	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」
院外	ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」
院外	ラミクタール錠100mg
院外	ラミシール外用液1%
採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
採用	ラモトリギン錠25mg「トーワ」
用時	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」
院外	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」
採用	ラリキシンドライシロップ小児用20%
院外	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
採用	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」
採用	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」
院外	ランツジールコーフ錠30mg
院外	リアルダ錠1200mg
採用	リーバクト配合顆粒
院外	リーバクト配合経口ゼリー
採用	リーマス錠100
院外	リーマス錠200
採用	リオナ錠250mg
採用	リオレサール錠5mg
採用	リクシアナOD錠30mg
採用	リクシアナOD錠60mg
院外	リクシアナ錠15mg
院外	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」
院外	リザベンカプセル100mg
用時	リザベン細粒10%
院外	リスピダール錠1mg
採用	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」
採用	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」
院外	リスマー錠1mg
院外	リスマダンR錠150mg
院外	リスマダンカプセル50mg
院外	リズモンTG点眼液0.5%
採用	リタリン錠10mg

採用	リタロクス懸濁用配合顆粒
採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
院外	リットフーロカプセル50mg
用時	リティンパ耳科用250μgセット
採用	リドカインテープ18mg「NP」
用時	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」
院外	リドメックスコーウクリーム0.3%
採用	リドメックスコーウ軟膏0.3%
院外	リドメックスコーウローション0.3%
用時	リネゾリド錠600mg「サワイ」
採用	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」
採用	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」
採用	リパクレオン顆粒300mg分包
院外	リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」
院外	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」
採用	リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」
採用	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」
院外	リバゼブ配合錠HD
院外	リバゼブ配合錠LD
院外	リバルエンLAパッチ25.92mg
院外	リバルエンLAパッチ51.84mg
採用	リファンビシンカプセル150mg「サンド」
採用	リフキシマ錠200mg
院外	リフヌア錠45mg
院外	リベルサス錠14mg
採用	リベルサス錠3mg
院外	リベルサス錠7mg
採用	リボスチン点鼻液0.025mg/112噴霧用
採用	リボトリール細粒0.1%
採用	リボトリール錠0.5mg
採用	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」
院外	リマチル錠100mg
院外	リマチル錠50mg
採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
院外	リムパーザ錠100mg
院外	リムパーザ錠150mg
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)
採用	リルゾール錠50mg「AA」
院外	リレンザ
院外	リンヴォック錠15mg
院外	リンヴォック錠7.5mg
院外	リンゼス錠0.25mg
院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏
院外	リンデロン坐剤0.5mg
院外	リンデロン坐剤1.0mg
採用	リンデロンシロップ0.01%
採用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
採用	リンデロン-Vクリーム0.12%

採用	リンデロン-VGローション
採用	リンデロン-V軟膏0.12%
院外	リンデロン-Vローション
院外	リンラキサー錠125mg
院外	ルコナック爪外用液5%
院外	ルジオミール錠10mg
院外	ルジオミール錠25mg
院外	ルセフィ錠2.5mg
院外	ルセフィ錠5mg
採用	ルナベル配合錠LD
院外	ルナベル配合錠ULD
院外	ルパフィン錠10mg
採用	ルプキネスカプセル7.9mg
院外	ルミガン点眼液0.03%
採用	ルリクールVG軟膏0.12%
院外	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」
院外	ルリコン軟膏1%
院外	ルリットド錠150
院外	レイボー錠100mg
院外	レイボー錠50mg
院外	レキサルティOD錠0.5mg
採用	レキサルティOD錠1mg
院外	レキソタン錠1
院外	レキソタン錠2
院外	レキソタン錠5
院外	レキップCR錠8mg
院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回
院外	レクチゾール錠25mg
院外	レグテクト錠333mg
用時	レグナイト錠300mg
院外	レザルタス配合錠HD
院外	レザルタス配合錠LD
院外	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏
採用	レスタミンコーワクリーム1%
院外	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」
採用	レナジエル錠250mg
採用	レナデックス錠4mg
採用	レナリドミドカプセル5mg「FNK」
採用	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」
院外	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」
採用	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」
採用	レバミピド錠100mg「EMEC」
用時	レブラミドカプセル5mg
採用	レベチラセタム錠250mg「トーワ」
採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」
院外	レベチラセタムDS50%「トーワ」
用時	レベトールカプセル200mg
院外	レボカバスチン点眼液0.025%「サワイ」

採用	レボカルニチンFF内用液10%「アメル」
採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」
採用	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」
採用	レボフロキサシン錠250mg「杏林」
採用	レボフロキサシン錠500mg「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
採用	レボレード錠12.5mg
院外	レルパックス錠20mg
院外	レルベア100エリプタ14吸入用
院外	レルベア100エリプタ30吸入用
院外	レルベア200エリプタ14吸入用
採用	レルベア200エリプタ30吸入用
院外	レルミナ錠40mg
用時	レンビマカプセル10mg
用時	レンビマカプセル4mg
用時	ロイケリン散10%
院外	ロイコン錠10mg
院外	ローコール錠20mg
用時	ローブレナ錠100mg
院外	ロキソニンパップ100mg
採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」
採用	ロケルマ懸濁用散分包10g
採用	ロケルマ懸濁用散分包5g
院外	ロコアテーブ
院外	ロコアテーブ <sup>®</sup>
院外	ロコイド軟膏0.1%
院外	ロコルナール錠100mg
採用	ロサルタンK錠25mg「トーワ」
院外	ロスーゼット配合錠HD
院外	ロスーゼット配合錠LD
採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」
採用	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」
用時	ロズリートレクカプセル100mg
用時	ロズリートレクカプセル200mg
院外	ロゼックスゲル0.75%
用時	ロタテック内用液
採用	ロタリックス内用液
採用	ロドピン錠25mg
院外	ロナセンテープ20mg
院外	ロナセンテープ30mg
採用	ロナセンテープ40mg
用時	ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」
院外	ロピニロールOD錠1mg「アメル」
採用	ロピニロール徐放錠2mg「KMP」
採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」

院外	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」
採用	ロラゼパム錠0.5mg 「サワイ」
採用	ロラタジンOD錠10mg 「ケミファ」
院外	ロラメット錠1.0
院外	ロルノキシカム錠4mg 「KO」
院外	ロレルコ錠250mg
院外	ロンサーフ配合錠T15
院外	ロンサーフ配合錠T20
採用	ワーファリン錠0.5mg
採用	ワーファリン錠1mg
用時	ワコビタール坐剤30
院外	ワントラム錠100mg