

区分	販売名
用時	5mcgチロナミン錠
採用	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」
院外	EPLカプセル250mg
院外	K.C.L.エリキシル(10W/V%)
院外	S・M配合散
採用	SG配合顆粒
院外	アーリーダ錠60mg
用時	アイクルシグ錠15mg
用時	アイセントレス錠400mg
院外	アイピーディカプセル100
院外	アイピーディドライシロップ5%
院外	アイミクス配合錠HD
院外	アイミクス配合錠LD
院外	アカルボースOD錠50mg「NIG」
院外	アキネトン錠1mg
用時	アグリリンカプセル0.5mg
院外	アコファイド錠100mg
採用	アサコール錠400mg
採用	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」
院外	アシノン錠150mg
採用	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」
院外	アジルバ錠10mg
採用	アジレクト錠1mg
院外	アスパラ-CA錠200
採用	アスパラカリウム錠300mg
採用	アスピリン「ホエイ」
採用	アスベリンシロップ0.5%
採用	アスベリン散10%
採用	アスベリン錠10
採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
用時	アセチルスピラマイシン錠200
採用	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」
採用	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」
用時	アゼプチン錠1mg
採用	アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」
採用	アゾセミド錠60mg「JG」
院外	アダプチノール錠5mg
院外	アダラートCR錠10mg

区分	販売名
院外	アタラックス-Pドライシロップ2.5%
採用	アテノロール錠25mg「日新」
院外	アデホスコーワ腸溶錠20
採用	アデホスコーワ顆粒10%
用時	アデムパス錠0.5mg
用時	アデムパス錠1.0mg
院外	アテレック錠5
院外	アトーゼット配合錠HD
院外	アトーゼット配合錠LD
採用	アドソルビン原末
採用	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
院外	アナストロゾール錠1mg「トーワ」
院外	アナフラニール錠10mg
採用	アナフラニール錠25mg
院外	アフィニトール錠5mg
用時	アブストラル舌下錠100 μ g
用時	アブストラル舌下錠200 μ g
用時	アブストラル舌下錠400 μ g
採用	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
採用	アプレゾリン錠10mg
採用	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」
採用	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」
採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」
採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
採用	アミティーザカプセル12 μ g
採用	アミティーザカプセル24 μ g
院外	アミノレバンEN配合散
院外	アミュー配合顆粒
用時	アムノレイク錠2mg
採用	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」
採用	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」
採用	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」
院外	アメナリーフ錠200mg
採用	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」
採用	アモキシシリン細粒20%「TCK」
用時	アラグリオ顆粒剤分包1.5g
院外	アラバ錠10mg

区分	販売名
採用	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」
用時	アルギU配合顆粒
用時	アルケラン錠2mg
院外	アルサルミン内用液10%
採用	アルダクトンA細粒10%
院外	アルドメット錠125
採用	アルドメット錠250
採用	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」
採用	アルファカルシドールカプセル1.0 μ g「フソー」
採用	アルファロール内用液0.5 μ g/mL
採用	アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」
院外	アルミノニッパスカルシウム顆粒99%
採用	アルロイドG内用液5%
院外	アレグラ錠30mg
用時	アレジオンドライシロップ1%
用時	アレセンサカプセル150mg
採用	アレビアチン散10%
採用	アレビアチン錠100mg
採用	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」
院外	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」
採用	アローゼン顆粒
院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
採用	アロプリノール錠100mg「アメル」
採用	アロプリノール錠50mg「アメル」
院外	アロマシン錠25mg
採用	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」
採用	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」
採用	アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」
採用	イグザレルトOD錠10mg
採用	イグザレルトOD錠15mg
院外	イクスタンジ錠40mg
院外	イクスタンジ錠80mg
院外	イグラチモド錠25mg「サワイ」
採用	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」
採用	イスコチン錠100mg
採用	イスツリサ錠1mg
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」
採用	イソバイドシロップ70%分包30mL

区分	販売名
採用	イトラコナゾール錠50mg「日医工」
採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」
院外	イニシンク配合錠
院外	イノラス配合経腸用液
院外	イフェクサーSRカプセル37.5mg
院外	イフェクサーSRカプセル75mg
院外	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ツルハラ」
院外	イブランス錠125mg
院外	イブランス錠25mg
用時	イマチニブ錠100mg「サワイ」
院外	イミダフェナシンOD錠0.1mg「サワイ」
用時	イムブルビカカプセル140mg
採用	イムラン錠50mg
院外	イリボー錠2.5 μ g
院外	イリボー錠5 μ g
採用	イルベサルタン錠100mg「トーワ」
採用	イルベサルタン錠50mg「トーワ」
院外	インヴェガ錠3mg
院外	インヴェガ錠6mg
採用	インクレミンシロップ5%
院外	インチュニブ錠1mg
採用	インデラル錠10mg
院外	インフリーSカプセル200mg
用時	インライタ錠5mg
院外	ヴォトリエント錠200mg
院外	ヴォリブリス錠2.5mg
院外	ウラリット配合錠
院外	ウリアデック錠40mg
採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」
採用	ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」
院外	ウロカルン錠225mg
院外	エースコール錠2mg
院外	エカード配合錠LD
院外	エクア錠50mg
院外	エクフィナ錠50mg
院外	エクメット配合錠HD
院外	エクメット配合錠LD
採用	エサンブトール錠250mg

区分	販売名
採用	エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」
院外	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」
院外	エスゾピクロン錠3mg「DSEP」
院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」
院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」
院外	エストラサイトカプセル156.7mg
採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20
採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25
採用	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」
採用	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」
採用	エチゾラム錠0.5mg「アメル」
院外	エチゾラム錠1mg「アメル」
用時	エドルミズ錠50mg
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」
院外	エナロイ錠2mg
採用	エネーゴ配合経腸用液
用時	エバスチンOD錠10mg「NP」
用時	エバスチンOD錠5mg「NP」
採用	エパルレスタット錠50mg「JG」
採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
院外	エビリファイOD錠3mg
院外	エビリファイ錠1mg
院外	エピレオプチマル散50%
採用	エフィエントOD錠20mg
採用	エフィエント錠3.75mg
用時	エプクルーサ配合錠
採用	エフピーOD錠2.5
採用	エブランチルカプセル15mg
採用	エプレレノン錠25mg「杏林」
採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」
採用	エベレンゾ錠100mg
採用	エベレンゾ錠20mg
採用	エベレンゾ錠50mg
採用	エリキューズ錠2.5mg
院外	エリキューズ錠5mg
採用	エリスロシンドライシロップW20%
採用	エリスロシン錠200mg

区分	販売名
採用	エルカルチンFF錠100mg
院外	エルカルチンFF錠250mg
採用	エルカルチンFF内用液10%
採用	エルサメットS配合錠
採用	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」
用時	エルロチニブ錠100mg「NK」
用時	エルロチニブ錠150mg「NK」
院外	エルロチニブ錠25mg「NK」
採用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤
採用	エレンタール配合内用剤
採用	エンシュア・H
院外	エンシュア・リキッド
採用	エンタカポン錠100mg「トーワ」
採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」
用時	エンドキサン錠50mg
採用	エンレスト錠100mg
院外	エンレスト錠200mg
院外	エンレスト錠50mg
採用	オーグメンチン配合錠250RS
院外	オキサトミドDS小児用2%「サワイ」
用時	オキサトミド錠30mg「CH」
採用	オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」
採用	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」
用時	オキシコンチンTR錠10mg
用時	オキシコンチンTR錠5mg
採用	オキノーム散10mg
採用	オキノーム散2.5mg
採用	オキノーム散5mg
院外	オスポロット錠50mg
採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」
採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
院外	オダイン錠125mg
院外	オテズラ錠10mg
院外	オテズラ錠20mg
院外	オテズラ錠30mg
院外	オドリック錠1mg

区分	販売名
用時	オフェブカプセル100mg
用時	オフェブカプセル150mg
用時	オプスミット錠10mg
採用	オプソ内服液10mg
用時	オプソ内服液5mg
採用	オペプリム
採用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」
院外	オメプラール錠20
院外	オラペネム小児用細粒10%
採用	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」
採用	オランザピンOD錠5mg「トーワ」
採用	オルケディア錠1mg
院外	オルケディア錠2mg
院外	オルミエント錠2mg
院外	オルミエント錠4mg
採用	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」
採用	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」
採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「JG」
採用	オンジェンティス錠25mg
採用	ガスコンドロップ内用液2%
採用	ガスコン錠40mg
院外	ガストローム顆粒66.7%
採用	ガストログラフィン経口・注腸用
用時	カタプレス錠75 μ g
院外	カデュエット配合錠4番
院外	カナグル錠100mg
用時	カナマイシнкаプセル250mg「明治」
院外	カナリア配合錠
採用	ガバペン錠200mg
用時	ガバペン錠400mg
採用	カプトリル錠25mg
採用	カペシタビン錠300mg「サワイ」
採用	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」
採用	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」
用時	カボメティクス錠20mg
用時	カボメティクス錠60mg
採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」

区分	販売名
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠12mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
院外	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」
採用	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」
院外	カリメートドライシロップ92.59%
採用	カリメート経口液20%
用時	カルケンスカプセル100mg
院外	カルスロット錠20
院外	カルチコール末
採用	カルナクリン錠50
採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」
院外	カルビスケン錠5mg
採用	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」
採用	カルベジロール錠10mg「トーワ」
採用	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」
採用	カルボシステインDS50%「タカタ」
院外	カルボシステインシロップ5%「JG」
採用	カルボシステイン錠250mg「NIG」
用時	カログラ錠120mg
採用	カロナール細粒20%
採用	カンデサルタンOD錠2mg「サワイ」
採用	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」
採用	カンデサルタンOD錠8mg「EE」
採用	キシロカインビスカス2%
院外	グーフィス錠5mg
採用	クエチアピン錠100mg「FFP」
採用	クエチアピン錠25mg「FFP」
採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
院外	グラクティブ錠25mg
採用	グラクティブ錠50mg
採用	クラシエ葛根湯エキス細粒
院外	クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒
院外	クラシエ柴朴湯エキス細粒
採用	クラシエ柴苓湯エキス細粒
院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒
院外	クラシエ猪苓湯エキス細粒

区分	販売名
院外	クラシエ白虎加人参湯エキス細粒
院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒
院外	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒
採用	クラシエ補中益気湯エキス細粒
院外	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒
採用	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒
用時	グラセプターカプセル0.5mg
用時	グラセプターカプセル1mg
採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ
院外	グラマリール細粒10%
採用	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」
採用	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」
院外	クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」
院外	グラндаキシン錠50
院外	クリアナール錠200mg
採用	グリクラジド錠40mg「トーワ」
採用	グリチロン配合錠
採用	グリメピリド錠0.5mg「NP」
採用	グルコンサンK細粒4mEq/g
院外	グルベス配合錠
院外	グレースビット細粒10%
用時	クレセンバカプセル100mg
院外	クレメジン速崩錠500mg
採用	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」
採用	クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
院外	クロミッド錠50mg
院外	ケイキサレートドライシロップ76%
採用	ケイツーシロップ0.2%
院外	ケタスカプセル10mg
院外	ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」
用時	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」
採用	ケフラール細粒小児用100mg
採用	ケレンディア錠10mg
採用	ケレンディア錠20mg
採用	コートリル錠10mg
採用	コスパノンカプセル40mg
採用	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」
院外	コメリアンコーワ錠100

区分	販売名
用時	コララン錠2.5mg
院外	コランチル配合顆粒
採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
用時	コレチメント錠9mg
院外	コレバインミニ83%
用時	コロنفォート内用懸濁液25%
院外	コンサータ錠18mg
院外	コントミン糖衣錠12.5mg
院外	コントミン糖衣錠25mg
院外	コンプラビン配合錠
用時	ザーコリカプセル200mg
用時	ザーコリカプセル250mg
院外	ザイティガ錠250mg
院外	ザイティガ錠500mg
院外	サイトテック錠200
院外	サイレース錠2mg
院外	ザクラス配合錠HD
院外	ザクラス配合錠LD
用時	サデルガカプセル100mg
院外	サノレックス錠0.5mg
用時	サムスカOD錠15mg
院外	サムスカOD錠30mg
用時	サムスカOD錠7.5mg
用時	サムチレール内用懸濁液15%
採用	サラザック配合顆粒
院外	サラジェン錠5mg
採用	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」
院外	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」
採用	サラゾピリン錠500mg
採用	サリグレンカプセル30mg
採用	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」
採用	サレドカプセル100
採用	ジアゼパム錠2mg「アメル」
採用	ジアゼパム錠5mg「アメル」
院外	シアリス錠5mg
院外	ジェニナック錠200mg
採用	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」
院外	ジェミーナ配合錠

区分 販売名
用時 ジオトリフ錠20mg
用時 ジオトリフ錠30mg
用時 ジカディア錠150mg
用時 シクレスト舌下錠5mg
採用 シクロスポリンカプセル10mg「トーワ」
採用 シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」
院外 シクロスポリンカプセル50mg「トーワ」
採用 ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
院外 ジゴシン散0.1%
採用 ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」
採用 ジスロマック細粒小児用10%
用時 ジスロマック錠600mg
用時 ジセレカ錠100mg
採用 ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」
用時 シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
用時 シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
採用 シタフロキサシン錠50mg「サワイ」
採用 シナール配合錠
採用 シナール配合顆粒
用時 シプロキササン錠200mg
採用 シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」
用時 シメチジン細粒20%「ツルハラ」
用時 ジャカビ錠5mg
採用 ジャディアンス錠10mg
院外 ジャディアンス錠25mg
院外 ジュリナ錠0.5mg
採用 ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
採用 ジルテックドライシロップ1.25%
院外 ジルテック錠10
院外 ジルテック錠10
用時 シルデナフィル錠20mgRE「JG」
採用 ジレニアカプセル0.5mg
採用 シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」
採用 シロドシンOD錠4mg「ケミファ」
院外 スイニー錠100mg
院外 スイニー錠100mg
採用 スインプロイク錠0.2mg
院外 スーグラ錠25mg

区分	販売名
院外	スージャヌ配合錠
用時	スーテントカプセル12.5mg
院外	スタレボ配合錠L100
院外	スタレボ配合錠L50
用時	スチバーガ錠40mg
院外	ストラテラカプセル10mg
院外	ストラテラカプセル40mg
採用	ストロカイン錠5mg
用時	ストロメクトール錠3mg
採用	スピロノラクトン錠25mg「日医工」
院外	スピロペント錠10 μ g
院外	ズファジラン錠10mg
用時	スプリセル錠20mg
採用	スプリセル錠50mg
採用	スマトリプタン錠50mg「日医工」
採用	スルピリド錠50mg「サワイ」
院外	ゼスラン小児用シロップ0.03%
院外	ゼスラン小児用細粒0.6%
用時	ゼスラン錠3mg
院外	セディール錠10mg
採用	セパミット-Rカプセル10
院外	セパミット-R細粒2%
採用	セファドール錠25mg
採用	セファランチン錠1mg
採用	セファレキシнкаプセル250mg「トーワ」
用時	ゼフィックス錠100
採用	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
院外	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」
院外	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」
院外	セフジニル細粒10%小児用「TYK」
用時	セムブリックス錠20mg
用時	セムブリックス錠40mg
採用	セルトラリン錠25mg「ケミファ」
院外	セルニルトン錠
院外	ゼルヤンツ錠5mg
院外	セレクトール錠200mg
採用	セレコキシブ錠100mg「オーハラ」
採用	セレコキシブ錠200mg「オーハラ」

区分	販売名
院外	セレスタミン配合シロップ
採用	セレニカR顆粒40%
院外	セレネース錠0.75mg
採用	セレネース錠1.5mg
院外	セレネース錠3mg
院外	セロケンL錠120mg
院外	セロシオンカプセル10
用時	ゼンタコートカプセル3mg
採用	センノシド錠12mg「トーワ」
用時	ゾスパタ錠40mg
採用	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」
採用	ゾニサミド散20%「アメル」
採用	ゾニサミド錠100mg「アメル」
採用	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」
採用	ゾピラックス錠200
院外	ソランタール錠100mg
採用	ソリタ-T配合顆粒3号
採用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」
院外	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」
用時	ゾリンザカプセル100mg
採用	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」
院外	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」
院外	ソレトン錠80
用時	ダーブロック錠1mg
採用	ダーブロック錠2mg
院外	ダーブロック錠4mg
院外	ダーブロック錠6mg
採用	ダイアモックス錠250mg
用時	タイケルブ錠250mg
院外	タウリン散98%「大正」
院外	ダクチル錠50mg
用時	タグリッソ錠80mg
院外	タケキャブOD錠10mg
採用	タケキャブOD錠20mg
院外	タケルダ配合錠
用時	タシグナカプセル150mg
用時	タシグナカプセル200mg
院外	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」

区分	販売名
院外	タダラフィル錠20mgAD「杏林」
用時	タナドール顆粒75%
院外	タナトリル錠5
用時	タバリス錠100mg
用時	タバリス錠150mg
採用	タフマックE配合カプセル
採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」
院外	タモキシフェン錠20mg「DSEP」
採用	ダラシнкаプセル150mg
採用	タリージェOD錠15mg
採用	タリージェOD錠5mg
採用	タルチレリンOD錠5mg「JG」
採用	ダントリウムカプセル25mg
採用	タンニン酸アルブミン「ニッコー」
採用	チアプリド錠25mg「NIG」
採用	チウラジール錠50mg
院外	チガソнкаプセル10
院外	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」
用時	チャンピックス錠0.5mg
用時	チャンピックス錠1mg
採用	チラーヂンS錠25 μ g
採用	チラーヂンS錠50 μ g
採用	ツイミーグ錠500mg
用時	ツインラインNF配合経腸用液
院外	ツートラム錠25mg
院外	ツベルミン錠100mg
院外	ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)
採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)

区分 販売名

- 院外 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)
- 採用 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)
- 採用 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)
- 採用 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)
- 採用 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
- 採用 ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
- 採用 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
- 用時 ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)
- 採用 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
- 採用 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)
- 院外 ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
- 採用 ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)

区分	販売名
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)
採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)
用時	ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)
採用	ツルバダ配合錠
院外	ディレグラ配合錠
院外	デエビゴ錠10mg
院外	デエビゴ錠2.5mg
採用	デエビゴ錠5mg
用時	テオフィリンシロップ20%「タカタ」
採用	テオロン錠100mg
採用	デカドロン錠0.5mg
採用	デカドロン錠4mg
採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」
用時	テクフィデラカプセル120mg
用時	テクフィデラカプセル240mg
採用	テグレトール細粒50%
採用	テグレトール錠100mg
用時	デソパン錠60mg
院外	テトラミド錠10mg
院外	デトルシトールカプセル4mg
院外	テネリアOD錠20mg
院外	テノーミン錠50
院外	テノゼット錠300mg
採用	デノタスチュアブル配合錠
採用	デパケンR錠100mg
採用	デパケンR錠200mg
採用	デパケンシロップ5%
院外	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」
用時	テブミトコ錠250mg
採用	テプレノンカプセル50mg「トーワ」
院外	テプレノン細粒10%「トーワ」
院外	デベルザ錠20mg
用時	デムサーカプセル250mg
用時	テモダールカプセル100mg
用時	テモダールカプセル20mg
採用	デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」
院外	デュファストン錠5mg

区分	販売名
採用	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」
採用	テルネリン錠1mg
採用	テルビナフィン錠125mg「サワイ」
採用	テルミサルタン錠20mg「ニプロ」
採用	テルミサルタン錠40mg「ニプロ」
採用	トアラセット配合錠「DSEP」
採用	トウモロコシデンプン「ホエイ」
採用	ドキサゾシン錠0.5mg「EMEC」
採用	ドキサゾシン錠1mg「トーワ」
院外	ドグマチール錠100mg
採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」
採用	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
採用	ドパコール配合錠L100
用時	ドパストン散98.5%
院外	トビエース錠4mg
院外	トピナ錠50mg
院外	トフラニール錠25mg
院外	ドラール錠15
採用	トラゼンタ錠5mg
採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
院外	トラディアンズ配合錠AP
院外	トラディアンズ配合錠BP
採用	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」
採用	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
院外	トラベルミン配合錠
採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」
採用	トランサミン散50%
採用	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」
院外	トリキュラー錠28
採用	トリクロリールシロップ10%
採用	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」
院外	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」
院外	トリプタノール錠10
院外	トリプタノール錠25
採用	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「NIG」

区分	販売名
採用	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
院外	トリンテリックス錠10mg
採用	トルバプタンOD錠15mg「トーワ」
採用	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
採用	トレランG液50g
採用	トレランG液75g
採用	トレリーフOD錠25mg
院外	トレリーフOD錠50mg
採用	ドロキシドパカプセル100mg「日医工」
採用	ドンペリドンドライシロップ小児用1%「日医工」
採用	ドンペリドン錠10mg「NIG」
採用	ナイキサン錠100mg
院外	ナウゼリンOD錠10
採用	ナゼアOD錠0.1mg
採用	ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」
院外	ナラトリプタン錠2.5mg「KO」
用時	ナルサス錠12mg
採用	ナルサス錠2mg
採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「フソー」
採用	ナルラピド錠1mg
用時	ナルラピド錠4mg
採用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」
採用	ニコランジル錠5mg「サワイ」
採用	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
採用	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」
採用	ニトロペン舌下錠0.3mg
院外	ニバジール錠2mg
院外	ニバジール錠4mg
採用	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
院外	ニフェジピンL錠20mg「KPI」
採用	ニフレック配合内用剤
院外	ニューレプチル細粒10%
採用	ニューレプチル錠5mg
院外	ニューベクオ錠300mg
用時	ニンラーロカプセル2.3mg
用時	ニンラーロカプセル3mg
用時	ニンラーロカプセル4mg
院外	ネイリンカプセル100mg

区分	販売名
用時	ネオーラル25mgカプセル
用時	ネオーラル50mgカプセル
用時	ネオーラル内用液10%
院外	ネオフィリン錠100mg
用時	ネクサバール錠200mg
採用	ネシーナ錠12.5mg
院外	ネシーナ錠25mg
院外	ネシーナ錠6.25mg
院外	ノアルテン錠(5mg)
院外	ノイエル細粒40%
採用	ノイロトロピン錠4単位
用時	ノウリアスト錠20mg
採用	ノバミン錠5mg
採用	ノベルジン顆粒5%
採用	ハーフジゴキシンKY錠0.125
用時	ハーボニー配合錠
院外	バイアグラ錠50mg
採用	バイアスピリン錠100mg
用時	バイシリンG顆粒40万単位
採用	ハイドレアカプセル500mg
院外	パキシルCR錠12.5mg
院外	パキシルCR錠25mg
院外	パキシル錠5mg
採用	バクトラミン配合錠
採用	バクトラミン配合顆粒
院外	バスメット錠1mg
採用	ハッカ油
採用	パナルジン錠100mg
院外	バナンドライシロップ5%
院外	バナンドライシロップ5%
採用	バファリン配合錠A81
院外	バフセオ錠150mg
院外	バフセオ錠300mg
採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」
採用	バラシクロビル顆粒50%「トーワ」
採用	パラミチンカプセル300mg
採用	バリキサ錠450mg
採用	バリテスターA240散

区分 販売名
採用 バルギン発泡顆粒
院外 ハルシオン0.25mg錠
採用 パルタンM錠0.125mg
採用 バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」
採用 パルモディア錠0.1mg
採用 パロキセチンOD錠10mg「トーワ」
採用 パロキセチンOD錠20mg「トーワ」
採用 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」
採用 パンテチン錠100mg「シオエ」
院外 ピーゼットシー糖衣錠2mg
院外 ピートルチュアブル錠250mg
院外 ピートル顆粒分包250mg
採用 ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」
院外 ビオスリー配合散
採用 ビオスリー配合錠
院外 ビオチン散0.2%「フソー」
採用 ビオフェルミンR散
院外 ビオフェルミンR錠
採用 ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」
院外 ビクシリンカプセル250mg
用時 ビジクリア配合錠
採用 ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」
採用 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」
院外 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」
採用 ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」
用時 ビタミンB6散10%「マルイシ」
院外 ビタメジン配合カプセルB25
院外 ヒダントールF配合錠
院外 ヒダントール錠25mg
採用 ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」
採用 ヒドロクロチアジド錠12.5mg「トーワ」
院外 ビビアント錠20mg
院外 ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」
院外 ビムパットドライシロップ10%
採用 ビムパット錠50mg
院外 ピメノールカプセル50mg
採用 ピモベンダン錠1.25mg「TE」
院外 ビラノア錠20mg

区分	販売名
採用	ピラマイド原末
採用	ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」
採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」
用時	ビルトリシド錠600mg
用時	ピルフェニドン錠200mg「日医工」
院外	ピレチア錠(25mg)
院外	ビンダケルカプセル20mg
院外	ファスティック錠90
用時	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」
採用	ファモチジンD錠10mg「EMEC」
採用	ファモチジンD錠20mg「EMEC」
採用	ファモチジン散10%「サワイ」
院外	ファロムドライシロップ小児用10%
院外	ファロム錠200mg
採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL
採用	フィコンパ錠2mg
用時	フィコンパ錠4mg
院外	フェアストーン錠40
採用	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」
採用	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」
院外	フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」
院外	フェノバルエリキシル0.4%
採用	フェノバル散10%
採用	フェノバル錠30mg
採用	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
採用	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」
院外	フェマーラ錠2.5mg
採用	フェロ・グラデュメット錠105mg
採用	フェロベリン配合錠
採用	フォシーガ錠10mg
採用	フォシーガ錠5mg
採用	フォリアミン錠
採用	フスコデ配合錠
採用	ブスコパン錠10mg
用時	プラケニル錠200mg
採用	プラザキサカプセル110mg
採用	プラザキサカプセル75mg
採用	フラジール内服錠250mg

区分	販売名
院外	ブラダロン錠200mg
院外	プラノバル配合錠
院外	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」
院外	プラビックス錠25mg
採用	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」
採用	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」
院外	フランドル錠20mg
採用	プランルカストドライシロップ10%「JG」
院外	プランルカスト錠112.5mg「AFP」
採用	プランルカスト錠225mg「AFP」
院外	フリバスOD錠75mg
採用	プリモボラン錠5mg
採用	フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」
採用	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」
用時	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
院外	ブルフェン錠100
院外	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」
採用	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」
採用	フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」
採用	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」
採用	プレガバリンOD錠75mg「サワイ」
採用	プレドニゾロン散「タケダ」1%
採用	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
採用	プレドニゾロン錠2.5mg「NP」
採用	プレドニン錠5mg
用時	プレバイミス錠240mg
院外	プレマリン錠0.625mg
院外	プレミネット配合錠HD
院外	プレミネット配合錠LD
採用	プログラフカプセル0.5mg
採用	プログラフカプセル1mg
院外	プロスタールL錠50mg
採用	プロスタール錠25
採用	フロセミド細粒4%「EMEC」
採用	フロセミド錠10mg「NP」
採用	フロセミド錠20mg「NIG」
院外	プロチアデン錠25
採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」

区分	販売名
院外	ブロナンセリン錠4mg「アメル」
院外	プロノン錠150mg
院外	プロペシア錠0.2mg
院外	プロペシア錠1mg
院外	プロベラ錠2.5mg
用時	フロベン顆粒8%
院外	ブロムペリドール錠1mg「アメル」
院外	ブロムペリドール錠3mg「アメル」
採用	ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」
用時	フロリードゲル経口用2%
採用	フロリネフ錠0.1mg
院外	ベージニオ錠100mg
院外	ベージニオ錠150mg
院外	ベージニオ錠50mg
院外	ベオーバ錠50mg
院外	ベザトールSR錠200mg
用時	ベサノイドカプセル10mg
採用	ベタセレミン配合錠
採用	ベタニス錠25mg
院外	ベタニス錠50mg
採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」
採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
採用	ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」
採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
用時	ベネクレクスタ錠100mg
用時	ベネクレクスタ錠10mg
用時	ベネクレクスタ錠50mg
院外	ベネット錠17.5mg
院外	ベネット錠75mg
採用	ヘパンED配合内用剤
院外	ベプリコール錠100mg
採用	ベプリコール錠50mg
採用	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」
採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%
採用	ベムリディ錠25mg
院外	ベラサスLA錠60 μ g
用時	ペラゾリン細粒400mg
採用	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」

区分	販売名
採用	ベラプロストNa錠20 μ g「VTRS」
院外	ペリアクチンシロップ0.04%
院外	ベリキューボ錠10mg
採用	ベリキューボ錠2.5mg
院外	ベリキューボ錠5mg
院外	ベリチーム配合顆粒
院外	ペルサンチン錠100mg
採用	ペルサンチン錠25mg
院外	ペルジピンLAカプセル20mg
院外	ペルジピンLAカプセル40mg
採用	ベルソムラ錠15mg
採用	ベルソムラ錠20mg
院外	ヘルベッサ錠30
用時	ペルマックス錠250 μ g
用時	ベレキシブル錠80mg
採用	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
採用	ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」
用時	ペンタサ顆粒94%
採用	ボースデル内用液10
院外	ホーリン錠1mg
院外	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用
採用	ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」
採用	ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」
用時	ボシュリフ錠100mg
院外	ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」
採用	ホスリボン配合顆粒
採用	ボセンタン錠62.5mg「VTRS」
院外	ボノサップパック400
院外	ボノサップパック800
院外	ボノテオ錠1mg
院外	ボノピオンパック
用時	ポマリストカプセル2mg
用時	ポマリストカプセル3mg
用時	ポマリストカプセル4mg
院外	ボラキス錠3
採用	ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」
院外	ポララミンドライシロップ0.2%
用時	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」

区分 販売名
採用 ポリコナゾール錠50mg「トーワ」
採用 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
院外 ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉
院外 ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」
採用 ポリフル錠500mg
院外 ボルタレンSRカプセル37.5mg
用時 ボンゾール錠100mg
院外 ポンタールシロップ3.25%
院外 マイスタン細粒1%
院外 マイスタン細粒1%
採用 マイスタン錠5mg
用時 マイテラーゼ錠10mg
採用 マヴィレット配合錠
採用 マグコロール散68%分包50g
採用 マックメット懸濁用配合DS
用時 マブリン散1%
院外 マリゼブ錠12.5mg
院外 マリゼブ錠25mg
院外 ミカトリオ配合錠
院外 ミカムロ配合錠AP
院外 ミカムロ配合錠BP
院外 ミグシス錠5mg
採用 ミグリトールOD錠25mg「サワイ」
採用 ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
採用 ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「NIG」
用時 ミコブティンカプセル150mg
院外 ミコンビ配合錠AP
院外 ミコンビ配合錠BP
採用 ミゾリビン錠50mg「サワイ」
採用 ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」
用時 ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
用時 ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
採用 ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」
用時 ミニプレス錠0.5mg
院外 ミニリンメルトOD錠120 μ g
院外 ミニリンメルトOD錠25 μ g
院外 ミニリンメルトOD錠50 μ g
採用 ミニリンメルトOD錠60 μ g

区分	販売名
院外	ミネブロOD錠1.25mg
院外	ミネブロOD錠2.5mg
院外	ミネブロOD錠5mg
採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」
採用	ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」
採用	ミヤBM細粒
採用	ミヤBM錠
院外	ミラペックスLA錠0.375mg
院外	ミラペックスLA錠1.5mg
採用	ミルタザピン錠15mg「明治」
採用	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」
採用	ミンクリア内用散布液0.8%
院外	ムコソルバン錠15mg
用時	ムルプレタ錠3mg
用時	ムンデシンカプセル100mg
院外	メイラックス錠1mg
用時	メーゼント錠0.25mg
用時	メーゼント錠2mg
採用	メキシチールカプセル100mg
院外	メキシチールカプセル50mg
採用	メコバラミン錠500「トーワ」
採用	メサラジン錠500mg「ケミファ」
採用	メスチノン錠60mg
院外	メソトレキセート錠2.5mg
院外	メタルカプターゼカプセル100mg
院外	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」
院外	メトアナ配合錠HD
院外	メトアナ配合錠LD
院外	メトグルコ錠500mg
採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」
採用	メトトレキサート錠2mg「タナベ」
採用	メトピロンカプセル250mg
院外	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」
採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」
用時	メドロール錠2mg
院外	メドロール錠4mg
院外	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」
採用	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」

区分	販売名
採用	メプチンドライシロップ0.005%
院外	メプチンミニ錠25 μ g
院外	メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」
採用	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」
採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」
院外	メラトベル顆粒小児用0.2%
採用	メルカゾール錠5mg
院外	メロキシカム錠10mg「NP」
採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」
採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」
院外	モビコール配合内用剤HD
採用	モビコール配合内用剤LD
採用	モビプレップ配合内用剤
用時	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」
用時	モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末
採用	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」
採用	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」
採用	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」
院外	ヤーズフレックス配合錠
院外	ユーエフティ配合カプセルT100
院外	ユーゼル錠25mg
用時	ユービット錠100mg
院外	ユニシア配合錠HD
院外	ユニシア配合錠LD
採用	ユニフィルLA錠200mg
院外	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」
採用	ユベラNソフトカプセル200mg
院外	ユリス錠0.5mg
採用	ユリス錠1mg
院外	ユリス錠2mg
採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
院外	ヨクイニンエキス散「コタロー」
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」
採用	ラキソベロン錠2.5mg
採用	ラキソベロン内用液0.75%
採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」
採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g
採用	ラコールNF配合経腸用液

区分	販売名
採用	ラコールNF配合経腸用半固形剤
院外	ラジカット内用懸濁液2.1%
院外	ラシックス錠40mg
院外	ラジレス錠150mg
用時	ラストットSカプセル25mg
採用	ラツータ錠20mg
採用	ラックビー微粒N
採用	ラフチジン錠10mg「トーワ」
採用	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」
院外	ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」
院外	ラミクタール錠100mg
採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」
採用	ラモトリギン錠25mg「トーワ」
用時	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」
採用	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」
採用	ラリキシンドライシロップ小児用20%
院外	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
採用	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」
採用	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」
用時	リアルダ錠1200mg
院外	リーバクト配合経口ゼリー
採用	リーバクト配合顆粒
採用	リオナ錠250mg
採用	リオレサール錠5mg
採用	リクシアナOD錠30mg
採用	リクシアナOD錠60mg
院外	リクシアナ錠15mg
採用	リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」
用時	リザベン細粒10%
院外	リスパダール錠1mg
採用	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」
院外	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
採用	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」
採用	リスミー錠1mg
院外	リスモダンカプセル50mg
採用	リタリン錠10mg
用時	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」
用時	リネゾリド錠600mg「サワイ」

区分	販売名
採用	リパクレオン顆粒300mg分包
院外	リバゼブ配合錠HD
院外	リバゼブ配合錠LD
採用	リファンピシカプセル150mg「サンド」
採用	リフキシマ錠200mg
院外	リフヌア錠45mg
院外	リベルサス錠14mg
採用	リベルサス錠3mg
院外	リベルサス錠7mg
採用	リボトリール細粒0.1%
採用	リボトリール錠0.5mg
院外	リポバス錠5
採用	リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」
院外	リマチル錠50mg
採用	リマプロストアルフアデクス錠5 μ g「サワイ」
院外	リムパーザ錠100mg
院外	リムパーザ錠150mg
採用	リルゾール錠50mg「AA」
院外	リンヴォック錠15mg
院外	リンヴォック錠7.5mg
院外	リンゼス錠0.25mg
採用	リンデロンシロップ0.01%
院外	リンラキサー錠125mg
採用	リン酸水素カルシウム「エビス」
院外	ルジオミール錠10mg
院外	ルジオミール錠25mg
院外	ルシドリール錠100mg
院外	ルセフィ錠2.5mg
院外	ルセフィ錠5mg
採用	ルナベル配合錠LD
院外	ルナベル配合錠ULD
院外	ルパフィン錠10mg
院外	ルブラック錠4mg
院外	ルリッド錠150
院外	レイボー錠100mg
院外	レイボー錠50mg
採用	レキサルティOD錠1mg
院外	レキソタン錠1

区分	販売名
採用	レキソタン錠2
院外	レキソタン錠5
院外	レキップCR錠8mg
採用	レクチゾール錠25mg
用時	レグナイト錠300mg
院外	レザルタス配合錠HD
院外	レザルタス配合錠LD
採用	レナジェル錠250mg
採用	レナデックス錠4mg
採用	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」
院外	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」
採用	レバミピド錠100mg「EMEC」
採用	レブラミドカプセル5mg
院外	レベチラセタムDS50%「トーワ」
採用	レベチラセタム錠250mg「トーワ」
採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」
用時	レベトールカプセル200mg
採用	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」
採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」
採用	レボトミン錠25mg
院外	レボトミン錠5mg
採用	レボフロキサシン錠250mg「杏林」
採用	レボフロキサシン錠500mg「杏林」
採用	レボレード錠12.5mg
院外	レルパックス錠20mg
院外	レルミナ錠40mg
用時	レンビマカプセル4mg
用時	ロイケリン散10%
院外	ロイコン錠10mg
院外	ローコール錠20mg
用時	ローブレナ錠100mg
採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
採用	ロケルマ懸濁用散分包10g
採用	ロケルマ懸濁用散分包5g
院外	ロコルナール錠100mg
採用	ロサルタンK錠25mg「トーワ」
院外	ロソーゼット配合錠HD
院外	ロソーゼット配合錠LD

区分	販売名
採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」
採用	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」
用時	ロタテック内用液
採用	ロタリックス内用液
採用	ロトピン錠25mg
用時	ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」
院外	ロピニロールOD錠1mg「アメル」
採用	ロピニロール徐放錠2mg「KMP」
院外	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」
採用	ロペラミド錠1mg「EMEC」
採用	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」
採用	ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」
院外	ロラメット錠1.0
院外	ロルノキシカム錠4mg「KO」
院外	ロレルコ錠250mg
院外	ロンサーフ配合錠T15
院外	ロンサーフ配合錠T20
採用	ワーファリン錠0.5mg
採用	ワーファリン錠1mg
院外	ワントラム錠100mg
採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」
採用	塩化カリウム徐放錠600mg「St」
採用	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」
採用	経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」
院外	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
採用	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」
採用	臭化カリウム「ヤマゼン」
採用	重カマ「ヨシダ」
用時	小児用ミケラン細粒0.2%
採用	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」
採用	酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」
採用	単シロップ
採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
採用	炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」
採用	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」
院外	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」
採用	炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末
採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」

区分 販売名

採用 調剤用パンピタン末

採用 沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」

採用 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」

採用 乳酸カルシウム「VTRS」原末

採用 乳糖「ホエイ」

採用 薬用炭「日医工」

区分 販売名
採用 0.025W/V%チアミトール水
採用 MS温シップ「タイハウ」
採用 MS冷シップ「タイハウ」
採用 PA・ヨード点眼・洗眼液
採用 SPトローチ0.25mg「明治」
院外 アイドロイチン3%点眼液
院外 アイベータ配合点眼液<製造番号 A012 A013以降>
院外 アイラミド配合懸濁性点眼液
院外 アクアチムローション1%
用時 アクトシン軟膏3%
採用 アシクロビル眼軟膏3%「ニッター」
院外 アジマイシン点眼液1%<製造番号 R008以降>
院外 アスタット軟膏1%
採用 アズノールうがい液4%
採用 アズノール軟膏0.033%
院外 アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入
採用 アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」
採用 アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」
院外 アゾルガ配合懸濁性点眼液
院外 アテキュラ吸入用カプセル高用量
院外 アテキュラ吸入用カプセル中用量
院外 アテキュラ吸入用カプセル低用量
院外 アドエア100ディスクス60吸入用
院外 アドエア250エアゾール120吸入用
院外 アドエア250ディスクス60吸入用
院外 アドエア500ディスクス60吸入用
院外 アドエア50エアゾール120吸入用
院外 アドフィールドパップ40mg
院外 アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用
院外 アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用
院外 アノーロエリプタ30吸入用
用時 アリケイス吸入液590mg
採用 アルスロマチック関節手術用灌流液
採用 アルト原末(1g)
院外 アルメタ軟膏
院外 アレギサール点眼液0.1%
院外 アレサガテープ4mg
院外 アレジオンLX点眼液0.1%

区分	販売名
採用	アンテベートローション0.05%
採用	アンテベート軟膏0.05%
用時	アンペック坐剤10mg
用時	アンペック坐剤20mg
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」
院外	イソジンゲル10%
採用	イソジンシュガーパスタ軟膏
院外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
院外	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」
採用	イナビル吸入粉末剤20mg
院外	イミグラン点鼻液20
採用	イムノブラダー膀胱用80mg
院外	インテバンクリーム1%
院外	インテバン坐剤25
用時	ウブレチド点眼液1%
採用	ウルティブロ吸入用カプセル
院外	エイベリス点眼液0.002%
院外	エキザルベ
院外	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用
院外	エクロックゲル5%
採用	エコリシン眼軟膏
採用	エスクレ坐剤「250」
院外	エスクレ注腸用キット「500」
用時	エストラーナテープ0.09mg(使用期限 2024年3月以降)
用時	エストラーナテープ0.18mg(使用期限 2024年9月以降)
用時	エストラーナテープ0.36mg(使用期限 2024年9月以降)
院外	エストラーナテープ0.72mg
用時	エナジア吸入用カプセル高用量
用時	エナジア吸入用カプセル中用量
採用	エネマスター注腸散
採用	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」
採用	エムラクリーム
院外	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用
院外	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
院外	オイラックスHクリーム

区分 販売名
採用 オイラックスクリーム10%
院外 オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入
院外 オキサロールローション25 μ g/g
採用 オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」
採用 オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」
採用 オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション25mL
採用 オリブ油「ヨシダ」
用時 オルセノン軟膏0.25%
院外 オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用
採用 オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用
採用 オロパタジン点眼液0.1%「杏林」
用時 オンブレス吸入用カプセル150 μ g
採用 ガチフロ点眼液0.3%
採用 カデックス軟膏0.9%
採用 カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
採用 キシロカインゼリー2%
採用 キシロカインポンプスプレー8%
採用 キシロカイン液「4%」
院外 キュバール100エアゾール
採用 キンダベート軟膏0.05%
院外 グラアルファ配合点眼液
院外 グラナテック点眼液0.4%
院外 クラビット点眼液0.5%
採用 グリセリン「ニッコー」
採用 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL
採用 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL
採用 グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL
院外 グリメサゾン軟膏
採用 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」
採用 クレナフィン爪外用液10%
採用 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」
院外 クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」
採用 クロマイ腔錠100mg
採用 クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」
院外 クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」
採用 ゲーベンクリーム1%
院外 ケタス点眼液0.01%
採用 ケトコナゾールクリーム2%「JG」

区分	販売名
採用	ケトコナゾールローション2%「JG」
院外	ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」
採用	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」
採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」
院外	コールタイジン点鼻液
院外	コムクロシャンブー0.05%
用時	コムレクス耳科用液1.5%
院外	コレクチム軟膏0.25%
院外	コレクチム軟膏0.5%
院外	ザーネ軟膏0.5%
採用	サーファクテン気管注入用120mg
採用	サイプレジン1%点眼液
院外	ザジテン点鼻液0.05%
院外	ザラカム配合点眼液
院外	サラゾピリン坐剤500mg
院外	サリベートエアゾール
院外	サルコートカプセル外用50 μ g
採用	サルタノールインヘラー100 μ g
採用	サンドールP点眼液
院外	サンピロ点眼液0.5%
院外	サンピロ点眼液1%
採用	サンピロ点眼液2%
採用	シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」
採用	シーブリ吸入用カプセル50 μ g
採用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」
院外	ジクアスLX点眼液3%
院外	ジクアス点眼液3%
用時	ジクトルテープ75mg
採用	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」
院外	ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」
採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
院外	シムビコートタービュヘイラー60吸入
採用	スープレックス吸入麻酔液
院外	スピール膏M
採用	スピオルトレスピマット60吸入
採用	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
院外	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g

区分	販売名
院外	ゼビアックスローション2%
院外	ゼフナートクリーム2%
院外	ゼフナート外用液2%
採用	ゼルフォーム(No.12)
院外	セレベント50ディスクス
採用	ソフラチュール貼付剤10cm
院外	ダイアコート軟膏0.05%
採用	ダイアアップ坐剤4
採用	ダイアアップ坐剤6
院外	タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」
院外	タチオン点眼用2%
院外	タプコム配合点眼液
採用	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」
院外	タプロスミニ点眼液0.0015%
用時	タマガワヨードホルムガーゼ
院外	タリムス点眼液0.1%
院外	チモプトール点眼液0.25%
採用	チモロール点眼液0.5%「テイカ」
用時	ツムラ紫雲膏
採用	ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」
採用	ツロブテロールテープ1mg「VTRS」
採用	ツロブテロールテープ2mg「VTRS」
院外	ディビゲル1mg
採用	ディフェリンゲル0.1%
採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」
採用	デスモプレシン・スプレー10協和
採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」
院外	デタントール0.01%点眼液
院外	デュアック配合ゲル
院外	デュオトラバ配合点眼液
院外	テリルジー100エリプタ14吸入用
採用	テリルジー100エリプタ30吸入用
院外	テリルジー200エリプタ14吸入用
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用
採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」
院外	デルモベートスカルプローション0.05%
院外	テレミンソフト坐薬2mg
採用	トスフロ点眼液0.3%

区分	販売名
用時	トブラシン点眼液0.3%
院外	ドボネックス軟膏50 μ g/g
院外	ドボベットゲル
院外	ドボベット軟膏
採用	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」
採用	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」
院外	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μ g「大正」
採用	トルソプト点眼液1%
採用	ドルモロール配合点眼液「わかもと」
採用	ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²
採用	トロピカミド点眼液0.4%「日点」
採用	トロンビン液モチダソフトボトル1万
採用	ナウゼリン坐剤10
採用	ナウゼリン坐剤30
採用	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」
用時	ニコチネルTTS10
用時	ニコチネルTTS20
用時	ニコチネルTTS30
採用	ニフラン点眼液0.1%
院外	ニュープロパッチ13.5mg
院外	ニュープロパッチ2.25mg
採用	ニュープロパッチ4.5mg
院外	ニュープロパッチ9mg
採用	ネイサート坐剤
院外	ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装)
採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液
採用	ネオメドロールEE軟膏
採用	ネリザ軟膏
院外	ネリゾナ軟膏0.1%
院外	ノルスパンテープ10mg
院外	ノルスパンテープ5mg
採用	ハイセチンP軟膏
院外	ハイパジールコーワ点眼液0.25%
採用	ハイポアルコール液2%「ヤクハン」
採用	バクスミー点鼻粉末剤3mg
採用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%
用時	パニマイシン点眼液0.3%
院外	パピロックミニ点眼液0.1%

区分	販売名
採用	バラマイシン軟膏
院外	パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入
院外	ハルロピテープ24mg
院外	ハルロピテープ8mg
用時	バンコマイシン眼軟膏1%
採用	ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」
院外	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」
採用	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」
院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%
採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
用時	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL
採用	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL
採用	ビスコート0.5眼粘弾剤
院外	ビソノテープ2mg
採用	ビソノテープ4mg
採用	ビダラビン軟膏3%「SW」
院外	ビベスピエアロスフィア28吸入
用時	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」
用時	ピマリシン点眼液5%「センジュ」
採用	ヒルドイドローション0.3%
院外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入
採用	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
採用	ピレノキシシン懸濁性点眼液0.005%「参天」
採用	フィブラストスプレー500
採用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」
院外	フェルビナクパップ70mg「NP」
採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」
用時	フェントステープ0.5mg
用時	フェントステープ1mg
用時	フェントステープ4mg
用時	ブコラム口腔用液10mg
用時	ブコラム口腔用液2.5mg
用時	ブコラム口腔用液5mg
用時	ブコラム口腔用液7.5mg
院外	ブセレリン点鼻液0.15%「F」
採用	ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」

区分 販売名
採用 フラジール錠250mg
院外 プリビナ液0.05%
院外 ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」
採用 ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」
採用 フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」
採用 フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」
院外 フルタイド100 μ gエアゾール60吸入用
用時 フルタイド100ディスカス
用時 フルタイド200ディスカス
採用 フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用
採用 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「トーワ」56噴霧用
採用 フルティフォーム125エアゾール120吸入用
院外 フルティフォーム50エアゾール56吸入用
院外 フルメタローション
院外 フルメタ軟膏
採用 プレグランディン腔坐剤1mg
院外 プレドニン眼軟膏
用時 プレドネマ注腸20mg
採用 プロウペス腔用剤10mg
院外 プロクトセディル坐薬
院外 フロジン外用液5%
採用 プロスタンディン軟膏0.003%
院外 プロトピック軟膏0.03%小児用
院外 プロペト
用時 プロボコリン吸入粉末溶解用100mg
採用 ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」
採用 ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
用時 ブロメライン軟膏5万単位/g
院外 フロリードDクリーム1%
採用 フロリード腔坐剤100mg
採用 ベストロン点眼用0.5%
院外 ベセルナクリーム5%
院外 ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」
採用 ベノキシール点眼液0.4%
採用 ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」
採用 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」
院外 ベピオゲル2.5%
採用 ヘモポリゾン軟膏

区分	販売名
採用	ベリプラストPコンビセット組織接着用0.5mL製剤
採用	ベルベゾロンF点眼・点鼻液
院外	ベロテックエロゾル100
用時	ペンタサ坐剤1g
院外	ペンタサ注腸1g
用時	ペンレステープ18mg
採用	ホーリンV腔用錠1mg
院外	ホスミシンS耳科用3%
採用	ボスミン外用液0.1%
用時	ボチシート20%
採用	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」
採用	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」
採用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」
採用	ポピヨドスクラブ7.5%
院外	ボラザG軟膏
院外	ボルタレンサポ25mg
採用	ボルタレンローション1%
採用	ボルヒール組織接着用(3mL)
採用	ボルヒール組織接着用(5mL)
院外	ボンアルファクリーム $2\mu\text{g/g}$
院外	ボンアルファハイローション $20\mu\text{g/g}$
院外	ボンアルファハイ軟膏 $20\mu\text{g/g}$
院外	ボンアルファローション $2\mu\text{g/g}$
院外	ボンアルファ軟膏 $2\mu\text{g/g}$
院外	マーデュオックス軟膏
院外	マイコスポールクリーム1%
院外	マイザークリーム0.05%
採用	マイザー軟膏0.05%
採用	マキサカルシトール軟膏 $25\mu\text{g/g}$ 「タカタ」
採用	ミオコールスプレー0.3mg
院外	ミオピン点眼液
院外	ミケルナ配合点眼液
採用	ミドリンP点眼液
院外	ミリステープ5mg
採用	ミレーナ52mg
院外	ムコスタ点眼液UD2%
院外	ムコフィリン吸入液20%
院外	メサデルムローション0.1%

区分	販売名
院外	メサデルム軟膏0.1%
採用	メプチンエア-10 μ g吸入100回
院外	メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回
採用	メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回
採用	メプチン吸入液ユニット0.3mL
採用	メプチン吸入液ユニット0.5mL
院外	メンタックスクリーム1%
院外	メンタックス外用液1%
採用	モーラステープL40mg
院外	モーラスパップXR120mg
院外	モーラスパップXR120mg
院外	モーラスパップXR240mg
採用	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」
採用	モメタゾン点鼻液50 μ g「トーワ」56噴霧用
院外	ヤクバンテープ60mg
用時	ユベラ軟膏
採用	ヨウ素「コザカイ・M」
院外	ラクリミン点眼液0.05%
採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」
院外	ラミシール外用液1%
院外	リズモンTG点眼液0.5%
用時	リティンパ耳科用250 μ gセット
採用	リドカインテープ18mg「NP」
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%
院外	リドメックスコーワローション0.3%
採用	リドメックスコーワ軟膏0.3%
院外	リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」
院外	リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」
採用	リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」
採用	リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」
採用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用
院外	リレンザ
採用	リンデロン-VGローション
採用	リンデロン-Vクリーム0.12%
院外	リンデロン-Vローション
採用	リンデロン-V軟膏0.12%
院外	リンデロン坐剤0.5mg
院外	リンデロン坐剤1.0mg

区分	販売名
採用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
院外	ルコナック爪外用液5%
院外	ルミガン点眼液0.03%
採用	ルリクールVG軟膏0.12%
院外	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」
院外	ルリコン軟膏1%
用時	レクタブル2mg注腸フォーム14回
採用	レスタミンコーワクリーム1%
採用	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」
院外	レボカバスチン点眼液0.025%「サワイ」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」
院外	レルベア100エリプタ14吸入用
院外	レルベア100エリプタ30吸入用
院外	レルベア200エリプタ14吸入用
採用	レルベア200エリプタ30吸入用
院外	ロキソニンパップ100mg
採用	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」
院外	ロコアテープ
院外	ロコアテープ
院外	ロコイド軟膏0.1%
院外	ロゼックスゲル0.75%
院外	ロナセンテープ20mg
院外	ロナセンテープ30mg
採用	ロナセンテープ40mg
用時	ワコビタール坐剤30
採用	亜鉛華軟膏「ニッコー」
院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏
採用	希ヨードチンキ「ニッコー」
採用	逆性石ケン液10「ヨシダ」
院外	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏
採用	消毒用エタノール液IP
採用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
採用	新レシカルボン坐剤
用時	親水ワセリン「ホエイ」
採用	人工涙液マイティア点眼液

区分 販売名

採用 日点アトロピン点眼液1%

採用 尿素クリーム20%「SUN」

採用 白色ワセリン

採用 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」