

手術、検査等における抗血栓薬の推奨休薬期間

一般名	商品名	推奨休薬期間
アスピリン	バイアスピリン	7～14日
アスピリン・ダイアルミネート	バファリン ニトギス バッサミン ファモター	
アスピリン・ボノプラザン	キャブピリン	
アスピリン・ランソプラゾール	タケルダ	
アピキサバン	エリキュース	低リスク1日以上 (中～高リスク2日以上)
イコサペント酸エチル	エバデール	7～10日以上
イフェンプロジル	セロクラール	2日
エドキサバン	リクシアナ	1日以上
オメガ3脂肪酸エチル	ロトリガ	7～10日
クロピドグレル	プラビックス	14日以上
クロピドグレル・アスピリン	コンブラビン ロレアス	14日以上
サルポグレラート	アンブラーグ	1日
ジピリダモール	ベルサンチン	1日
ジラゼブ	コメリアンコーワ	3日
シロスタゾール	プレタール	2～4日
ダビガトラン	ブラザキサ	1日 (大手術 2日以上)
チカグレロル	ブリリント	5日
チクロピジン	パナルジン	10～14日
トラピジル	ロコルナール	1日
プラスグレル	エフィエント	14日以上
ヘパリンナトリウム	ヘパリンナトリウム	4～6時間
ベラプロストNa	ケアロードLA ベラサスLA ドルナー プロサイリン	1日
リバーロキサバン	イグザレルト	1日以上
リマプロストアルファデクス	オバルモン	1日
ワルファリンカリウム	ワーファリン ワルファリンK	2～4日

ア行	
アスピリン	7日以上
アンブラーグ	1日
イグザレルト	1日以上
イコサペント酸エチル	7～10日以上
イフェンプロジル	2日
エバデール	7～10日以上
エフィエント	14日以上
エリキュース	低リスク1日以上 (中～高リスク2日以上)
オバルモン	1日
オメガ-3脂肪酸エチル	7～10日
カ行	
キャブピリン	7日以上
クロピドグレル	14日以上
ケアロードLA	1日
コメリアンコーワ	3日
コンブラビン	14日以上
サ行	
サルポグレラート	1日
ジピリダモール	1日
ジラゼブ	3日
シロスタゾール	2～4日
セロクラール	2日
タ行	
タケルダ	7日以上
チクロピジン	10～14日
トラピジル	2～3日
ドルナー	1日

ナ行	
ニトギス	7日以上
ハ行	
バイアスピリン	7日以上
バッサミン	7日以上
パナルジン	10～14日
バファリン	7日以上
ファモター	7日以上
ブラザキサ	1日 (大手術 2日以上)
ブラビックス	14日以上
ブリリント	5日
プレタール	2～4日
プロサイリン	1日
ヘパリンナトリウム	4～6時間
ベラサスLA	1日
ベルサンチン	1日
ヤ・ラ・ワ行	
リクシアナ	1日以上
リマプロストアルファデクス	1日
ロコルナール	2～3日
ロトリガ	7～10日
ロレアス	14日以上
ワーファリン	2～4日
ワルファリンK	2～4日
ワルファリンカリウム	2～4日

注)上記の休薬期間は、あくまでも目安とする。

出血時間、プロトンピン時間の確認を行い、患者の状態や手術、検査、処置による侵襲、出血の程度などを考慮し、総合的に判断すること。

また、投与を中止することにより疾患に悪影響を及ぼす危険性もあることから、症状を確認の上、休薬期間を設定すること。

2024年6月改訂

2025年4月改訂

薬剤部・医療安全管理室

問い合わせ 薬剤部 医薬品情報室 (内線 4101)