

| 採用区分 | 販売名 |
|------|--------------------------|
| 院外 | アーリーダ錠60mg |
| 用時 | アイクルシグ錠15mg |
| 採用 | アイセントレス錠400mg |
| 院外 | アイドロイチン3%点眼液 |
| 院外 | アイピー・ディカプセル100 |
| 院外 | アイピー・ディドライシロップ5% |
| 院外 | アイベータ配合点眼液 |
| 院外 | アイミクス配合錠HD |
| 院外 | アイミクス配合錠LD |
| 院外 | アイラミド配合懸濁性点眼液 |
| 院外 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 |
| 採用 | 亜鉛華軟膏「ニッコー」 |
| 院外 | アカルボース錠50mg「サワイ」 |
| 院外 | アキネトン錠1mg |
| 院外 | アクアチム軟膏1% |
| 用時 | アクトシン軟膏3% |
| 用時 | アグリリンカプセル0.5mg |
| 院外 | アコファイド錠100mg |
| 採用 | アサコール錠400mg |
| 用時 | アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」 |
| 採用 | アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 |
| 院外 | アシノン錠150mg |
| 院外 | アジマイシン点眼液1%<製造番号 R008以降> |
| 採用 | 亜硝酸アミル「AFP」 |
| 採用 | アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」 |
| 院外 | アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」 |
| 院外 | アジルバ錠10mg |
| 採用 | アジレクト錠1mg |
| 院外 | アスタット軟膏1% |
| 採用 | アズノールうがい液4% |
| 採用 | アズノール軟膏0.033% |
| 採用 | アスピラカリウム錠300mg |
| 院外 | アスピラ-CA錠200 |
| 採用 | アスピリン「ホエイ」 |
| 採用 | アスペリン散10% |
| 採用 | アスペリン錠10 |
| 院外 | アスペリンシロップ0.5% |
| 院外 | アスマネックスツイストヘラー200μg60吸入 |

| | |
|----|----------------------------|
| 採用 | アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」 |
| 用時 | アセチルスピラマイシン錠200 |
| 採用 | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」 |
| 採用 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 |
| 採用 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 |
| 採用 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 |
| 用時 | アゼブチン錠1mg |
| 採用 | アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」 |
| 採用 | アゾセミド錠60mg「JG」 |
| 院外 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 |
| 院外 | アダプチノール錠5mg |
| 院外 | アダラートCR錠10mg |
| 院外 | アタラックス-Pドライシロップ2.5% |
| 院外 | アテキュラ吸入用カプセル高用量 |
| 院外 | アテキュラ吸入用カプセル中用量 |
| 院外 | アテキュラ吸入用カプセル低用量 |
| 採用 | アテノロール錠25mg「日新」 |
| 採用 | アデホスコーワ顆粒10% |
| 院外 | アデホスコーワ腸溶錠20 |
| 用時 | アデムパス錠0.5mg |
| 用時 | アデムパス錠1.0mg |
| 院外 | アテレック錠5 |
| 院外 | アドエア100ディスカス60吸入用 |
| 院外 | アドエア250エアゾール120吸入用 |
| 院外 | アドエア250ディスカス60吸入用 |
| 院外 | アドエア500ディスカス60吸入用 |
| 院外 | アドエア50エアゾール120吸入用 |
| 院外 | アトーゼット配合錠HD |
| 院外 | アトーゼット配合錠LD |
| 院外 | アドフィードパップ40mg |
| 採用 | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 |
| 採用 | 日点アトロピン点眼液1% |
| 院外 | アナストロゾール錠1mg「トーワ」 |
| 院外 | アナフラニール錠10mg |
| 採用 | アナフラニール錠25mg |
| 院外 | アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用 |
| 院外 | アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用 |
| 院外 | アノーロエリプタ30吸入用 |
| 院外 | アフィニートール錠5mg |

| | |
|----|---------------------------|
| 用時 | アブストラル舌下錠100μg |
| 用時 | アブストラル舌下錠200μg |
| 用時 | アブストラル舌下錠400μg |
| 採用 | アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」 |
| 用時 | アプレゾリン錠10mg |
| 採用 | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」 |
| 採用 | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」 |
| 用時 | アポハイドローション20% |
| 用時 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 |
| 採用 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 |
| 院外 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 |
| 採用 | アミティーザカプセル12μg |
| 採用 | アミティーザカプセル24μg |
| 院外 | アミノレバンEN配合散 |
| 院外 | アミュー配合顆粒 |
| 用時 | アムノレイク錠2mg |
| 院外 | アムロジピンOD錠10mg「トーワ」 |
| 採用 | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 |
| 採用 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 |
| 採用 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」 |
| 院外 | アメナリーフ錠200mg |
| 採用 | アモキシシリソルカプセル250mg「TCK」 |
| 採用 | アモキシシリソル細粒20%「TCK」 |
| 用時 | アラグリオ内用剤1.5g |
| 院外 | アラバ錠10mg |
| 用時 | アリケイス吸入液590mg |
| 院外 | アリッサ配合錠 |
| 採用 | アリドネパッチ27.5mg |
| 採用 | アリピプラゾール錠6mg「サワイ」 |
| 用時 | アルギU配合顆粒 |
| 用時 | アルケラン錠2mg |
| 院外 | アルサルミン内用液10% |
| 採用 | アルスロマチック関節手術用灌流液 |
| 採用 | アルダクトンA細粒10% |
| 院外 | アルダクトンA錠50mg |
| 採用 | アルト原末(1g) |
| 院外 | アルドメット錠125 |
| 採用 | アルドメット錠250 |
| 採用 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」 |

| | |
|----|-------------------------------|
| 採用 | アルファカルシドールカプセル1.0 μg 「フソー」 |
| 採用 | アルファロール内用液0.5 μg/mL |
| 採用 | アルプラゾラム錠0.4mg 「トーワ」 |
| 院外 | アルミノニッパスカルシウム顆粒99% |
| 院外 | アルメタ軟膏 |
| 採用 | アルロイドG内用液5% |
| 院外 | アレギサール点眼液0.1% |
| 院外 | アレグラ錠30mg |
| 院外 | アレサガテープ4mg |
| 院外 | アレジオン眼瞼クリーム0.5% |
| 用時 | アレセンサカプセル150mg |
| 採用 | アレビアチン散10% |
| 採用 | アレビアチン錠100mg |
| 採用 | アレンドロン酸錠35mg 「VTRS」 |
| 院外 | アレンドロン酸錠5mg 「VTRS」 |
| 採用 | アローゼン顆粒 |
| 院外 | アロチノロール塩酸塩錠10mg 「サワイ」 |
| 採用 | アロプリノール錠100mg 「アメル」 |
| 採用 | アロプリノール錠50mg 「アメル」 |
| 院外 | アロマシン錠25mg |
| 用時 | アンコチル錠500mg |
| 院外 | ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | アンテベート軟膏0.05% |
| 採用 | アンテベートローション0.05% |
| 採用 | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg 「ニプロ」 |
| 院外 | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3% 「タイヨー」 |
| 採用 | アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5% 「タカタ」 |
| 用時 | アンペック坐剤10mg |
| 用時 | アンペック坐剤20mg |
| 院外 | EPLカプセル250mg |
| 院外 | イオウ・カンフルローション「東豊」 |
| 用時 | イグザレルトOD錠10mg |
| 用時 | イグザレルトOD錠15mg |
| 用時 | イグザレルト錠2.5mg |
| 院外 | イクスタンジ錠40mg |
| 院外 | イクスタンジ錠80mg |

| | |
|----|-----------------------------|
| 院外 | イグラチモド錠25mg 「サワイ」 |
| 採用 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg 「サワイ」 |
| 採用 | イスコチン錠100mg |
| 採用 | イスツリサ錠1mg |
| 採用 | イソジンガーグル液7% |
| 採用 | イソジンシュガーパスタ軟膏 |
| 院外 | イソソルビド内用液70%分包30mL 「CEO」 |
| 採用 | イソバイドシロップ70%分包30mL |
| 院外 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 「サワイ」 |
| 院外 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 「サワイ」 |
| 採用 | 一硝酸イソソルビド錠20mg 「NIG」 |
| 採用 | イトラコナゾール錠50mg 「日医工」 |
| 採用 | イトラコナゾール内用液1% 「VTRS」 |
| 採用 | イナビル吸入粉末剤20mg |
| 院外 | イニシンク配合錠 |
| 採用 | イノソリッド配合経腸用半固形剤 |
| 院外 | イノラス配合経腸用液 |
| 院外 | イフェクサーSRカプセル37.5mg |
| 院外 | イフェクサーSRカプセル75mg |
| 院外 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg 「ツルハラ」 |
| 院外 | イブランス錠125mg |
| 院外 | イブランス錠25mg |
| 用時 | イマチニブ錠100mg 「サワイ」 |
| 院外 | イミグラン点鼻液20 |
| 院外 | イミダフェナシンOD錠0.1mg 「サワイ」 |
| 採用 | イムノプラダー膀注用80mg |
| 用時 | イムブルビカカプセル140mg |
| 採用 | イムラン錠50mg |
| 院外 | イリボー錠2.5 μg |
| 院外 | イリボー錠5 μg |
| 採用 | イルベサルタン錠100mg 「トーワ」 |
| 院外 | イルベサルタン錠200mg 「トーワ」 |
| 採用 | イルベサルタン錠50mg 「トーワ」 |
| 院外 | インヴェガ錠3mg |
| 院外 | インヴェガ錠6mg |
| 採用 | インクレミンシロップ5% |
| 院外 | インチュニブ錠1mg |
| 院外 | ツムラ菌ちん五苓散エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | インテバンクリーム1% |

| | |
|----|---------------------------------|
| 院外 | インテバン坐剤25 |
| 採用 | インデラル錠10mg |
| 用時 | インライタ錠5mg |
| 採用 | ウインタミン細粒(10%) |
| 院外 | ヴォトリエント錠200mg |
| 院外 | ヴオリブリス錠2.5mg |
| 用時 | ウブレチド点眼液1% |
| 院外 | ウラリット配合錠 |
| 院外 | ウリアデック錠40mg |
| 採用 | ウルソデオキシコール酸錠100mg 「NIG」 |
| 採用 | ウルソデオキシコール酸錠50mg 「NIG」 |
| 採用 | ウルティプロ吸入用カプセル |
| 院外 | ウロカルン錠225mg |
| 院外 | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | エイベリス点眼液0.002% |
| 院外 | エースコール錠2mg |
| 院外 | エカード配合錠LD |
| 院外 | エキザルベ |
| 院外 | エクセグラン散20% |
| 院外 | エクセグラン錠100mg |
| 院外 | エクフィナ錠50mg |
| 院外 | エクラープラスター-20 μg/cm ² |
| 院外 | エクリラ400 μgジェヌエア60吸入用 |
| 院外 | エクロックゲル5% |
| 用時 | エコリシン眼軟膏 |
| 用時 | エザルミア錠100mg |
| 用時 | エザルミア錠50mg |
| 採用 | エサンプトール錠250mg |
| 院外 | S・M配合散 |
| 採用 | エスクレ坐剤「250」 |
| 院外 | エスクレ注腸用キット「500」 |
| 採用 | SG配合顆粒 |
| 採用 | エシタロプラムOD錠10mg 「トーワ」 |
| 院外 | エスピクロン錠1mg 「DSEP」 |
| 院外 | エスピクロン錠3mg 「DSEP」 |
| 院外 | エスタゾラム錠2mg 「アメル」 |
| 用時 | エストラーナテープ0.09mg |
| 用時 | エストラーナテープ0.18mg |

| | |
|----|-------------------------|
| 用時 | エストラーナテープ0.36mg |
| 院外 | エストラーナテープ0.72mg |
| 採用 | SPトローチ0.25mg「明治」 |
| 採用 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 |
| 用時 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 |
| 採用 | エゼチミブOD錠10mg「トーワ」 |
| 採用 | エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 |
| 採用 | 消毒用エタノール液IP |
| 採用 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」 |
| 院外 | エチゾラム錠1mg「アメル」 |
| 院外 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用) |
| 用時 | エドルミズ錠50mg |
| 採用 | エナジア吸入用カプセル高用量 |
| 用時 | エナジア吸入用カプセル中用量 |
| 採用 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 |
| 採用 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 |
| 採用 | エナロイ錠2mg |
| 採用 | エネーボ配合経腸用液 |
| 採用 | エネマスター注腸散 |
| 用時 | エバスチンOD錠10mg「NP」 |
| 用時 | エバスチンOD錠5mg「NP」 |
| 採用 | エパルレストット錠50mg「JG」 |
| 院外 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 |
| 採用 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 |
| 用時 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニットー」 |
| 院外 | エビリファイOD錠3mg |
| 院外 | エビリファイ錠1mg |
| 院外 | エピレオプチマル散50% |
| 採用 | エフィエントOD錠20mg |
| 採用 | エフィエント錠3.75mg |
| 用時 | エプクルーサ配合錠 |
| 採用 | エフピーOD錠2.5 |
| 採用 | エブランチルカプセル15mg |
| 採用 | エプレレノン錠25mg「杏林」 |
| 採用 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」 |
| 採用 | エベレンゾ錠100mg |
| 採用 | エベレンゾ錠20mg |
| 採用 | エベレンゾ錠50mg |
| 採用 | MS温シップ「タイホウ」 |

| | |
|----|----------------------------|
| 採用 | MS冷シップ「タイホウ」 |
| 採用 | エムラクリーム |
| 採用 | エリキュース錠2.5mg |
| 院外 | エリキュース錠5mg |
| 院外 | エリザス点鼻粉末200 μg 28噴霧用 |
| 採用 | エリスロシン錠200mg |
| 採用 | エリスロシンドライシロップW20% |
| 院外 | エルカルチンFF錠100mg |
| 院外 | エルカルチンFF錠250mg |
| 院外 | エルサメットS配合錠 |
| 採用 | エルデカルシトールカプセル0.75 μg 「サワイ」 |
| 用時 | エルロチニブ錠100mg 「NK」 |
| 用時 | エルロチニブ錠150mg 「NK」 |
| 院外 | エルロチニブ錠25mg 「NK」 |
| 採用 | エレンタール配合内用剤 |
| 採用 | エレンタールP乳幼児用配合内用剤 |
| 採用 | 塩化カリウム徐放錠600mg 「St」 |
| 院外 | エンクラッセ62.5 μg エリプタ30吸入用 |
| 採用 | エンシュア・H |
| 院外 | エンシュア・リキッド |
| 採用 | エンタカポン錠100mg 「トーワ」 |
| 採用 | エンテカビル錠0.5mg 「EE」 |
| 用時 | エンドキサン錠50mg |
| 採用 | エンレスト錠100mg |
| 院外 | エンレスト錠200mg |
| 院外 | エンレスト錠50mg |
| 院外 | オイラックスHクリーム |
| 採用 | オイラックスクリーム10% |
| 院外 | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | オーキシス9 μg タービュヘイラー60吸入 |
| 採用 | オーグメンチン配合錠250RS |
| 院外 | オキサトミドDS小児用2% 「サワイ」 |
| 院外 | オキサロールローション25 μg/g |
| 採用 | オキシコドン徐放カプセル10mg 「テルモ」 |
| 採用 | オキシコドン徐放カプセル20mg 「テルモ」 |
| 採用 | オキシコドン徐放カプセル40mg 「テルモ」 |
| 採用 | オキシコドン徐放カプセル5mg 「テルモ」 |
| 用時 | オキシコンチンTR錠10mg |

| | |
|----|---------------------------|
| 用時 | オキシコンチンTR錠5mg |
| 採用 | オキシドール「ヨシダ」 |
| 採用 | オキノーム散10mg |
| 採用 | オキノーム散2.5mg |
| 採用 | オキノーム散5mg |
| 院外 | オスポロット錠50mg |
| 採用 | オゼックス点眼液0.3% |
| 採用 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 |
| 採用 | オセルタミビルDS3%「サワイ」 |
| 院外 | オダイン錠125mg |
| 院外 | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | オテズラ錠10mg |
| 院外 | オテズラ錠20mg |
| 院外 | オテズラ錠30mg |
| 院外 | オドリック錠1mg |
| 用時 | オフェブカプセル100mg |
| 用時 | オフェブカプセル150mg |
| 用時 | オプスマット錠10mg |
| 用時 | オプソ内服液10mg |
| 採用 | オプソ内服液5mg |
| 採用 | オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 |
| 用時 | オペプリム |
| 用時 | オムジャラ錠100mg(14錠瓶) |
| 用時 | オムジャラ錠150mg |
| 用時 | オムジャラ錠200mg |
| 採用 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」 |
| 院外 | オメプラール錠20 |
| 採用 | オラネジン液1.5%OR消毒用アブリケータ25mL |
| 院外 | オラペネム小児用細粒10% |
| 採用 | オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 |
| 採用 | オランザピンOD錠5mg「トーワ」 |
| 採用 | オリブ油「ヨシダ」 |
| 採用 | オルケディア錠1mg |
| 院外 | オルケディア錠2mg |
| 院外 | オルケディア錠4mg |
| 用時 | オルセノン軟膏0.25% |
| 院外 | オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 |
| 採用 | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 |
| 院外 | オルミエント錠2mg |

| | |
|----|-----------------------|
| 院外 | オルミエント錠4mg |
| 採用 | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 |
| 採用 | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 |
| 院外 | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 |
| 院外 | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 |
| 採用 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」 |
| 採用 | オロパタジン点眼液0.1%「杏林」 |
| 採用 | オンジェンティス錠25mg |
| 用時 | オンプレス吸入用カプセル150 μg |
| 院外 | カイロック細粒40% |
| 採用 | ガスコン錠40mg |
| 採用 | ガスコンドロップ内用液2% |
| 採用 | ガストログラフイン経口・注腸用 |
| 用時 | カタプレス錠75 μg |
| 採用 | ガチフロ点眼液0.3% |
| 採用 | クラシエ葛根湯エキス細粒 |
| 院外 | クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒 |
| 採用 | カデックス軟膏0.9% |
| 院外 | カデュエット配合錠4番 |
| 院外 | カナグル錠100mg |
| 用時 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 |
| 院外 | カナリア配合OD錠 |
| 採用 | ガバペン錠200mg |
| 用時 | ガバペン錠400mg |
| 採用 | カプトリル錠25mg |
| 採用 | カペシタビン錠300mg「サワイ」 |
| 採用 | カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 |
| 採用 | カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 |
| 用時 | カボメティクス錠20mg |
| 用時 | カボメティクス錠60mg |
| 院外 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | カモスタットメシリ酸塩錠100mg「JG」 |
| 院外 | ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 |
| 院外 | ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 |
| 院外 | ガランタミンOD錠12mg「トーワ」 |
| 院外 | ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 |
| 院外 | ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 |
| 院外 | ガランタミンOD錠4mg「トーワ」 |

| | |
|----|-------------------------|
| 採用 | ガランタミンOD錠8mg「トーワ」 |
| 採用 | カリメート経口液20% |
| 院外 | カリメートドライシロップ92.59% |
| 用時 | カルケンス錠100mg |
| 院外 | カルスロット錠20 |
| 採用 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 |
| 採用 | カルナクリン錠50 |
| 採用 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 |
| 採用 | カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 |
| 採用 | カルベジロール錠10mg「トーワ」 |
| 採用 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 |
| 採用 | カルボシステイン錠250mg「NIG」 |
| 院外 | カルボシステインシロップ5%「JG」 |
| 採用 | カルボシステインDS50%「タカタ」 |
| 用時 | カログラ錠120mg |
| 採用 | カロナール細粒20% |
| 採用 | カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」 |
| 採用 | カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」 |
| 院外 | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | キシロカイン液「4%」 |
| 採用 | キシロカインゼリー2% |
| 採用 | キシロカインビスカス2% |
| 採用 | キシロカインポンプスプレー8% |
| 採用 | 逆性石ケン液10「ヨシダ」 |
| 院外 | キャブピリン配合錠 |
| 採用 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」 |
| 院外 | キュバール100エアゾール |
| 採用 | 希ヨードチンキ「ニッコー」 |
| 採用 | キンダベート軟膏0.05% |
| 院外 | クービック錠25mg |
| 採用 | クービック錠50mg |
| 採用 | グーフィス錠5mg |
| 採用 | クエチアピン錠100mg「日新」 |
| 採用 | クエチアピン錠12.5mg「アメル」 |
| 採用 | クエチアピン錠25mg「日新」 |
| 採用 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 |
| 院外 | グラアルファ配合点眼液 |
| 院外 | グラクティブ錠25mg |

| | |
|----|----------------------------------|
| 採用 | グラクティブ錠50mg |
| 採用 | グラケーカプセル15mg |
| 用時 | グラセプターカプセル0.5mg |
| 用時 | グラセプターカプセル1mg |
| 院外 | グラナテック点眼液0.4% |
| 採用 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ |
| 院外 | クラビット点眼液0.5% |
| 採用 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 |
| 院外 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」 |
| 採用 | クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 |
| 院外 | グランダキシン錠50 |
| 院外 | クリアナール錠200mg |
| 採用 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL |
| 採用 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL |
| 採用 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL |
| 採用 | グリセリン「ケンエー」 |
| 採用 | グリセリン「ニッコー」 |
| 採用 | グリチロン配合錠 |
| 用時 | クリプトン(81mKr)ジェネレータ |
| 院外 | グリミクロン錠40mg |
| 院外 | グリメサゾン軟膏 |
| 採用 | グリメピリド錠0.5mg「NP」 |
| 採用 | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」 |
| 採用 | グルコンサンK細粒4mEq/g |
| 院外 | グルベス配合錠 |
| 院外 | グレースビット細粒10% |
| 用時 | クレセンバカプセル100mg |
| 採用 | クレナフィン爪外用液10% |
| 院外 | クレメジン速崩錠500mg |
| 採用 | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」 |
| 採用 | クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 |
| 採用 | クロベタゾールプロピオニ酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 |
| 院外 | クロベタゾールプロピオニ酸エステルローション0.05%「MYK」 |
| 院外 | クロベタゾールプロピオニ酸エステルローション0.05%「MYK」 |
| 院外 | クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」 |
| 採用 | クロマイ腔錠100mg |
| 採用 | クロマイ-P軟膏 |
| 院外 | クロミッド錠50mg |
| 採用 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 |

| | |
|----|------------------------------|
| 院外 | クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」 |
| 採用 | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 |
| 院外 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ケイキサレートドライシロップ76% |
| 院外 | ツムラ桂枝加芍藥湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ桂枝加龍骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | ケイツーシロップ0.2% |
| 院外 | K.C.L.エリキシル(10W/V%) |
| 採用 | ゲーベンクリーム1% |
| 院外 | ケタスカプセル10mg |
| 院外 | ケタス点眼液0.01% |
| 採用 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」 |
| 採用 | ケトコナゾールローション2%「JG」 |
| 院外 | ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 |
| 院外 | ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」 |
| 採用 | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 |
| 用時 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 |
| 採用 | ケフラール細粒小児用100mg |
| 採用 | ケレンディア錠10mg |
| 採用 | ケレンディア錠20mg |
| 採用 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 |
| 採用 | コートリル錠10mg |
| 院外 | コールタイジン点鼻液 |
| 採用 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | コスパノンカプセル40mg |
| 採用 | コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」 |
| 院外 | コムクロシャンプー0.05% |
| 採用 | コムレクス耳科用液1.5% |
| 院外 | コメリアンコーワ錠100 |
| 用時 | コララン錠2.5mg |
| 採用 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 |
| 採用 | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | コレクチム軟膏0.25% |
| 院外 | コレクチム軟膏0.5% |
| 用時 | コレチメント錠9mg |
| 院外 | コレバインミニ83% |

| | |
|----|--------------------------|
| 用時 | コロンフォート内用懸濁液25% |
| 院外 | コンサーダ錠18mg |
| 院外 | コンサーダ錠27mg |
| 院外 | コントミン糖衣錠12.5mg |
| 院外 | コントミン糖衣錠25mg |
| 院外 | コンプラビン配合錠 |
| 用時 | ザーコリカプセル200mg |
| 用時 | ザーコリカプセル250mg |
| 院外 | ザーティカン錠0.25mg |
| 院外 | ザーネ軟膏0.5% |
| 採用 | サーファクテン気管注入用120mg |
| 院外 | ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 |
| 院外 | ザイティガ錠250mg |
| 院外 | ザイティガ錠500mg |
| 院外 | サイトテック錠200 |
| 院外 | サイバインコ錠100mg |
| 採用 | サイプレジン1%点眼液 |
| 院外 | クラシエ柴朴湯エキス細粒 |
| 採用 | クラシエ柴苓湯エキス細粒 |
| 院外 | サイレース錠2mg |
| 用時 | 酢酸亜鉛顆粒5%「ノーベル」 |
| 採用 | 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」 |
| 院外 | ザクラス配合錠HD |
| 院外 | ザクラス配合錠LD |
| 院外 | ザジテン点鼻液0.05% |
| 用時 | サデルガカプセル100mg |
| 院外 | サノレックス錠0.5mg |
| 用時 | サムスカOD錠15mg |
| 院外 | サムスカOD錠30mg |
| 用時 | サムスカOD錠7.5mg |
| 用時 | サムチレール内用懸濁液15% |
| 院外 | ザラカム配合点眼液 |
| 採用 | サラザック配合顆粒 |
| 院外 | サラゾン錠5mg |
| 採用 | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」 |
| 院外 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」 |
| 院外 | サラゾピリン坐剤500mg |
| 院外 | サラゾピリン錠500mg |

| | |
|----|--------------------------------|
| 採用 | サリグレンカプセル30mg |
| 院外 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊 |
| 院外 | サリベートエアゾール |
| 院外 | サルコートカプセル外用50μg |
| 採用 | サルタノールインヘラーゼ100μg |
| 採用 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg 「トーワ」 |
| 採用 | サレドカプセル100 |
| 院外 | 酸化マグネシウム錠250mg 「ヨシダ」 |
| 採用 | 酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシダ」 |
| 院外 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | サンドールP点眼液 |
| 院外 | サンピロ点眼液1% |
| 採用 | サンピロ点眼液2% |
| 採用 | ジアゼパム錠2mg 「アメル」 |
| 採用 | ジアゼパム錠5mg 「アメル」 |
| 採用 | シアノコバラミン点眼液0.02% 「センジュ」 |
| 院外 | シアリス錠5mg |
| 採用 | シーブリ吸入用カプセル50μg |
| 用時 | ツムラ紫雲膏 |
| 院外 | ジェニナック錠200mg |
| 採用 | ジエノゲスト錠1mg 「モチダ」 |
| 院外 | ジェミーナ配合錠 |
| 採用 | ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳科用液5% 「CEO」 |
| 用時 | ジオトリフ錠20mg |
| 用時 | ジオトリフ錠30mg |
| 用時 | ジカディア錠150mg |
| 院外 | ジクアスLX点眼液3% |
| 院外 | ジクアス点眼液3% |
| 採用 | ジクトルテープ75mg |
| 採用 | シクレスト舌下錠5mg |
| 採用 | シクロスボリンカプセル10mg 「サンド」 |
| 採用 | シクロスボリンカプセル25mg 「サンド」 |
| 院外 | シクロスボリンカプセル50mg 「サンド」 |
| 採用 | ジクロフェナクNa錠25mg 「トーワ」 |
| 採用 | ジクロフェナクNa点眼液0.1% 「ニットー」 |
| 採用 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg 「JG」 |
| 採用 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg 「JG」 |
| 院外 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg 「ユートク」 |
| 院外 | ジゴシン散0.1% |

| | |
|----|--------------------------|
| 採用 | ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」 |
| 採用 | ジスロマック細粒小児用10% |
| 用時 | ジスロマック錠600mg |
| 用時 | ジセレカ錠100mg |
| 用時 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU |
| 用時 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU |
| 採用 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 |
| 採用 | シナール配合顆粒 |
| 採用 | シナール配合錠 |
| 院外 | ジピリダモール錠100mg「トーワ」 |
| 採用 | ジピリダモール錠25mg「トーワ」 |
| 用時 | シプロキサン錠200mg |
| 採用 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」 |
| 院外 | シムビコートタービュヘイラー60吸入 |
| 院外 | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) |
| 用時 | ジャイパーカ錠100mg |
| 用時 | ジャイパーカ錠50mg |
| 用時 | ジャカビ錠5mg |
| 採用 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 |
| 採用 | ジャディアンス錠10mg |
| 院外 | ジャディアンス錠25mg |
| 用時 | 臭化カリウム「ヤマゼン」 |
| 採用 | 重カマ「ヨシダ」 |
| 採用 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ジュリナ錠0.5mg |
| 院外 | ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | 硝酸イソルビド徐放カプセル20mg「St」 |
| 採用 | 硝酸イソルビドテープ40mg「EMEC」 |
| 採用 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 |
| 院外 | ジルテック錠10 |
| 院外 | ジルテック錠10 |
| 用時 | ジルテックドライシロップ1.25% |
| 用時 | シルデナフィル錠20mgRE「JG」 |

| | |
|----|-----------------------------|
| 採用 | ジレニアカプセル0.5mg |
| 採用 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 |
| 採用 | シロドシンOD錠4mg「ケミファ」 |
| 院外 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | 人工涙液マイティア点眼液 |
| 用時 | 親水ワセリン「ホエイ」 |
| 院外 | ジンタス錠50mg |
| 院外 | シンバスタチン錠5mg「SW」 |
| 院外 | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | 新レシカルボン坐剤 |
| 院外 | スイニー錠100mg |
| 院外 | スイニー錠100mg |
| 採用 | スインプロイク錠0.2mg |
| 院外 | スーグラ錠25mg |
| 院外 | スージャヌ配合錠 |
| 用時 | ステントカプセル12.5mg |
| 採用 | スープレン吸入麻酔液 |
| 院外 | スタレボ配合錠L100 |
| 院外 | スタレボ配合錠L50 |
| 用時 | スチバーガ錠40mg |
| 採用 | ステリゾール液2% |
| 院外 | ストラテラカプセル10mg |
| 院外 | ストラテラカプセル25mg |
| 院外 | ストラテラカプセル40mg |
| 採用 | ストロカイン錠5mg |
| 用時 | ストロメクトール錠3mg |
| 用時 | スニチニブ錠12.5mg「NK」 |
| 院外 | スピール膏M |
| 採用 | スピオルトレスピマット60吸入 |
| 採用 | スピリーバ $2.5\mu g$ レスピマット60吸入 |
| 院外 | スピリーバ吸入用カプセル $18\mu g$ |
| 採用 | スピロノラクトン錠25mg「日医工」 |
| 院外 | スピロペント錠 $10\mu g$ |
| 採用 | ズファジラン錠10mg |
| 採用 | スマトリップタン錠50mg「アメル」 |
| 用時 | スミスリンローション5% |
| 採用 | スルピリド錠50mg「サワイ」 |
| 院外 | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) |

| | |
|----|--------------------------|
| 院外 | ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) |
| 用時 | ゼスラン錠3mg |
| 院外 | ゼスラン小児用細粒0.6% |
| 院外 | ゼスラン小児用シロップ0.03% |
| 院外 | セディール錠10mg |
| 採用 | セパミット-R細粒2% |
| 院外 | ゼビアックスローション2% |
| 採用 | セファドール錠25mg |
| 採用 | セファランチン錠1mg |
| 採用 | セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 |
| 用時 | ゼフィックス錠100 |
| 採用 | セフカペンピポキシル塩酸塩錠100mg「SW」 |
| 院外 | セフジトレントピポキシル錠100mg「SW」 |
| 院外 | セフジトレントピポキシル小児用細粒10%「SW」 |
| 院外 | セフゾン細粒小児用10% |
| 院外 | ゼフナート外用液2% |
| 院外 | ゼフナートクリーム2% |
| 採用 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 |
| 用時 | セムブリックス錠20mg |
| 用時 | セムブリックス錠40mg |
| 採用 | セルセプトカプセル250 |
| 院外 | セルタッチパップ70 |
| 採用 | セルトラリンOD錠25mg「アメル」 |
| 院外 | セルニルトン錠 |
| 採用 | ゼルフォーム(No.12) |
| 院外 | ゼルヤンツ錠5mg |
| 院外 | セレクトール錠200mg |
| 採用 | セレコキシブ錠100mg「オーハラ」 |
| 採用 | セレコキシブ錠200mg「オーハラ」 |
| 院外 | セレスタミン配合シロップ |
| 採用 | セレニカR顆粒40% |
| 院外 | セレネース錠0.75mg |
| 採用 | セレネース錠1.5mg |
| 院外 | セレネース錠3mg |
| 院外 | セレベント50ディスカス |
| 院外 | セロケンL錠120mg |
| 院外 | セロシオンカプセル10 |
| 用時 | ゼンタコートカプセル3mg |
| 採用 | センノシド錠12mg「トーワ」 |

| | |
|----|----------------------------|
| 用時 | ゾスパタ錠40mg |
| 採用 | ソタロール塩酸塩錠40mg 「TE」 |
| 採用 | ゾニサミド錠25mgTRE 「SMPP」 |
| 院外 | ゾニサミド散20% 「アメル」 |
| 採用 | ゾニサミド錠100mg 「アメル」 |
| 採用 | ゾピクロン錠7.5mg 「トーワ」 |
| 採用 | ゾビラックス錠200 |
| 採用 | ソフラチュール貼付剤10cm |
| 用時 | ゾフルーザ錠20mg |
| 院外 | ソランタール錠100mg |
| 採用 | ソリタ-T配合顆粒3号 |
| 採用 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg 「トーワ」 |
| 院外 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg 「トーワ」 |
| 用時 | ゾリンザカプセル100mg |
| 採用 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg 「サワイ」 |
| 院外 | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg 「トーワ」 |
| 院外 | ソレトン錠80 |
| 用時 | ターゼナカプセル0.25mg |
| 用時 | ターゼナカプセル1mg |
| 用時 | ダーブロック錠1mg |
| 採用 | ダーブロック錠2mg |
| 院外 | ダーブロック錠4mg |
| 院外 | ダーブロック錠6mg |
| 院外 | ダイアコート軟膏0.05% |
| 採用 | ダイアップ坐剤4 |
| 採用 | ダイアップ坐剤6 |
| 採用 | ダイアモックス錠250mg |
| 用時 | タイケルブ錠250mg |
| 採用 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | 「山善」第二リン灰 |
| 院外 | タウリン散98% 「大正」 |
| 採用 | ダクチル錠50mg |
| 用時 | タグリッソ錠80mg |
| 院外 | タクロリムス軟膏0.1% 「タカタ」 |
| 院外 | タケキャブOD錠10mg |
| 採用 | タケキャブOD錠20mg |
| 院外 | タケルダ配合錠 |
| 用時 | ダサチニブ錠20mg 「NK」 |
| 採用 | ダサチニブ錠50mg 「NK」 |

| | |
|----|------------------------|
| 用時 | タシグナカプセル150mg |
| 用時 | タシグナカプセル200mg |
| 院外 | タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」 |
| 院外 | タダラフィル錠20mgAD「杏林」 |
| 用時 | タナドーパ顆粒75% |
| 院外 | タナトリル錠5 |
| 用時 | タバリス錠100mg |
| 用時 | タバリス錠150mg |
| 用時 | ダフクリア錠200mg |
| 院外 | タプコム配合点眼液 |
| 用時 | タブネオスカプセル10mg |
| 採用 | タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」 |
| 院外 | タプロスマニ点眼液0.0015% |
| 採用 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 |
| 院外 | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 |
| 採用 | ダラシンカプセル150mg |
| 採用 | タリージェOD錠15mg |
| 採用 | タリージェOD錠5mg |
| 院外 | タリムス点眼液0.1% |
| 採用 | タルチレリンOD錠5mg「JG」 |
| 採用 | 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 |
| 採用 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」 |
| 採用 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 |
| 院外 | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」 |
| 採用 | 単シロップ |
| 採用 | ダントリウムカプセル25mg |
| 採用 | タンニン酸アルブミン「ニッコー」 |
| 院外 | チアブリド細粒10%「サワイ」 |
| 採用 | チアブリド錠25mg「NIG」 |
| 採用 | 0.025W/V%デアミトール水 |
| 採用 | チウラジール錠50mg |
| 院外 | チガソンカプセル10 |
| 院外 | チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」 |
| 採用 | チザニジン錠1mg「日医工」 |
| 院外 | チモプトール点眼液0.25% |
| 採用 | チモロール点眼液0.5%「ティカ」 |
| 用時 | チャンピックス錠0.5mg |
| 用時 | チャンピックス錠1mg |
| 院外 | クラシエ猪苓湯エキス細粒 |

| | |
|----|-----------------------------|
| 採用 | チラーチンS錠25 μg |
| 採用 | チラーチンS錠50 μg |
| 用時 | 5mcgチロナミン錠 |
| 採用 | 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 |
| 採用 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 |
| 採用 | ツイミーグ錠500mg |
| 用時 | ツインラインNF配合経腸用液 |
| 院外 | ツートラム錠25mg |
| 院外 | ツベルミン錠100mg |
| 採用 | ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」 |
| 採用 | ツロブテロールテープ1mg「VTRS」 |
| 採用 | ツロブテロールテープ2mg「VTRS」 |
| 採用 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 |
| 採用 | ディスオーパ消毒液0.55% |
| 院外 | ディナゲスト錠0.5mg |
| 院外 | ディビゲル1mg |
| 院外 | ディフェリンゲル0.1% |
| 院外 | ディレグラ配合錠 |
| 院外 | デエビゴ錠10mg |
| 採用 | デエビゴ錠2.5mg |
| 採用 | デエビゴ錠5mg |
| 院外 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 |
| 用時 | テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」 |
| 採用 | テオロング錠100mg |
| 採用 | デカドロン錠0.5mg |
| 採用 | デカドロン錠4mg |
| 採用 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」 |
| 採用 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 |
| 用時 | テクフィデラカプセル120mg |
| 用時 | テクフィデラカプセル240mg |
| 採用 | テグレトール細粒50% |
| 採用 | テグレトール錠100mg |
| 採用 | デシコビ配合錠HT |
| 採用 | デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μg「フェリング」 |
| 用時 | デソパン錠60mg |
| 院外 | デタントール0.01%点眼液 |
| 院外 | テトラミド錠10mg |
| 院外 | テネリアOD錠20mg |
| 院外 | テノーミン錠50 |

| | |
|----|--------------------------|
| 院外 | テノゼット錠300mg |
| 採用 | デノタスチュアブル配合錠 |
| 採用 | デパケンR錠100mg |
| 採用 | デパケンR錠200mg |
| 採用 | デパケンシロップ5% |
| 院外 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 |
| 用時 | テブミトコ錠250mg |
| 採用 | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 |
| 院外 | テプレノン細粒10%「トーワ」 |
| 院外 | デベルザ錠20mg |
| 用時 | デムサーカプセル250mg |
| 用時 | テモゾロミド錠100mg「NK」 |
| 用時 | テモゾロミド錠20mg「NK」 |
| 院外 | デュアック配合ゲル |
| 院外 | デュオトラバ配合点眼液 |
| 採用 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 |
| 院外 | デュファストン錠5mg |
| 採用 | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 |
| 院外 | テリルジー100エリプタ14吸入用 |
| 採用 | テリルジー100エリプタ30吸入用 |
| 院外 | テリルジー200エリプタ14吸入用 |
| 採用 | テリルジー200エリプタ30吸入用 |
| 採用 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 |
| 採用 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」 |
| 院外 | テルビナフィン錠125mg「サワイ」 |
| 採用 | テルミサルタン錠20mg「ニプロ」 |
| 採用 | テルミサルタン錠40mg「ニプロ」 |
| 院外 | テルミサルタン錠80mg「ニプロ」 |
| 院外 | テレミンソフト坐薬2mg |
| 採用 | トアラセット配合錠「DSEP」 |
| 院外 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | トウモロコシデンプン「ホエイ」 |
| 採用 | ドキサゾシン錠0.5mg「トーワ」 |
| 採用 | ドキサゾシン錠1mg「トーワ」 |
| 院外 | ドキサゾシン錠2mg「トーワ」 |
| 院外 | ドキサゾシン錠4mg「トーワ」 |

| | |
|----|---------------------------------|
| 院外 | ドグマチール錠100mg |
| 採用 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg 「トーワ」 |
| 採用 | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15% 「トーワ」 |
| 採用 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg 「トーワ」 |
| 採用 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg 「トーワ」 |
| 採用 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg 「トーワ」 |
| 採用 | ドパコール配合錠L100 |
| 用時 | ドバストン散98.5% |
| 院外 | トビエース錠4mg |
| 院外 | トピナ錠50mg |
| 採用 | ドプスOD錠100mg |
| 用時 | ドプロテレット錠20mg |
| 用時 | トブラシン点眼液0.3% |
| 院外 | トフラニール錠10mg |
| 院外 | ドボネックス軟膏50 μg/g |
| 院外 | ドボベットゲル |
| 院外 | ドボベット軟膏 |
| 院外 | ドボベットフォーム |
| 院外 | ドラール錠15 |
| 院外 | トラセミドOD錠4mg 「TE」 |
| 採用 | トラゼンタ錠5mg |
| 採用 | トラゾドン塩酸塩錠25mg 「アメル」 |
| 院外 | トラディアンス配合錠AP |
| 院外 | トラディアンス配合錠BP |
| 採用 | トラニラスト点眼液0.5% 「サワイ」 |
| 採用 | トラネキサム酸カプセル250mg 「トーワ」 |
| 院外 | トラベルミン配合錠 |
| 院外 | トラボプロスト点眼液0.004% 「ニットー」 |
| 採用 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg 「KO」 |
| 採用 | トランサミン散50% |
| 採用 | トリアゾラム錠0.125mg 「日医工」 |
| 院外 | トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μg 「大正」 |
| 院外 | トリキュラー錠28 |
| 採用 | トリクロリールシロップ10% |
| 採用 | トリクロルメチアジド錠1mg 「NP」 |
| 院外 | トリクロルメチアジド錠2mg 「NP」 |
| 院外 | トリプタノール錠10 |
| 院外 | トリプタノール錠25 |
| 採用 | トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg 「NIG」 |

| | |
|----|-------------------------|
| 採用 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 |
| 院外 | トリンテリックス錠10mg |
| 用時 | トルカプ錠160mg |
| 用時 | トルカプ錠200mg |
| 採用 | トルソプト点眼液1% |
| 採用 | トルバプタンOD錠15mg「トーワ」 |
| 採用 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 |
| 採用 | ドルモロール配合点眼液「わかもと」 |
| 採用 | トレーランG液50g |
| 採用 | トレーランG液75g |
| 院外 | トレリーフOD錠50mg |
| 採用 | トロピカミド点眼液0.4%「日点」 |
| 採用 | トロンビン液モチダソフトボトル1万 |
| 採用 | 経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」 |
| 採用 | ドンペリドン錠10mg「NIG」 |
| 採用 | ナイキサン錠100mg |
| 院外 | ナウゼリンOD錠10 |
| 採用 | ナウゼリン坐剤10 |
| 採用 | ナウゼリン坐剤30 |
| 院外 | ナウゼリンドライシロップ1% |
| 採用 | ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」 |
| 採用 | ナゼアOD錠0.1mg |
| 院外 | ナテグリニド錠90mg「日医工」 |
| 採用 | ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」 |
| 院外 | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 |
| 用時 | ナルサス錠12mg |
| 採用 | ナルサス錠2mg |
| 採用 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」 |
| 採用 | ナルラピド錠1mg |
| 用時 | ナルラピド錠4mg |
| 用時 | ニコチネルTTS10 |
| 用時 | ニコチネルTTS20 |
| 用時 | ニコチネルTTS30 |
| 採用 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 |
| 採用 | ニコランジル錠5mg「サワイ」 |
| 採用 | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 |
| 採用 | ニトラゼパム錠5mg「NIG」 |
| 採用 | ニトロペン舌下錠0.3mg |
| 院外 | ニバジール錠2mg |

| | |
|----|-----------------------|
| 院外 | ニバジール錠4mg |
| 院外 | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 |
| 院外 | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」 |
| 採用 | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」 |
| 院外 | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」 |
| 採用 | ニフラン点眼液0.1% |
| 採用 | ニフレック配合内用剤 |
| 採用 | 乳酸カルシウム「VTRS」原末 |
| 採用 | 乳糖水和物「ホエイ」 |
| 院外 | ニュープロパッチ13.5mg |
| 院外 | ニュープロパッチ2.25mg |
| 採用 | ニュープロパッチ4.5mg |
| 院外 | ニュープロパッチ9mg |
| 院外 | ニューレプチル細粒10% |
| 採用 | ニューレプチル錠5mg |
| 院外 | ニュベクオ錠300mg |
| 採用 | 尿素クリーム20%「SUN」 |
| 院外 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒 |
| 用時 | ニンラーロカプセル2.3mg |
| 用時 | ニンラーロカプセル3mg |
| 用時 | ニンラーロカプセル4mg |
| 採用 | ネイサート坐剤 |
| 院外 | ネイリンカプセル100mg |
| 用時 | ネオーラル25mgカプセル |
| 用時 | ネオーラル50mgカプセル |
| 用時 | ネオーラル内用液10% |
| 院外 | ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装) |
| 採用 | ネオシネジンコーウ5%点眼液 |
| 採用 | ネオ消アル「ヨシダ」 |
| 院外 | ネオフィリン錠100mg |
| 採用 | ネオメドロールEE軟膏 |
| 用時 | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg |
| 用時 | ネクサバール錠200mg |
| 採用 | ネシーナ錠12.5mg |
| 院外 | ネシーナ錠25mg |
| 院外 | ネシーナ錠6.25mg |
| 院外 | ネリゾナ軟膏0.1% |
| 院外 | ノアルテン錠(5mg) |
| 採用 | ノイロトロピン錠4単位 |

| | |
|----|-------------------------|
| 用時 | ノウリアスト錠20mg |
| 院外 | ノックビン原末 |
| 採用 | ノバミン錠5mg |
| 院外 | ノルスパンテープ10mg |
| 院外 | ノルスパンテープ5mg |
| 採用 | ハーフジゴキシンKY錠0.125 |
| 用時 | ハーボニー配合錠 |
| 院外 | バイアグラ錠50mg |
| 採用 | バイアスピリン錠100mg |
| 採用 | ハイドレアカプセル500mg |
| 用時 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ハイパジールコーワ点眼液0.25% |
| 採用 | ハイポアルコール液2%「ヤクハン」 |
| 院外 | パキシルCR錠12.5mg |
| 院外 | パキシルCR錠25mg |
| 採用 | パキロビッドパック300 |
| 採用 | パキロビッドパック600 |
| 採用 | バクスミ一点鼻粉末剤3mg |
| 採用 | バクトラミン配合顆粒 |
| 採用 | バクトラミン配合錠 |
| 用時 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% |
| 採用 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | バソメット錠1mg |
| 院外 | バソレーターテープ27mg |
| 院外 | クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 |
| 採用 | ハッカ油「ケンエー」 |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化亜鉛2% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化アルミニウム2% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化金酸0.2% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化コバルト2% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化第二水銀0.05% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化第二ズズ1% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化第二鉄2% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化白金酸0.5% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化パラジウム1% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化マンガン2% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属三塩化インジウム1% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属臭化銀2% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム0.5% |

| | |
|----|---------------------------|
| 用時 | パッチテスト試薬金属四塩化イリジウム1% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属硫酸銅1% |
| 用時 | パッチテスト試薬金属硫酸ニッケル5% |
| 用時 | パッチテストパネル(S) |
| 院外 | バナンドライシロップ5% |
| 用時 | パニマイシン点眼液0.3% |
| 院外 | バフセオ錠150mg |
| 院外 | バフセオ錠300mg |
| 採用 | バラシクロビル顆粒50%「トーワ」 |
| 採用 | バラシクロビル錠500mg「SPKK」 |
| 採用 | バラマイシン軟膏 |
| 採用 | パラミヂンカプセル300mg |
| 採用 | バリエース発泡顆粒 |
| 採用 | バリキサ錠450mg |
| 採用 | バリテスターA240散 |
| 院外 | ハルシオン0.25mg錠 |
| 採用 | パルタノM錠0.125mg |
| 院外 | バルバーサ錠3mg |
| 院外 | バルバーサ錠4mg |
| 院外 | バルバーサ錠5mg |
| 採用 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 |
| 院外 | パルミコート200 μgタービュヘイラ-56吸入 |
| 院外 | パルモディアXR錠0.2mg |
| 院外 | パルモディアXR錠0.4mg |
| 採用 | パルモディア錠0.1mg |
| 院外 | ハルロピテープ24mg |
| 採用 | ハルロピテープ8mg |
| 採用 | パロキセチンOD錠10mg「トーワ」 |
| 採用 | パロキセチンOD錠20mg「トーワ」 |
| 院外 | パロキセチンOD錠5mg「トーワ」 |
| 院外 | パロキセチン錠5mg「トーワ」 |
| 院外 | クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒 |
| 採用 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 |
| 用時 | バンコマイシン眼軟膏1% |
| 採用 | パンテチン錠100mg「シオエ」 |
| 採用 | 調剤用パンビタン末 |
| 採用 | ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」 |

| | |
|----|---------------------------|
| 採用 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」 |
| 院外 | ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 |
| 院外 | ヒアレインミニ点眼液0.1% |
| 院外 | ヒアレインミニ点眼液0.3% |
| 採用 | PA・ヨード点眼・洗眼液 |
| 採用 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% |
| 院外 | ピーゼットシーコーティング衣錠2mg |
| 院外 | ピートル顆粒分包250mg |
| 院外 | ピートルチュアブル錠250mg |
| 採用 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリジ0.6mL |
| 用時 | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリジ0.6mL |
| 採用 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 |
| 院外 | ビオスリー配合散 |
| 採用 | ビオスリー配合錠 |
| 院外 | ビオチン散0.2%「フソー」 |
| 採用 | ビオフェルミンR散 |
| 院外 | ビオフェルミンR錠 |
| 採用 | ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」 |
| 院外 | ビクシリンカプセル250mg |
| 採用 | ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」 |
| 用時 | ビジクリア配合錠 |
| 採用 | ビスコート0.5眼粘弾剤 |
| 院外 | ビソノテープ2mg |
| 採用 | ビソノテープ4mg |
| 採用 | ビソプロロールフル酸塩錠0.625mg「サワイ」 |
| 採用 | ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「サワイ」 |
| 院外 | ビソプロロールフル酸塩錠5mg「トーワ」 |
| 採用 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 |
| 用時 | ビタミンB6散10%「マルイシ」 |
| 院外 | ビタメジン配合カプセルB25 |
| 採用 | ビダラビン軟膏3%「SW」 |
| 院外 | ヒダントールF配合錠 |
| 院外 | ヒダントール錠25mg |
| 採用 | ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 |
| 採用 | ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」 |
| 採用 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 |
| 院外 | ビビアント錠20mg |
| 採用 | ビブラマイシン錠100mg |
| 院外 | ビベスピエアロスフィア120吸入 |

| | |
|----|--------------------------|
| 院外 | ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」 |
| 用時 | ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 |
| 用時 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」 |
| 採用 | ビムパット錠50mg |
| 院外 | ビムパットドライシロップ10% |
| 院外 | ピメノールカプセル50mg |
| 採用 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 |
| 院外 | クラシエ白虎加入参湯エキス細粒 |
| 院外 | ビラノア錠20mg |
| 用時 | ビラフトビカプセル50mg |
| 用時 | ビラフトビカプセル75mg |
| 採用 | ピラマイド原末 |
| 採用 | ピリドキサール錠20mg「ツルハラ」 |
| 採用 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 |
| 院外 | ビルダグリブチン錠50mg「サワイ」 |
| 院外 | ビルタサ懸濁用散分包8.4g |
| 院外 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% |
| 院外 | ヒルドイドフォーム0.3% |
| 採用 | ヒルドイドローション0.3% |
| 用時 | ビルトリシド錠600mg |
| 院外 | ヒルナミン錠(5mg) |
| 用時 | ピルフェニドン錠200mg「日医工」 |
| 院外 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入 |
| 採用 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 |
| 院外 | ピレチア錠(25mg) |
| 採用 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 |
| 院外 | ビンダケルカプセル20mg |
| 院外 | ビンマックカプセル61mg |
| 用時 | ファビハルタカプセル200mg |
| 用時 | ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 |
| 採用 | ファモチジン散10%「サワイ」 |
| 採用 | ファモチジンD錠10mg「EMEC」 |
| 採用 | ファモチジンD錠20mg「EMEC」 |
| 院外 | ファロム錠200mg |
| 院外 | ファロムドライシロップ小児用10% |
| 採用 | ファンギゾンシロップ100mg/mL |
| 採用 | フィコンパ錠2mg |
| 用時 | フィコンパ錠4mg |
| 院外 | ブイタマークリーム1% |

| | |
|----|----------------------------|
| 採用 | フィブラストスプレー500 |
| 用時 | フィンテプラ内用液2.2mg/mL |
| 院外 | フェアストン錠40 |
| 採用 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」 |
| 採用 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 |
| 院外 | フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 |
| 院外 | フェノバールエリキシル0.4% |
| 採用 | フェノバール散10% |
| 採用 | フェノバール錠30mg |
| 採用 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 |
| 採用 | フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」 |
| 院外 | フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」 |
| 院外 | フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 |
| 採用 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 |
| 採用 | フェロ・グラデュメット錠105mg |
| 採用 | フェロベリン配合錠 |
| 採用 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 |
| 採用 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 |
| 用時 | フェントステープ0.5mg |
| 用時 | フェントステープ1mg |
| 用時 | フェントステープ4mg |
| 採用 | フォシーガ錠10mg |
| 採用 | フォシーガ錠5mg |
| 院外 | フォゼベル錠10mg |
| 院外 | フォゼベル錠20mg |
| 院外 | フォゼベル錠5mg |
| 採用 | フォリアミン錠 |
| 用時 | ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | ブコラム口腔用液10mg |
| 採用 | ブコラム口腔用液2.5mg |
| 採用 | ブコラム口腔用液5mg |
| 採用 | ブコラム口腔用液7.5mg |
| 採用 | フスコデ配合錠 |
| 院外 | ブセレリン点鼻液0.15%「F」 |
| 採用 | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 |
| 採用 | ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」 |
| 用時 | プラザキサカプセル110mg |
| 用時 | プラザキサカプセル75mg |
| 採用 | フラジール腔錠250mg |

| | |
|----|---------------------------------------|
| 採用 | フラジール内服錠250mg |
| 院外 | ブラダロン錠200mg |
| 院外 | プラノバール配合錠 |
| 院外 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 |
| 院外 | プラビックス錠25mg |
| 採用 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」 |
| 院外 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」 |
| 院外 | フランドル錠20mg |
| 院外 | プランルカスト錠112.5mg「AFP」 |
| 採用 | プランルカスト錠225mg「AFP」 |
| 採用 | プランルカストDS10%「タカタ」 |
| 採用 | ブリィビアクト錠25mg |
| 院外 | フリバスOD錠75mg |
| 院外 | プリビナ液0.05% |
| 院外 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」 |
| 採用 | プリモボラン錠5mg |
| 採用 | ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニットー」 |
| 採用 | プリンペラン錠5 |
| 採用 | フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」 |
| 採用 | フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」 |
| 採用 | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 |
| 採用 | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 |
| 用時 | フルタイド100ディスカス |
| 院外 | フルタイド100μgエアゾール60吸入用 |
| 用時 | フルタイド200ディスカス |
| 採用 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 |
| 採用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」56噴霧用 |
| 採用 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 |
| 院外 | フルティフォーム50エアゾール56吸入用 |
| 用時 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 |
| 院外 | ブルフェン錠100 |
| 院外 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 |
| 採用 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」 |
| 採用 | フルミスト点鼻液 |
| 院外 | フルメタ軟膏 |
| 院外 | フルメタローション |
| 採用 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」 |
| 採用 | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」 |
| 採用 | プレガバリンOD錠75mg「サワイ」 |

| | |
|----|--------------------------|
| 採用 | プレグランディン腔坐剤1mg |
| 院外 | ブレディニン錠50 |
| 採用 | プレドニゾロン散「タケダ」1% |
| 採用 | プレドニゾロン錠1mg(旭化成) |
| 採用 | プレドニゾロン錠2.5mg 「NP」 |
| 院外 | プレドニン眼軟膏 |
| 採用 | プレドニン錠5mg |
| 用時 | プレドネマ注腸20mg |
| 用時 | プレバイミス錠240mg |
| 院外 | プレマリン錠0.625mg |
| 院外 | プレミネット配合錠HD |
| 院外 | プレミネット配合錠LD |
| 採用 | プロウペス腔用剤10mg |
| 院外 | プロクトセディル坐薬 |
| 採用 | プロクトセディル軟膏 |
| 採用 | ログラフカプセル0.5mg |
| 採用 | ログラフカプセル1mg |
| 院外 | ログラフ顆粒0.2mg |
| 院外 | フロジン外用液5% |
| 院外 | プロスターL錠50mg |
| 用時 | プロスター錠25 |
| 採用 | プロスタグラジンE2錠0.5mg 「科研」 |
| 採用 | プロスタンディン軟膏0.003% |
| 採用 | フロセミド細粒4% 「EMEC」 |
| 採用 | フロセミド錠10mg 「NP」 |
| 採用 | フロセミド錠20mg 「NIG」 |
| 採用 | プロチゾラムOD錠0.25mg 「アメル」 |
| 院外 | プロトピック軟膏0.03% 小児用 |
| 採用 | プロナーゼMS |
| 院外 | プロナンセリン錠4mg 「アメル」 |
| 院外 | プロノン錠150mg |
| 院外 | プロペシア錠0.2mg |
| 院外 | プロペシア錠1mg |
| 採用 | プロペト |
| 院外 | プロベラ錠2.5mg |
| 用時 | フロベン顆粒8% |
| 用時 | プロボコリン吸入粉末溶解用100mg |
| 採用 | プロムフェナクNa点眼液0.1% 「日新」 |
| 採用 | プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 「タイヨー」 |

| | |
|----|-----------------------------------|
| 院外 | プロムペリドール錠1mg 「アメル」 |
| 院外 | プロムペリドール錠3mg 「アメル」 |
| 用時 | プロメライン軟膏5万単位/g |
| 用時 | プロモクリプチン錠2.5mg 「トーワ」 |
| 用時 | フロリードゲル経口用2% |
| 採用 | フロリード腔坐剤100mg |
| 院外 | フロリードDクリーム1% |
| 採用 | フロリネフ錠0.1mg |
| 院外 | ベージニオ錠100mg |
| 院外 | ベージニオ錠150mg |
| 院外 | ベージニオ錠50mg |
| 採用 | ベオーバ錠50mg |
| 採用 | ベサコリン散5% |
| 院外 | ベザトールSR錠200mg |
| 用時 | ベサノイドカプセル10mg |
| 採用 | ベストロン点眼用0.5% |
| 院外 | ベセルナクリーム5% |
| 採用 | ベタセレミン配合錠 |
| 院外 | ベタニス錠25mg |
| 院外 | ベタニス錠50mg |
| 採用 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg 「CEO」 |
| 採用 | ベタメタゾン錠0.5mg 「サワイ」 |
| 院外 | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1% 「日点」 |
| 採用 | ベニジピン塩酸塩錠2mg 「サワイ」 |
| 採用 | ベニジピン塩酸塩錠4mg 「サワイ」 |
| 用時 | ベネクレクスタ錠100mg |
| 用時 | ベネクレクスタ錠10mg |
| 用時 | ベネクレクスタ錠50mg |
| 院外 | ベネット錠17.5mg |
| 院外 | ベネット錠75mg |
| 採用 | ベノキシール点眼液0.4% |
| 採用 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 「日医工」 |
| 採用 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 「日医工」 |
| 採用 | ヘパンED配合内用剤 |
| 院外 | ベピオウォッシュゲル5% |
| 院外 | ベピオローション2.5% |
| 院外 | ベプリコール錠100mg |
| 採用 | ベプリジル塩酸塩錠50mg 「TE」 |
| 採用 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg 「トーワ」 |

| | |
|----|----------------------------------|
| 採用 | ヘマンジオルシロップ小児用0.375% |
| 採用 | ベムリディ錠25mg |
| 採用 | ヘモポリゾン軟膏 |
| 院外 | ベラサスLA錠60 μg |
| 用時 | ペラゾリン細粒400mg |
| 採用 | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」 |
| 採用 | ベラプロストNa錠20 μg 「VTRS」 |
| 院外 | ペリアクチンシロップ0.04% |
| 院外 | ベリキューボ錠10mg |
| 採用 | ベリキューボ錠2.5mg |
| 院外 | ベリキューボ錠5mg |
| 院外 | ベリチーム配合顆粒 |
| 採用 | ベリプラストPコンビセット組織接着用0.5mL製剤 |
| 院外 | ペルジピンLAカプセル20mg |
| 院外 | ペルジピンLAカプセル40mg |
| 採用 | ベルソムラ錠15mg |
| 採用 | ベルソムラ錠20mg |
| 採用 | ベルベゾロンF点眼・点鼻液 |
| 院外 | ヘルベッサー錠30 |
| 用時 | ペルマックス錠250 μg |
| 用時 | ベレキシブル錠80mg |
| 採用 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 |
| 院外 | ベロテックエロゾル100 |
| 採用 | ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」 |
| 用時 | ペンタサ顆粒94% |
| 院外 | ペンタサ坐剤1g |
| 院外 | ペンタサ注腸1g |
| 用時 | ペンレステープ18mg |
| 用時 | ボイデヤ錠50mg |
| 院外 | ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | ボースデル内用液10 |
| 院外 | ホーリン錠1mg |
| 採用 | ホーリンV腔用錠1mg |
| 院外 | ホクナリンテープ0.5mg |
| 院外 | ホクナリンテープ1mg |
| 院外 | ホクナリンテープ2mg |
| 院外 | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 |
| 採用 | ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」 |

| | |
|----|---------------------------------|
| 採用 | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」 |
| 用時 | ボシュリフ錠100mg |
| 院外 | ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」 |
| 院外 | ホスマシンS耳科用3% |
| 採用 | ボスミン外用液0.1% |
| 採用 | ホスリボン配合顆粒 |
| 採用 | ボセンタン錠62.5mg「VTRS」 |
| 用時 | ボチシート20% |
| 採用 | クラシエ補中益氣湯エキス細粒 |
| 院外 | ボノサップパック400 |
| 院外 | ボノサップパック800 |
| 院外 | ボノテオ錠1mg |
| 院外 | ボノピオンパック |
| 採用 | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 |
| 採用 | ポピヨドンゲル10% |
| 採用 | ポピヨドンスクラブ7.5% |
| 用時 | ポマリストカプセル2mg |
| 用時 | ポマリストカプセル3mg |
| 用時 | ポマリストカプセル4mg |
| 院外 | ポラキス錠3 |
| 採用 | ボラザG軟膏 |
| 採用 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 |
| 院外 | ポララミンドライシロップ0.2% |
| 用時 | ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 |
| 採用 | ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 |
| 院外 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 |
| 採用 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 |
| 院外 | ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g〈ハチ〉 |
| 採用 | ポリフル錠500mg |
| 院外 | ボルタレンSRカプセル37.5mg |
| 院外 | ボルタレンサポ25mg |
| 採用 | ボルタレンローション1% |
| 採用 | ボルヒール組織接着用(3mL) |
| 採用 | ボルヒール組織接着用(5mL) |
| 院外 | ボンアルファクリーム2μg/g |
| 院外 | ボンアルファ軟膏2μg/g |
| 院外 | ボンアルファハイ軟膏20μg/g |
| 院外 | ボンアルファハイローション20μg/g |
| 院外 | ボンアルファローション2μg/g |

| | |
|----|--------------------------|
| 用時 | ボンゾール錠100mg |
| 院外 | ポンタールシロップ3.25% |
| 院外 | マーデュオックス軟膏 |
| 院外 | マイコスポールクリーム1% |
| 院外 | マイザークリーム0.05% |
| 採用 | マイザー軟膏0.05% |
| 院外 | マイスタン細粒1% |
| 院外 | マイスタン細粒1% |
| 採用 | マイスタン錠5mg |
| 用時 | マイテラーゼ錠10mg |
| 用時 | マイトイシン眼科外用液用2mg |
| 用時 | マヴィレット配合錠 |
| 院外 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | マキサカルシトール軟膏25 μg/g 「タカタ」 |
| 院外 | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | マグコロール散68%分包50g |
| 用時 | 0.02W/V%マスキン水 |
| 採用 | マスキンスクラブ4% |
| 院外 | マドパー配合錠L100 |
| 用時 | マブリン散1% |
| 院外 | マリゼブ錠12.5mg |
| 院外 | マリゼブ錠25mg |
| 採用 | ミオコールスプレー0.3mg |
| 院外 | ミオピン点眼液 |
| 院外 | ミカトリオ配合錠 |
| 院外 | ミカムロ配合錠AP |
| 院外 | ミカムロ配合錠BP |
| 院外 | ミグシス錠5mg |
| 採用 | ミグリトールOD錠25mg 「サワイ」 |
| 採用 | ミグリトールOD錠50mg 「サワイ」 |
| 用時 | 小児用ミケラン細粒0.2% |
| 院外 | ミケルナ配合点眼液 |
| 用時 | ミコブティンカプセル150mg |
| 院外 | ミコンビ配合錠AP |
| 院外 | ミコンビ配合錠BP |
| 採用 | ミチグリニドCa・OD錠10mg 「JG」 |
| 用時 | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU |
| 用時 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU |
| 採用 | ミドドリン塩酸塩錠2mg 「オーハラ」 |

| | |
|----|-----------------------|
| 採用 | ミドリンP点眼液 |
| 用時 | ミニプレス錠0.5mg |
| 院外 | ミニリンメルトOD錠120 μg |
| 院外 | ミニリンメルトOD錠25 μg |
| 院外 | ミニリンメルトOD錠50 μg |
| 採用 | ミニリンメルトOD錠60 μg |
| 院外 | ミネプロOD錠1.25mg |
| 院外 | ミネプロOD錠2.5mg |
| 院外 | ミネプロOD錠5mg |
| 採用 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg 「サワイ」 |
| 採用 | ミノドロン酸錠50mg 「ニプロ」 |
| 採用 | ミヤBM細粒 |
| 採用 | ミヤBM錠 |
| 院外 | ミラペックスLA錠0.375mg |
| 院外 | ミラペックスLA錠1.5mg |
| 採用 | ミルタザビン錠15mg 「明治」 |
| 採用 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg 「アメル」 |
| 採用 | ミレーナ52mg |
| 採用 | ミンクリア内用散布液0.8% |
| 院外 | ムコスタ点眼液UD2% |
| 院外 | ムコソルバン錠15mg |
| 院外 | ムコフィリン吸入液20% |
| 用時 | ムルプレタ錠3mg |
| 用時 | ムンデシンカプセル100mg |
| 院外 | メイラックス錠1mg |
| 用時 | メーゼント錠0.25mg |
| 用時 | メーゼント錠2mg |
| 採用 | メキシチールカプセル100mg |
| 院外 | メキシチールカプセル50mg |
| 用時 | メクトビ錠15mg |
| 採用 | メコバラミン錠500 「トーワ」 |
| 院外 | メサデルム軟膏0.1% |
| 院外 | メサデルムローション0.1% |
| 採用 | メサラジン錠500mg 「ケミファ」 |
| 採用 | メスチノン錠60mg |
| 院外 | メソトレキセート錠2.5mg |
| 院外 | メタルカプターゼカプセル100mg |
| 院外 | メチルジゴキシン錠0.1mg 「NIG」 |
| 院外 | メトアナ配合錠HD |

| | |
|----|-----------------------------|
| 院外 | メトアナ配合錠LD |
| 院外 | メトグルコ錠500mg |
| 採用 | メトレキサート錠2mg「タナベ」 |
| 用時 | メトピロンカプセル250mg |
| 院外 | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」 |
| 採用 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 |
| 用時 | メドロール錠2mg |
| 院外 | メドロール錠4mg |
| 院外 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」 |
| 院外 | メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」 |
| 院外 | メノエイドコンビパッチ |
| 採用 | メプチンエアー10μg吸入100回 |
| 院外 | メプチンキッドエアー5μg吸入100回 |
| 採用 | メプチン吸入液ユニット0.3mL |
| 採用 | メプチン吸入液ユニット0.5mL |
| 採用 | メプチングレイングヘラー10μg吸入100回 |
| 採用 | メプチンドライシロップ0.005% |
| 院外 | メプチンミニ錠25μg |
| 院外 | メベンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」 |
| 院外 | メホビル配合錠HD「TCK」 |
| 院外 | メホビル配合錠HD「トーワ」 |
| 院外 | メホビル配合錠HD「日新」 |
| 院外 | メホビル配合錠HD「日新」 |
| 院外 | メホビル配合錠LD「TCK」 |
| 院外 | メホビル配合錠LD「トーワ」 |
| 院外 | メホビル配合錠LD「日新」 |
| 院外 | メホビル配合錠LD「日新」 |
| 採用 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」 |
| 採用 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」 |
| 院外 | メラトベル顆粒小児用0.2% |
| 採用 | メルカゾール錠5mg |
| 院外 | メロキシカム錠10mg「NP」 |
| 院外 | メンタックスクリーム1% |
| 用時 | モイゼルト軟膏0.3% |
| 用時 | モイゼルト軟膏1% |
| 採用 | モーラステープL40mg |
| 院外 | モーラスパップXR120mg |
| 院外 | モーラスパップXR120mg |
| 院外 | モーラスパップXR240mg |

| | |
|----|---------------------------|
| 採用 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 |
| 採用 | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 |
| 採用 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」 |
| 院外 | モディオダール錠100mg |
| 院外 | モディオダール錠100mg |
| 院外 | モビコール配合内用剤HD |
| 採用 | モビコール配合内用剤LD |
| 採用 | モビプレップ配合内用剤 |
| 採用 | モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 |
| 用時 | 【倍散】モルヒネ塩酸塩水和物散1%(10mg/g) |
| 用時 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 |
| 用時 | モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末 |
| 採用 | モンテルカストOD錠10mg「サワイ」 |
| 採用 | モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」 |
| 採用 | モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」 |
| 院外 | ヤーズフレックス配合錠 |
| 院外 | ヤクバンテープ60mg |
| 採用 | 薬用炭「日医工」 |
| 院外 | ユーエフティ配合カプセルT100 |
| 院外 | ユーゼル錠25mg |
| 用時 | ユービット錠100mg |
| 院外 | ユニシア配合錠HD |
| 院外 | ユニシア配合錠LD |
| 院外 | ユビデカレノン錠10mg「トーワ」 |
| 採用 | ユベラNソフトカプセル200mg |
| 院外 | ユベラ軟膏 |
| 院外 | ユリス錠0.5mg |
| 採用 | ユリス錠1mg |
| 院外 | ユリス錠2mg |
| 採用 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 |
| 採用 | ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-1号 |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-30号 |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-3号 |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-50号 |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-5号 |
| 採用 | ヨウ素「コザカイ・M」 |
| 用時 | ヨードカプセル-123 |
| 採用 | 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」 |

| | |
|----|------------------------|
| 用時 | タマガワヨードホルムガーゼ |
| 院外 | ヨクイニンエキス散「コタロー」 |
| 院外 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 |
| 採用 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 |
| 採用 | ラキソベロン錠2.5mg |
| 採用 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 |
| 採用 | ラグノスNF経口ゼリ一分包12g |
| 採用 | ラゲブリオ錠400mg |
| 採用 | ラコールNF配合経腸用半固体剤 |
| 院外 | ラジカット内用懸濁液2.1% |
| 院外 | ラシックス錠40mg |
| 院外 | ラジレス錠150mg |
| 用時 | ラステットSカプセル25mg |
| 採用 | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 |
| 採用 | ラツーダ錠20mg |
| 採用 | ラックビー微粒N |
| 院外 | ラピフォートワイプ2.5% |
| 採用 | ラフチジン錠10mg「トーワ」 |
| 用時 | ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」 |
| 採用 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 |
| 院外 | ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」 |
| 院外 | ラミクタール錠100mg |
| 院外 | ラミシール外用液1% |
| 採用 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 |
| 採用 | ラモトリギン錠25mg「トーワ」 |
| 用時 | ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」 |
| 院外 | ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」 |
| 採用 | ラリキシンドライシロップ小児用20% |
| 院外 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 |
| 採用 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 |
| 採用 | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 |
| 院外 | ランツジールコーワ錠30mg |
| 院外 | リアルダ錠1200mg |
| 採用 | リーバクト配合顆粒 |
| 院外 | リーバクト配合経口ゼリー |
| 採用 | リーマス錠100 |
| 院外 | リーマス錠200 |
| 採用 | リオナ錠250mg |

| | |
|----|-----------------------|
| 採用 | リオレサール錠5mg |
| 採用 | リクシアナOD錠30mg |
| 採用 | リクシアナOD錠60mg |
| 院外 | リクシアナ錠15mg |
| 院外 | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」 |
| 院外 | リザベンカプセル100mg |
| 用時 | リザベン細粒10% |
| 院外 | リスピダール錠1mg |
| 採用 | リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 |
| 採用 | リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」 |
| 院外 | リスミー錠1mg |
| 院外 | リスマダンR錠150mg |
| 院外 | リスマダンカプセル50mg |
| 院外 | リズモンTG点眼液0.5% |
| 採用 | リタリン錠10mg |
| 採用 | リタロクス懸濁用配合顆粒 |
| 採用 | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) |
| 院外 | リットフーロカプセル50mg |
| 用時 | リティンパ耳科用250μgセット |
| 採用 | リドカインテープ18mg「NP」 |
| 用時 | リトドリン塩酸塩錠5mg「F」 |
| 院外 | リドメックスコーウクリーム0.3% |
| 採用 | リドメックスコーウ軟膏0.3% |
| 院外 | リドメックスコーウローション0.3% |
| 用時 | リネゾリド錠600mg「サワイ」 |
| 採用 | リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 |
| 採用 | リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 |
| 採用 | リパクレオン顆粒300mg分包 |
| 院外 | リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」 |
| 院外 | リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」 |
| 採用 | リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」 |
| 採用 | リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」 |
| 院外 | リバゼブ配合錠HD |
| 院外 | リバゼブ配合錠LD |
| 採用 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」 |
| 採用 | リフキシマ錠200mg |
| 院外 | リフヌア錠45mg |
| 院外 | リベルサス錠14mg |
| 採用 | リベルサス錠3mg |

| | |
|----|------------------------|
| 院外 | リベルサス錠7mg |
| 採用 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 |
| 採用 | リボトリール細粒0.1% |
| 採用 | リボトリール錠0.5mg |
| 院外 | リポバス錠5 |
| 採用 | リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」 |
| 院外 | リマチル錠100mg |
| 院外 | リマチル錠50mg |
| 採用 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 |
| 院外 | リムパーザ錠100mg |
| 院外 | リムパーザ錠150mg |
| 院外 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) |
| 採用 | リルゾール錠50mg「AA」 |
| 院外 | リレンザ |
| 院外 | リンヴオック錠15mg |
| 院外 | リンヴオック錠7.5mg |
| 院外 | リンゼス錠0.25mg |
| 院外 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 |
| 院外 | リンデロン坐剤0.5mg |
| 院外 | リンデロン坐剤1.0mg |
| 採用 | リンデロンシロップ0.01% |
| 採用 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% |
| 採用 | リンデロン-Vクリーム0.12% |
| 採用 | リンデロン-VGローション |
| 採用 | リンデロン-V軟膏0.12% |
| 院外 | リンデロン-Vローション |
| 院外 | リンラキサー錠125mg |
| 院外 | ルコナック爪外用液5% |
| 院外 | ルジオミール錠10mg |
| 院外 | ルジオミール錠25mg |
| 院外 | ルセフィ錠2.5mg |
| 院外 | ルセフィ錠5mg |
| 採用 | ルナベル配合錠LD |
| 院外 | ルナベル配合錠ULD |
| 院外 | ルパフィン錠10mg |
| 採用 | ルブキネスカプセル7.9mg |
| 院外 | ルミガン点眼液0.03% |
| 採用 | ルリクールVG軟膏0.12% |
| 院外 | ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」 |

| | |
|----|--------------------------|
| 院外 | ルリコン軟膏1% |
| 院外 | ルリッド錠150 |
| 院外 | レイボー錠100mg |
| 院外 | レイボー錠50mg |
| 院外 | レキサルティOD錠0.5mg |
| 採用 | レキサルティOD錠1mg |
| 院外 | レキソタン錠1 |
| 院外 | レキソタン錠2 |
| 院外 | レキソタン錠5 |
| 院外 | レキップCR錠8mg |
| 用時 | レクタブル2mg注腸フォーム14回 |
| 採用 | レクチゾール錠25mg |
| 院外 | レグテクト錠333mg |
| 用時 | レグナイト錠300mg |
| 院外 | レザルタス配合錠HD |
| 院外 | レザルタス配合錠LD |
| 院外 | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 |
| 採用 | レスタミンコーワクリーム1% |
| 院外 | レトロゾール錠2.5mg「トーワ」 |
| 採用 | レナジエル錠250mg |
| 採用 | レナデックス錠4mg |
| 採用 | レナリドミドカプセル5mg「FNK」 |
| 採用 | レパグリニド錠0.25mg「サワイ」 |
| 院外 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 |
| 採用 | レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 |
| 採用 | レバミピド錠100mg「EMEC」 |
| 用時 | レプラミドカプセル5mg |
| 採用 | レベチラセタム錠250mg「トーワ」 |
| 採用 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 |
| 院外 | レベチラセタムDS50%「トーワ」 |
| 用時 | レベトールカプセル200mg |
| 院外 | レボカバストチン点眼液0.025%「サワイ」 |
| 採用 | レボカルニチンFF内用液10%「アメル」 |
| 採用 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」 |
| 採用 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」 |
| 採用 | レボフロキサシン錠250mg「杏林」 |
| 採用 | レボフロキサシン錠500mg「杏林」 |
| 院外 | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 |
| 院外 | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 |

| | |
|----|-----------------------------|
| 院外 | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」 |
| 採用 | レボレード錠12.5mg |
| 院外 | レルパックス錠20mg |
| 院外 | レルベア100エリプタ14吸入用 |
| 院外 | レルベア100エリプタ30吸入用 |
| 院外 | レルベア200エリプタ14吸入用 |
| 採用 | レルベア200エリプタ30吸入用 |
| 院外 | レルミナ錠40mg |
| 用時 | レンビマカプセル10mg |
| 用時 | レンビマカプセル4mg |
| 用時 | ロイケリン散10% |
| 院外 | ロイコン錠10mg |
| 院外 | ローコール錠20mg |
| 用時 | ローブレナ錠100mg |
| 院外 | ロキソニンパップ100mg |
| 採用 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 |
| 採用 | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」 |
| 採用 | ロケルマ懸濁用散分包10g |
| 採用 | ロケルマ懸濁用散分包5g |
| 院外 | ロコアテープ |
| 院外 | ロコアテープ |
| 院外 | ロコイド軟膏0.1% |
| 院外 | ロコルナール錠100mg |
| 採用 | ロサルタンK錠25mg「トーワ」 |
| 院外 | ロスーゼット配合錠HD |
| 院外 | ロスーゼット配合錠LD |
| 採用 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」 |
| 採用 | ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 |
| 用時 | ロズリートレクカプセル100mg |
| 用時 | ロズリートレクカプセル200mg |
| 院外 | ロゼックスゲル0.75% |
| 用時 | ロタテック内用液 |
| 採用 | ロタリックス内用液 |
| 採用 | ロドピン錠25mg |
| 院外 | ロナセンテープ20mg |
| 院外 | ロナセンテープ30mg |
| 採用 | ロナセンテープ40mg |
| 用時 | ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」 |
| 院外 | ロピニロールOD錠1mg「アメル」 |

| | |
|----|--------------------------|
| 採用 | ロピニロール徐放錠2mg 「KMP」 |
| 採用 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg 「NIG」 |
| 院外 | ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05% 「NIG」 |
| 採用 | ロラゼパム錠0.5mg 「サワイ」 |
| 採用 | ロラタジンOD錠10mg 「ケミファ」 |
| 院外 | ロラメット錠1.0 |
| 院外 | ロルノキシカム錠4mg 「KO」 |
| 院外 | ロレルコ錠250mg |
| 院外 | ロンサーフ配合錠T15 |
| 院外 | ロンサーフ配合錠T20 |
| 採用 | ワーファリン錠0.5mg |
| 採用 | ワーファリン錠1mg |
| 用時 | ワコビタール坐剤30 |
| 院外 | ワントラム錠100mg |