

| 採用区分 | 販売名                      |
|------|--------------------------|
| 院外   | アーリーダ錠60mg               |
| 採用   | アイオピジンUD点眼液1%            |
| 用時   | アイクルシグ錠15mg              |
| 採用   | アイセントレス錠400mg            |
| 院外   | アイドロイチン3%点眼液             |
| 院外   | アイピーディカプセル100            |
| 院外   | アイピーディドライシロップ5%          |
| 院外   | アイベータ配合点眼液               |
| 院外   | アイミクス配合錠HD               |
| 院外   | アイミクス配合錠LD               |
| 院外   | アイラミド配合懸濁性点眼液            |
| 院外   | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」         |
| 採用   | 亜鉛華軟膏「ニッコー」              |
| 院外   | アカルボース錠50mg「サワイ」         |
| 院外   | アキネトン錠1mg                |
| 院外   | アクアチム軟膏1%                |
| 用時   | アクトシン軟膏3%                |
| 用時   | アグリリンカプセル0.5mg           |
| 院外   | アコファイド錠100mg             |
| 採用   | アサコール錠400mg              |
| 採用   | アジスロマイシン錠250mg「サワイ」      |
| 院外   | アシノン錠150mg               |
| 院外   | アジマイシン点眼液1%＜製造番号 R008以降＞ |
| 採用   | 亜硝酸アミル「AFP」              |
| 採用   | アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」      |
| 院外   | アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」      |
| 院外   | アジルバ錠10mg                |
| 採用   | アジレクト錠1mg                |
| 院外   | アスタット軟膏1%                |
| 採用   | アズノールうがい液4%              |
| 採用   | アズノール軟膏0.033%            |
| 採用   | アスパラカリウム錠300mg           |
| 院外   | アスパラ-CA錠200              |
| 採用   | アスピリン「ホエイ」               |
| 採用   | アスベリン散10%                |
| 採用   | アスベリン錠10                 |
| 院外   | アスベリンシロップ0.5%            |
| 採用   | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」   |
| 採用   | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」  |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 採用 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」    |
| 採用 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」      |
| 採用 | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」      |
| 用時 | アゼプチン錠1mg                  |
| 採用 | アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」          |
| 採用 | アゾセミド錠60mg「JG」             |
| 院外 | アゾルガ配合懸濁性点眼液               |
| 院外 | アダプチノール錠5mg                |
| 院外 | アダラートCR錠10mg               |
| 院外 | アタラックス-Pドライシロップ2.5%        |
| 院外 | アテキュラ吸入用カプセル高用量            |
| 院外 | アテキュラ吸入用カプセル中用量            |
| 院外 | アテキュラ吸入用カプセル低用量            |
| 採用 | アテノロール錠25mg「日新」            |
| 採用 | アデホスコーク顆粒10%               |
| 院外 | アデホスコーク腸溶錠20               |
| 用時 | アデムパス錠0.5mg                |
| 用時 | アデムパス錠1.0mg                |
| 院外 | アテレック錠5                    |
| 院外 | アドエア100ディスクス60吸入用          |
| 院外 | アドエア250エアゾール120吸入用         |
| 院外 | アドエア250ディスクス60吸入用          |
| 院外 | アドエア500ディスクス60吸入用          |
| 院外 | アドエア50エアゾール120吸入用          |
| 院外 | アトーゼット配合錠HD                |
| 院外 | アトーゼット配合錠LD                |
| 院外 | アドフィードパップ40mg              |
| 採用 | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」       |
| 採用 | 日点アトロピン点眼液1%               |
| 院外 | アナストロゾール錠1mg「トーワ」          |
| 院外 | アナフラニール錠10mg               |
| 採用 | アナフラニール錠25mg               |
| 院外 | アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用 |
| 院外 | アニュイティ200 $\mu$ gエリプタ30吸入用 |
| 院外 | アノーロエリプタ30吸入用              |
| 院外 | アフィニール錠5mg                 |
| 用時 | アブストラル舌下錠100 $\mu$ g       |
| 用時 | アブストラル舌下錠200 $\mu$ g       |
| 用時 | アブストラル舌下錠400 $\mu$ g       |
| 採用 | アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」      |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 用時 | アプレゾリン錠10mg                     |
| 採用 | アプレピタントカプセル125mg「サワイ」           |
| 採用 | アプレピタントカプセル80mg「サワイ」            |
| 用時 | アポハイドローション20%                   |
| 用時 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」             |
| 採用 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」           |
| 院外 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」            |
| 採用 | アミティーザカプセル12 $\mu$ g            |
| 採用 | アミティーザカプセル24 $\mu$ g            |
| 院外 | アミノレバンEN配合散                     |
| 院外 | アミュー配合顆粒                        |
| 用時 | アムノレイク錠2mg                      |
| 院外 | アムロジピンOD錠10mg「トーワ」              |
| 採用 | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」             |
| 採用 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」               |
| 採用 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」          |
| 院外 | アメナリーフ錠200mg                    |
| 採用 | アモキシシリンカプセル250mg「TCK」           |
| 採用 | アモキシシリン細粒20%「TCK」               |
| 用時 | アラグリオ内用剤1.5g                    |
| 院外 | アラバ錠10mg                        |
| 用時 | アリケイス吸入液590mg                   |
| 院外 | アリッサ配合錠                         |
| 採用 | アリドネパッチ27.5mg                   |
| 採用 | アリピプラゾール錠6mg「サワイ」               |
| 用時 | アルギU配合顆粒                        |
| 用時 | アルケラン錠2mg                       |
| 院外 | アルサルミン内用液10%                    |
| 採用 | アルスロマチック関節手術用灌流液                |
| 採用 | アルダクトンA細粒10%                    |
| 院外 | アルダクトンA錠50mg                    |
| 採用 | アルト原末(1g)                       |
| 院外 | アルドメット錠125                      |
| 採用 | アルドメット錠250                      |
| 採用 | アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「フソー」 |
| 採用 | アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」  |
| 採用 | アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL        |
| 採用 | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」              |
| 院外 | アルミノニッパスカルシウム顆粒99%              |
| 院外 | アルメタ軟膏                          |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 採用 | アルロイドG内用液5%                   |
| 院外 | アレギサール点眼液0.1%                 |
| 院外 | アレグラ錠30mg                     |
| 院外 | アレサガテープ4mg                    |
| 院外 | アレジオン眼瞼クリーム0.5%               |
| 用時 | アレセンサカプセル150mg                |
| 用時 | アレビアチン散10%                    |
| 採用 | アレビアチン錠100mg                  |
| 採用 | アレンドロン酸錠35mg「VTRS」            |
| 院外 | アレンドロン酸錠5mg「VTRS」             |
| 採用 | アローゼン顆粒                       |
| 院外 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」          |
| 採用 | アロプリノール錠100mg「アメル」            |
| 採用 | アロプリノール錠50mg「アメル」             |
| 院外 | アロマシン錠25mg                    |
| 用時 | アンコチル錠500mg                   |
| 院外 | ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)              |
| 採用 | アンテベート軟膏0.05%                 |
| 採用 | アンテベートローション0.05%              |
| 採用 | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」    |
| 院外 | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「タイヨー」 |
| 採用 | アンブロキシソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」    |
| 用時 | アンペック坐剤10mg                   |
| 用時 | アンペック坐剤20mg                   |
| 院外 | イオウ・カンフルローション「東豊」             |
| 院外 | イオウ・カンフルローション「東豊」             |
| 用時 | イグザレルトOD錠10mg                 |
| 用時 | イグザレルトOD錠15mg                 |
| 用時 | イグザレルト錠2.5mg                  |
| 院外 | イクスタンジ錠40mg                   |
| 院外 | イクスタンジ錠80mg                   |
| 院外 | イグラチモド錠25mg「サワイ」              |
| 採用 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」    |
| 採用 | イスコチン錠100mg                   |
| 採用 | イスツリサ錠1mg                     |
| 採用 | イソジンガーグル液7%                   |
| 院外 | イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」       |
| 採用 | イソバイドシロップ70%分包30mL            |
| 院外 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」    |
| 院外 | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」    |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 採用 | 一硝酸イソソルビド錠20mg 「NIG」     |
| 採用 | イトラコナゾール錠50mg 「日医工」      |
| 採用 | イトラコナゾール内用液1% 「VTRS」     |
| 採用 | イナビル吸入粉末剤20mg            |
| 院外 | イニシンク配合錠                 |
| 採用 | イノソリッド配合経腸用半固形剤          |
| 院外 | イノラス配合経腸用液               |
| 院外 | イフェクサーSRカプセル37.5mg       |
| 院外 | イフェクサーSRカプセル75mg         |
| 院外 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg 「ツルハラ」 |
| 院外 | イブランス錠125mg              |
| 院外 | イブランス錠25mg               |
| 用時 | イマチニブ錠100mg 「サワイ」        |
| 院外 | イミグラン点鼻液20               |
| 院外 | イミダフェナシンOD錠0.1mg 「サワイ」   |
| 採用 | イムノブラダー勝注用80mg           |
| 用時 | イムブルビカカプセル140mg          |
| 採用 | イムラン錠50mg                |
| 院外 | イリボー錠2.5 $\mu$ g         |
| 院外 | イリボー錠5 $\mu$ g           |
| 採用 | イルベサルタン錠100mg 「トーワ」      |
| 院外 | イルベサルタン錠200mg 「トーワ」      |
| 採用 | イルベサルタン錠50mg 「トーワ」       |
| 院外 | インヴェガ錠3mg                |
| 院外 | インヴェガ錠6mg                |
| 採用 | インクレミンシロップ5%             |
| 院外 | インチュニブ錠1mg               |
| 院外 | ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)      |
| 院外 | インテバンクリーム1%              |
| 院外 | インテバン坐剤25                |
| 採用 | インデラル錠10mg               |
| 用時 | インライタ錠5mg                |
| 採用 | ウインタミン細粒(10%)            |
| 院外 | ヴォトリエント錠200mg            |
| 院外 | ヴォリブリス錠2.5mg             |
| 用時 | ウブレチド点眼液1%               |
| 院外 | ウラリット配合錠                 |
| 院外 | ウリアデック錠40mg              |
| 採用 | ウルソデオキシコール酸錠100mg 「NIG」  |
| 採用 | ウルソデオキシコール酸錠50mg 「NIG」   |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 採用 | ウルティプロ吸入用カプセル                       |
| 院外 | ウロカルン錠225mg                         |
| 院外 | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)                    |
| 院外 | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)                    |
| 院外 | エイベリス点眼液0.002%                      |
| 院外 | エースコール錠2mg                          |
| 院外 | エカード配合錠LD                           |
| 院外 | エキザルベ                               |
| 院外 | エクセグラン散20%                          |
| 院外 | エクセグラン錠100mg                        |
| 採用 | エクフィナ錠50mg                          |
| 院外 | エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> |
| 院外 | エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用           |
| 院外 | エクロックゲル5%                           |
| 用時 | エコリシン眼軟膏                            |
| 用時 | エザルミア錠100mg                         |
| 用時 | エザルミア錠50mg                          |
| 採用 | エサンブトール錠250mg                       |
| 院外 | S・M配合散                              |
| 採用 | エスクレ坐剤「250」                         |
| 院外 | エスクレ注腸用キット「500」                     |
| 採用 | SG配合顆粒                              |
| 採用 | エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」                |
| 院外 | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」                   |
| 院外 | エスゾピクロン錠3mg「DSEP」                   |
| 院外 | エスタゾラム錠2mg「アメル」                     |
| 用時 | エストラーナテープ0.09mg                     |
| 用時 | エストラーナテープ0.18mg                     |
| 用時 | エストラーナテープ0.36mg                     |
| 院外 | エストラーナテープ0.72mg                     |
| 採用 | SPトローチ0.25mg「明治」                    |
| 院外 | エスワンタイホウ配合OD錠T20                    |
| 院外 | エスワンタイホウ配合OD錠T25                    |
| 採用 | エゼチミブOD錠10mg「トーワ」                   |
| 採用 | エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」               |
| 採用 | 消毒用エタノール液IP                         |
| 採用 | エチゾラム錠0.5mg「アメル」                    |
| 院外 | エチゾラム錠1mg「アメル」                      |
| 院外 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)                  |
| 用時 | エドルミズ錠50mg                          |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 採用 | エナジア吸入用カプセル高用量                 |
| 用時 | エナジア吸入用カプセル中用量                 |
| 採用 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」        |
| 採用 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」          |
| 採用 | エナロイ錠2mg                       |
| 採用 | エネーボ配合経腸用液                     |
| 採用 | エネマスター注腸散                      |
| 用時 | エバスチンOD錠10mg「NP」               |
| 用時 | エバスチンOD錠5mg「NP」                |
| 院外 | エパデールEMカプセル2g                  |
| 採用 | エパルレスタット錠50mg「JG」              |
| 院外 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」        |
| 採用 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」           |
| 用時 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ニッター」        |
| 院外 | エビリファイOD錠3mg                   |
| 院外 | エビリファイ錠1mg                     |
| 院外 | エピレオプチマル散50%                   |
| 採用 | エフィエントOD錠20mg                  |
| 採用 | エフィエント錠3.75mg                  |
| 採用 | エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」           |
| 用時 | エプクルーサ配合錠                      |
| 採用 | エフピーOD錠2.5                     |
| 採用 | エブランチルカプセル15mg                 |
| 採用 | エプレレノン錠25mg「杏林」                |
| 採用 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」             |
| 採用 | エベレンゾ錠100mg                    |
| 採用 | エベレンゾ錠20mg                     |
| 採用 | エベレンゾ錠50mg                     |
| 採用 | MS温シップ「タイホウ」                   |
| 採用 | エムラクリーム                        |
| 採用 | エリキューズ錠2.5mg                   |
| 院外 | エリキューズ錠5mg                     |
| 院外 | エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g28噴霧用       |
| 採用 | エリスロシン錠200mg                   |
| 採用 | エリスロシンドライシロップW20%              |
| 院外 | エルカルチンFF錠100mg                 |
| 院外 | エルカルチンFF錠250mg                 |
| 院外 | エルサメットS配合錠                     |
| 採用 | エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「サワイ」 |
| 用時 | エルロチニブ錠100mg「NK」               |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 用時 | エルロチニブ錠150mg「NK」            |
| 院外 | エルロチニブ錠25mg「NK」             |
| 採用 | エレンタール配合内用剤                 |
| 採用 | エレンタールP乳幼児用配合内用剤            |
| 採用 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」          |
| 院外 | エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用 |
| 採用 | エンシュア・H                     |
| 院外 | エンシュア・リキッド                  |
| 採用 | エンタカポン錠100mg「トーワ」           |
| 採用 | エンテカビル錠0.5mg「EE」            |
| 用時 | エンドキサン錠50mg                 |
| 採用 | エンレスト錠100mg                 |
| 院外 | エンレスト錠200mg                 |
| 院外 | エンレスト錠50mg                  |
| 院外 | オイラックスHクリーム                 |
| 採用 | オイラックスクリーム10%               |
| 院外 | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)          |
| 院外 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)          |
| 院外 | オーキシス9 $\mu$ gタービューヘイラー60吸入 |
| 採用 | オーグメンチン配合錠250RS             |
| 院外 | オキサトミドDS小児用2%「サワイ」          |
| 院外 | オキサロールローション25 $\mu$ g/g     |
| 採用 | オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」       |
| 採用 | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」       |
| 用時 | オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」       |
| 採用 | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」        |
| 用時 | オキシコンチンTR錠10mg              |
| 用時 | オキシコンチンTR錠5mg               |
| 採用 | オキシドール「ヨシダ」                 |
| 採用 | オキノーム散10mg                  |
| 採用 | オキノーム散2.5mg                 |
| 採用 | オキノーム散5mg                   |
| 院外 | オスポロット錠50mg                 |
| 採用 | オゼックス点眼液0.3%                |
| 採用 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」        |
| 採用 | オセルタミビルDS3%「サワイ」            |
| 院外 | オダイン錠125mg                  |
| 院外 | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)            |
| 院外 | オテズラ錠10mg                   |
| 院外 | オテズラ錠20mg                   |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 院外 | オテズラ錠30mg                   |
| 院外 | オドリック錠1mg                   |
| 用時 | オフエブカプセル100mg               |
| 用時 | オフエブカプセル150mg               |
| 用時 | オプスミット錠10mg                 |
| 用時 | オプソ内服液10mg                  |
| 採用 | オプソ内服液5mg                   |
| 採用 | オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」        |
| 用時 | オペプリム                       |
| 用時 | オムジャラ錠100mg(14錠瓶)           |
| 用時 | オムジャラ錠150mg                 |
| 用時 | オムジャラ錠200mg                 |
| 採用 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「ニプロ」    |
| 院外 | オメプラール錠20                   |
| 採用 | オラネジン液1.5%OR消毒用アプリーケータ25mL  |
| 院外 | オラペネム小児用細粒10%               |
| 採用 | オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」         |
| 採用 | オランザピンOD錠5mg「トーワ」           |
| 採用 | オリブ油「ヨシダ」                   |
| 採用 | オルケディア錠1mg                  |
| 院外 | オルケディア錠2mg                  |
| 院外 | オルケディア錠4mg                  |
| 院外 | オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー112吸入用 |
| 採用 | オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用  |
| 院外 | オルミエント錠2mg                  |
| 院外 | オルミエント錠4mg                  |
| 採用 | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」         |
| 採用 | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」         |
| 院外 | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」         |
| 院外 | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」         |
| 採用 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」           |
| 採用 | オロパタジン点眼液0.1%「杏林」           |
| 採用 | オンジェンティス錠25mg               |
| 用時 | オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g     |
| 院外 | カイロック細粒40%                  |
| 採用 | ガスコン錠40mg                   |
| 採用 | ガスコンドロップ内服液2%               |
| 採用 | ガストログラフィン経口・注腸用             |
| 用時 | カタプレス錠75 $\mu$ g            |
| 採用 | ガチフロ点眼液0.3%                 |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 採用 | クラシエ葛根湯エキス細粒            |
| 院外 | クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス細粒     |
| 採用 | カデックス軟膏0.9%             |
| 院外 | カデュエット配合錠4番             |
| 院外 | カナグル錠100mg              |
| 用時 | カナマイシンカプセル250mg「明治」     |
| 院外 | カナリア配合OD錠               |
| 採用 | ガバベン錠200mg              |
| 用時 | ガバベン錠400mg              |
| 採用 | カプトリル錠25mg              |
| 採用 | カペシタピン錠300mg「サワイ」       |
| 採用 | カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」      |
| 採用 | カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」       |
| 用時 | カボメティクス錠20mg            |
| 用時 | カボメティクス錠60mg            |
| 院外 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)      |
| 院外 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)      |
| 院外 | カムザイオスカプセル1mg           |
| 院外 | カムザイオスカプセル2.5mg         |
| 院外 | カムザイオスカプセル5mg           |
| 採用 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」  |
| 院外 | ガランタミンOD錠12mg「トーワ」      |
| 院外 | ガランタミンOD錠12mg「トーワ」      |
| 院外 | ガランタミンOD錠12mg「トーワ」      |
| 院外 | ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       |
| 院外 | ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       |
| 院外 | ガランタミンOD錠4mg「トーワ」       |
| 採用 | ガランタミンOD錠8mg「トーワ」       |
| 採用 | カリメート経口液20%             |
| 院外 | カリメートドライシロップ92.59%      |
| 用時 | カルケンス錠100mg             |
| 院外 | カルスロット錠20               |
| 採用 | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 |
| 採用 | カルナクリン錠50               |
| 採用 | カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 |
| 採用 | カルベジロール錠1.25mg「サワイ」     |
| 採用 | カルベジロール錠10mg「トーワ」       |
| 採用 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」      |
| 採用 | カルボシステイン錠250mg「NIG」     |
| 院外 | カルボシステインシロップ5%「JG」      |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 採用 | カルボシステインDS50%「タカタ」     |
| 用時 | カログラ錠120mg             |
| 採用 | カロナール細粒20%             |
| 採用 | カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」     |
| 採用 | カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」     |
| 院外 | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)     |
| 院外 | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)       |
| 採用 | キシロカイン液「4%」            |
| 採用 | キシロカインゼリー2%            |
| 採用 | キシロカインビスカス2%           |
| 採用 | キシロカインポンプスプレー8%        |
| 院外 | キックリンカプセル250mg         |
| 採用 | 逆性石ケン液10「ヨシダ」          |
| 院外 | キャブピリン配合錠              |
| 採用 | 球形吸着炭細粒分包2g「日医工」(旧製品)  |
| 院外 | キューバール100エアゾール         |
| 採用 | 希ヨードチンキ「ニッコー」          |
| 院外 | クービビック錠25mg            |
| 採用 | クービビック錠50mg            |
| 採用 | グーフィス錠5mg              |
| 採用 | クエチアピン錠100mg「日新」       |
| 採用 | クエチアピン錠12.5mg「アメル」     |
| 採用 | クエチアピン錠25mg「日新」        |
| 採用 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」    |
| 院外 | グラアルファ配合点眼液            |
| 院外 | グラクティブ錠25mg            |
| 採用 | グラクティブ錠50mg            |
| 採用 | グラケーカプセル15mg           |
| 用時 | グラセプターカプセル0.5mg        |
| 用時 | グラセプターカプセル1mg          |
| 採用 | グラナテック点眼液0.4%          |
| 採用 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ    |
| 院外 | クラビット点眼液0.5%           |
| 採用 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」   |
| 院外 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「CH」  |
| 採用 | クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 |
| 院外 | グランダキシン錠50             |
| 院外 | クリアナール錠200mg           |
| 採用 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL |
| 採用 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL  |

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 採用 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL            |
| 採用 | グリセリン「ケンエー」                      |
| 採用 | グリセリン「ニッコー」                      |
| 採用 | グリチロン配合錠                         |
| 用時 | クリプトン(81mKr)ジェネレータ               |
| 院外 | グリミクロン錠40mg                      |
| 院外 | グリメサゾン軟膏                         |
| 採用 | グリメピリド錠0.5mg「NP」                 |
| 院外 | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「SUN」         |
| 採用 | グルコンサンK細粒4mEq/g                  |
| 院外 | グルベス配合錠                          |
| 院外 | グレースビット細粒10%                     |
| 用時 | クレセンバカプセル100mg                   |
| 院外 | クレメジン速崩錠500mg                    |
| 採用 | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」                 |
| 採用 | クロピドグレル錠75mg「ケミファ」               |
| 採用 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」    |
| 院外 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 |
| 院外 | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 |
| 採用 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」          |
| 院外 | クロベタゾン酪酸エステルローション0.05%「イワキ」      |
| 採用 | クロマイ腔錠100mg                      |
| 採用 | クロマイ-P軟膏                         |
| 院外 | クロミッド錠50mg                       |
| 採用 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」              |
| 院外 | クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」             |
| 採用 | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」     |
| 院外 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)               |
| 院外 | ケイキサレートドライシロップ76%                |
| 院外 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)              |
| 院外 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)              |
| 院外 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)            |
| 採用 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)               |
| 採用 | ケイツーシロップ0.2%                     |
| 院外 | K.C.L.エリキシル(10W/V%)              |
| 採用 | ゲーベンクリーム1%                       |
| 院外 | ケタスカプセル10mg                      |
| 院外 | ケタス点眼液0.01%                      |
| 採用 | ケトコナゾールクリーム2%「JG」                |
| 採用 | ケトコナゾールローション2%「JG」               |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 院外 | ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」 |
| 院外 | ケトプロフェンテープ20mg「トーワ」    |
| 採用 | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」    |
| 用時 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」     |
| 採用 | ケフラール細粒小児用100mg        |
| 採用 | ケレンディア錠10mg            |
| 採用 | ケレンディア錠20mg            |
| 採用 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」  |
| 採用 | コートリル錠10mg             |
| 院外 | コールタイジン点鼻液             |
| 採用 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)     |
| 院外 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)      |
| 採用 | コスパノンカプセル40mg          |
| 院外 | コソプトミニ配合点眼液            |
| 採用 | コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」     |
| 院外 | コムクロシャンプー0.05%         |
| 採用 | コムレクス耳科用液1.5%          |
| 院外 | コメリアンコーワ錠100           |
| 用時 | コララン錠2.5mg             |
| 採用 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」       |
| 採用 | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)       |
| 院外 | コレクチム軟膏0.25%           |
| 院外 | コレクチム軟膏0.5%            |
| 用時 | コレチメント錠9mg             |
| 院外 | コレバインミニ83%             |
| 用時 | コロنفォート内用懸濁液25%        |
| 院外 | コンサータ錠18mg             |
| 院外 | コンサータ錠27mg             |
| 院外 | コントミン糖衣錠12.5mg         |
| 院外 | コントミン糖衣錠25mg           |
| 院外 | コンプラビン配合錠              |
| 用時 | ザーコリカプセル200mg          |
| 用時 | ザーコリカプセル250mg          |
| 院外 | サーティカン錠0.25mg          |
| 院外 | ザーネ軟膏0.5%              |
| 採用 | サーファクテン気管注入用120mg      |
| 院外 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)  |
| 院外 | クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒         |
| 院外 | ザイティガ錠250mg            |
| 院外 | ザイティガ錠500mg            |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 院外 | サイトテック錠200               |
| 院外 | サイバインコ錠100mg             |
| 採用 | サイプレジン1%点眼液              |
| 院外 | クラシエ柴朴湯エキス細粒             |
| 院外 | クラシエ柴苓湯エキス細粒             |
| 院外 | サイレース錠2mg                |
| 用時 | 酢酸亜鉛顆粒5%「ノーベル」           |
| 採用 | 酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」           |
| 院外 | ザクラス配合錠HD                |
| 院外 | ザクラス配合錠LD                |
| 院外 | ザジテン点鼻液0.05%             |
| 用時 | サデルガカプセル100mg            |
| 院外 | サノレックス錠0.5mg             |
| 用時 | サムスカOD錠15mg              |
| 院外 | サムスカOD錠30mg              |
| 用時 | サムスカOD錠7.5mg             |
| 用時 | サムチレール内用懸濁液15%           |
| 院外 | ザラカム配合点眼液                |
| 採用 | サラザック配合顆粒                |
| 院外 | サラジェン錠5mg                |
| 採用 | サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「NIG」 |
| 院外 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」 |
| 院外 | サラゾピリン坐剤500mg            |
| 院外 | サラゾピリン錠500mg             |
| 採用 | サリグレンカプセル30mg            |
| 院外 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊        |
| 院外 | サリベートエアゾール               |
| 院外 | サルコートカプセル外用50 $\mu$ g    |
| 採用 | サルタノールインヘラー100 $\mu$ g   |
| 採用 | サルプレップ配合内用液              |
| 採用 | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」   |
| 採用 | サレドカプセル100               |
| 院外 | 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」      |
| 採用 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」      |
| 院外 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)        |
| 採用 | サンドールP点眼液                |
| 院外 | サンピロ点眼液1%                |
| 採用 | サンピロ点眼液2%                |
| 採用 | ジアゼパム錠2mg「アメル」           |
| 採用 | ジアゼパム錠5mg「アメル」           |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 採用 | シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」        |
| 院外 | シアリス錠5mg                      |
| 用時 | シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g         |
| 用時 | ツムラ紫雲膏                        |
| 院外 | ジェニナック錠200mg                  |
| 採用 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」               |
| 院外 | ジェミーナ配合錠                      |
| 採用 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 |
| 用時 | ジオトリフ錠20mg                    |
| 用時 | ジオトリフ錠30mg                    |
| 用時 | ジカディア錠150mg                   |
| 採用 | ジクアスLX点眼液3%                   |
| 院外 | ジクアス点眼液3%                     |
| 採用 | ジクトルテープ75mg                   |
| 用時 | シクレスト舌下錠5mg                   |
| 採用 | シクロスポリンカプセル10mg「サンド」          |
| 採用 | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」          |
| 院外 | シクロスポリンカプセル50mg「サンド」          |
| 採用 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」           |
| 採用 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」      |
| 採用 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」        |
| 院外 | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」     |
| 院外 | ジゴシン散0.1%                     |
| 採用 | ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」            |
| 採用 | ジスロマック細粒小児用10%                |
| 用時 | ジスロマック錠600mg                  |
| 用時 | ジセレカ錠100mg                    |
| 用時 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU          |
| 用時 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU          |
| 採用 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」            |
| 採用 | シナール配合顆粒                      |
| 採用 | シナール配合錠                       |
| 院外 | ジピリダモール錠100mg「トーワ」            |
| 採用 | ジピリダモール錠25mg「トーワ」             |
| 用時 | シプロキササン錠200mg                 |
| 採用 | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」        |
| 院外 | シムビコートタービューヘイラー60吸入           |
| 院外 | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)              |
| 用時 | ジャイパーカ錠100mg                  |
| 用時 | ジャイパーカ錠50mg                   |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 用時 | ジャカビ錠5mg                 |
| 採用 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒           |
| 採用 | ジャディアンス錠10mg             |
| 院外 | ジャディアンス錠25mg             |
| 用時 | 臭化カリウム「ヤマゼン」             |
| 採用 | 重カマ「ヨシダ」                 |
| 採用 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外 | ジュリナ錠0.5mg               |
| 院外 | ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)         |
| 院外 | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)        |
| 院外 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)        |
| 院外 | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)   |
| 採用 | 硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」   |
| 採用 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」    |
| 採用 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)        |
| 院外 | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)         |
| 採用 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 |
| 院外 | ジルテック錠10                 |
| 用時 | ジルテックドライシロップ1.25%        |
| 用時 | シルデナフィル錠20mgRE「JG」       |
| 採用 | ジレニアカプセル0.5mg            |
| 採用 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」     |
| 採用 | シロドシンOD錠4mg「ケミファ」        |
| 院外 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)       |
| 採用 | 人工涙液マイティア点眼液             |
| 用時 | 親水ワセリン「ホエイ」              |
| 院外 | ジンタス錠50mg                |
| 院外 | シンバスタチン錠5mg「SW」          |
| 院外 | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)         |
| 採用 | 新レシカルボン坐剤                |
| 院外 | スイニー錠100mg               |
| 院外 | スイニー錠100mg               |
| 採用 | スインプロイク錠0.2mg            |
| 院外 | スーグラ錠25mg                |
| 院外 | スージャヌ配合錠                 |
| 用時 | スーテントカプセル12.5mg          |
| 採用 | スープレックス吸入麻酔液             |
| 院外 | スタレボ配合錠L100              |
| 院外 | スタレボ配合錠L50               |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 用時 | スチバーガ錠40mg                 |
| 採用 | ステリゾール液2%                  |
| 院外 | ストラテラカプセル10mg              |
| 院外 | ストラテラカプセル25mg              |
| 院外 | ストラテラカプセル40mg              |
| 採用 | ストロカイン錠5mg                 |
| 用時 | ストロメクトール錠3mg               |
| 用時 | スニチニブ錠12.5mg 「NK」          |
| 院外 | スピール膏M                     |
| 採用 | スピオルトレスピマット60吸入            |
| 採用 | スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入 |
| 院外 | スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g     |
| 採用 | スピロラクトン錠25mg 「日医工」         |
| 院外 | スピロペント錠10 $\mu$ g          |
| 採用 | ズファジラン錠10mg                |
| 採用 | スマトリプタン錠50mg 「アメル」         |
| 用時 | スミスリンローション5%               |
| 採用 | スルピリド錠50mg 「サワイ」           |
| 院外 | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)         |
| 院外 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)         |
| 院外 | ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)           |
| 用時 | ゼスラン錠3mg                   |
| 院外 | ゼスラン小児用細粒0.6%              |
| 院外 | ゼスラン小児用シロップ0.03%           |
| 院外 | セタネオ点眼液0.002%              |
| 院外 | セディール錠10mg                 |
| 採用 | セパミット-R細粒2%                |
| 院外 | ゼビアックスローション2%              |
| 採用 | セファドール錠25mg                |
| 採用 | セファランチン錠1mg                |
| 採用 | セファレキシнкаプセル250mg 「トーワ」    |
| 用時 | ゼフィックス錠100                 |
| 採用 | セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg 「SW」  |
| 院外 | セフジトレン ピボキシル錠100mg 「SW」    |
| 院外 | セフジトレン ピボキシル小児用細粒10% 「SW」  |
| 院外 | セフゾン細粒小児用10%               |
| 院外 | ゼフナート外用液2%                 |
| 院外 | ゼフナートクリーム2%                |
| 院外 | ゼポジアカプセル0.92mg             |
| 院外 | ゼポジアカプセルスターターパック           |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 採用 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」         |
| 用時 | セムブリックス錠20mg              |
| 用時 | セムブリックス錠40mg              |
| 採用 | セルセプトカプセル250              |
| 院外 | セルタッチパップ70                |
| 採用 | セルトラリンOD錠25mg「アメル」        |
| 院外 | セルニルトン錠                   |
| 採用 | ゼルフォーム(No.12)             |
| 院外 | ゼルヤンツ錠5mg                 |
| 院外 | セレクトール錠200mg              |
| 採用 | セレコキシブ錠100mg「オーハラ」        |
| 採用 | セレコキシブ錠200mg「オーハラ」        |
| 用時 | セレスタミン配合シロップ              |
| 採用 | セレニカR顆粒40%                |
| 院外 | セレネース錠0.75mg              |
| 採用 | セレネース錠1.5mg               |
| 院外 | セレネース錠3mg                 |
| 院外 | セレベント50ディスクス              |
| 院外 | セロケンL錠120mg               |
| 院外 | セロシオンカプセル10               |
| 用時 | ゼンタコートカプセル3mg             |
| 採用 | センノシド錠12mg「トーワ」           |
| 院外 | ソーティクツ錠6mg                |
| 院外 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)        |
| 用時 | ゾスパタ錠40mg                 |
| 採用 | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」         |
| 採用 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」     |
| 院外 | ゾニサミド散20%「アメル」            |
| 採用 | ゾニサミド錠100mg「アメル」          |
| 採用 | ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」          |
| 採用 | ゾビラックス眼軟膏3%               |
| 採用 | ゾビラックス錠200                |
| 採用 | ソフラチュール貼付剤10cm            |
| 院外 | ゾフルーザ顆粒2%分包               |
| 用時 | ゾフルーザ錠20mg                |
| 院外 | ソランタール錠100mg              |
| 採用 | ソリタ-T配合顆粒3号               |
| 採用 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」 |
| 院外 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」   |
| 用時 | ゾリンザカプセル100mg             |

|    |   |
|----|---|
| 採用 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」                            |
| 院外 | ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」                         |
| 院外 | ソレトン錠80                                       |
| 用時 | ターゼナカプセル0.25mg                                |
| 用時 | ターゼナカプセル1mg                                   |
| 用時 | ダーブロック錠1mg                                    |
| 採用 | ダーブロック錠2mg                                    |
| 院外 | ダーブロック錠4mg                                    |
| 院外 | ダーブロック錠6mg                                    |
| 院外 | ダイアコート軟膏0.05%                                 |
| 採用 | ダイアップ坐剤4                                      |
| 採用 | ダイアップ坐剤6                                      |
| 採用 | ダイアモックス錠250mg                                 |
| 用時 | タイケルブ錠250mg                                   |
| 採用 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)                             |
| 院外 | 「山善」第二リン灰                                     |
| 院外 | タウリン散98%「大正」                                  |
| 採用 | ダクチル錠50mg                                     |
| 用時 | タグリッソ錠80mg                                    |
| 院外 | タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」                             |
| 院外 | タケキャブOD錠10mg                                  |
| 採用 | タケキャブOD錠20mg                                  |
| 院外 | タケルダ配合錠                                       |
| 採用 | タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm 1枚(フラットタイプ:レギュラーサイズ) |
| 用時 | ダサチニブ錠20mg「NK」                                |
| 採用 | ダサチニブ錠50mg「NK」                                |
| 用時 | タシグナカプセル150mg                                 |
| 用時 | タシグナカプセル200mg                                 |
| 院外 | タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」                           |
| 院外 | タダラフィル錠20mgAD「杏林」                             |
| 用時 | タナドーバ顆粒75%                                    |
| 院外 | タナトリル錠5                                       |
| 用時 | タバリス錠100mg                                    |
| 用時 | タバリス錠150mg                                    |
| 用時 | ダフクリア錠200mg                                   |
| 院外 | タプロコム配合点眼液                                    |
| 用時 | タブネオスカプセル10mg                                 |
| 採用 | タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」                        |
| 院外 | タプロスミニ点眼液0.0015%                              |
| 採用 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」                         |

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 院外 | タモキシフェン錠20mg「DSEP」         |
| 採用 | ダラシнкаプセル150mg             |
| 採用 | タリージェOD錠15mg               |
| 採用 | タリージェOD錠5mg                |
| 院外 | タリムス点眼液0.1%                |
| 採用 | タルチレリンOD錠5mg「JG」           |
| 採用 | 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末          |
| 採用 | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」      |
| 採用 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」        |
| 院外 | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「トーワ」       |
| 採用 | 単シロップ                      |
| 採用 | ダントリウムカプセル25mg             |
| 採用 | タンニン酸アルブミン「ニッコー」           |
| 院外 | チアプリド細粒10%「サワイ」            |
| 採用 | チアプリド錠25mg「NIG」            |
| 採用 | 0.025W/V%チアミトール水           |
| 採用 | チウラジール錠50mg                |
| 院外 | チガソнкаプセル10                |
| 院外 | チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」      |
| 採用 | チザニジン錠1mg「日医工」             |
| 採用 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)         |
| 院外 | チモプトール点眼液0.25%             |
| 採用 | チモロール点眼液0.5%「テイカ」          |
| 用時 | チャンピックス錠0.5mg              |
| 用時 | チャンピックス錠1mg                |
| 院外 | クラシエ猪苓湯エキス細粒               |
| 採用 | チラーヂンS錠25 $\mu$ g          |
| 採用 | チラーヂンS錠50 $\mu$ g          |
| 用時 | 5mcgチロナミン錠                 |
| 採用 | 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」            |
| 採用 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」        |
| 採用 | ツイミーグ錠500mg                |
| 用時 | ツインラインNF配合経腸用液             |
| 院外 | ツートラム錠25mg                 |
| 院外 | ツベルミン錠100mg                |
| 採用 | ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」      |
| 採用 | ツロブテロールテープ1mg「VTRS」        |
| 採用 | ツロブテロールテープ2mg「VTRS」        |
| 採用 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 |
| 採用 | ディスオーパ消毒液0.55%             |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 院外 | ディナゲスト錠0.5mg                    |
| 院外 | ディビゲル1mg                        |
| 院外 | ディフェリングル0.1%                    |
| 院外 | ディレグラ配合錠                        |
| 院外 | デエビゴ錠10mg                       |
| 採用 | デエビゴ錠2.5mg                      |
| 採用 | デエビゴ錠5mg                        |
| 院外 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」            |
| 用時 | テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」           |
| 採用 | テオロン錠100mg                      |
| 採用 | デカドロン錠0.5mg                     |
| 採用 | デカドロン錠4mg                       |
| 採用 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」           |
| 採用 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」     |
| 用時 | テクフィデラカプセル120mg                 |
| 用時 | テクフィデラカプセル240mg                 |
| 採用 | テグレート細粒50%                      |
| 採用 | テグレート錠100mg                     |
| 採用 | デシコビ配合錠HT                       |
| 採用 | デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」 |
| 用時 | デソパン錠60mg                       |
| 院外 | デタントール0.01%点眼液                  |
| 院外 | テトラミド錠10mg                      |
| 院外 | テネリアOD錠20mg                     |
| 院外 | テノーミン錠50                        |
| 院外 | テノゼット錠300mg                     |
| 採用 | デノタスチュアブル配合錠                    |
| 採用 | デパケンR錠100mg                     |
| 採用 | デパケンR錠200mg                     |
| 採用 | デパケンシロップ5%                      |
| 院外 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」          |
| 用時 | テプミトコ錠250mg                     |
| 採用 | テプレノンカプセル50mg「トーワ」              |
| 院外 | テプレノン細粒10%「トーワ」                 |
| 院外 | デベルザ錠20mg                       |
| 用時 | デムサーカプセル250mg                   |
| 用時 | テモゾロミド錠100mg「NK」                |
| 用時 | テモゾロミド錠20mg「NK」                 |
| 院外 | デュアック配合ゲル                       |
| 院外 | デュオトラバ配合点眼液                     |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 採用 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」        |
| 院外 | デュファストン錠5mg                    |
| 採用 | デュロキシチンOD錠20mg「ニプロ」            |
| 院外 | テリルジー100エリプタ14吸入用              |
| 採用 | テリルジー100エリプタ30吸入用              |
| 院外 | テリルジー200エリプタ14吸入用              |
| 採用 | テリルジー200エリプタ30吸入用              |
| 採用 | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」           |
| 採用 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」           |
| 院外 | テルビナフィン錠125mg「サワイ」             |
| 採用 | テルミサルタン錠20mg「ニプロ」              |
| 採用 | テルミサルタン錠40mg「ニプロ」              |
| 院外 | テルミサルタン錠80mg「日医工」              |
| 院外 | テレミンソフト坐薬2mg                   |
| 採用 | トアラセット配合錠「オーハラ」                |
| 院外 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)             |
| 院外 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)              |
| 院外 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)       |
| 院外 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)             |
| 採用 | トウモロコシデンプン「ヨシダ」                |
| 採用 | ドキサゾシン錠0.5mg「トーワ」              |
| 採用 | ドキサゾシン錠1mg「トーワ」                |
| 院外 | ドキサゾシン錠2mg「トーワ」                |
| 院外 | ドキサゾシン錠4mg「トーワ」                |
| 院外 | ドグマチール錠100mg                   |
| 採用 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」 |
| 採用 | トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「トーワ」     |
| 採用 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」           |
| 採用 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」            |
| 採用 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」            |
| 採用 | ドパコール配合錠L100                   |
| 用時 | ドバトン散98.5%                     |
| 院外 | トビエース錠4mg                      |
| 院外 | トピナ錠50mg                       |
| 採用 | ドプスOD錠100mg                    |
| 用時 | ドプテレット錠20mg                    |
| 採用 | トブラシン点眼液0.3%                   |
| 院外 | トフラニール錠10mg                    |
| 院外 | ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g           |
| 院外 | ドボベットゲル                        |

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 院外 | ドボベツト軟膏                           |
| 院外 | ドボベツトフォーム                         |
| 院外 | ドラール錠15                           |
| 院外 | トラセミドOD錠4mg「TE」                   |
| 採用 | トラゼンタ錠5mg                         |
| 採用 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」                |
| 院外 | トラディアンス配合錠AP                      |
| 院外 | トラディアンス配合錠BP                      |
| 採用 | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」                |
| 採用 | トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」             |
| 院外 | トラベルミン配合錠                         |
| 院外 | トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」            |
| 採用 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」              |
| 採用 | トランサミン散50%                        |
| 用時 | トランデート錠50mg                       |
| 院外 | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」               |
| 院外 | トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 $\mu$ g「大正」 |
| 院外 | トリキュラー錠28                         |
| 採用 | トリクロリールシロップ10%                    |
| 採用 | トリクロルメチアジド錠1mg「NP」                |
| 院外 | トリクロルメチアジド錠2mg「NP」                |
| 院外 | トリプタノール錠10                        |
| 院外 | トリプタノール錠25                        |
| 採用 | トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「NIG」            |
| 採用 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」           |
| 院外 | トリンテリックス錠10mg                     |
| 用時 | トルカプ錠160mg                        |
| 用時 | トルカプ錠200mg                        |
| 用時 | トルソプト点眼液1%                        |
| 採用 | トルバプタンOD錠15mg「トーワ」                |
| 採用 | トルバプタンOD錠3.75mg「TE」               |
| 採用 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」              |
| 採用 | ドルモロール配合点眼液「わかもと」                 |
| 採用 | トレーランG液50g                        |
| 採用 | トレーランG液75g                        |
| 院外 | トレリーフOD錠50mg                      |
| 採用 | トロピカミド点眼液0.4%「日点」                 |
| 採用 | トロンビン液モチダソフトボトル1万                 |
| 採用 | 経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」             |
| 採用 | ドンペリドン錠10mg「NIG」                  |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 採用 | ナイキサン錠100mg                   |
| 院外 | ナウゼリンOD錠10                    |
| 採用 | ナウゼリン坐剤10                     |
| 採用 | ナウゼリン坐剤30                     |
| 院外 | ナウゼリンドライシロップ1%                |
| 採用 | ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」           |
| 採用 | ナゼアOD錠0.1mg                   |
| 院外 | ナディック錠30mg                    |
| 院外 | ナテグリニド錠90mg「日医工」              |
| 採用 | ナフトピジルOD錠25mg「ケミファ」           |
| 院外 | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」             |
| 用時 | ナルサス錠12mg                     |
| 用時 | ナルサス錠2mg                      |
| 院外 | ナルティークOD錠75mg                 |
| 採用 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 $\mu$ g「フソー」 |
| 用時 | ナルラピド錠1mg                     |
| 用時 | ナルラピド錠4mg                     |
| 用時 | ニコチネルTTS10                    |
| 用時 | ニコチネルTTS20                    |
| 用時 | ニコチネルTTS30                    |
| 院外 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」             |
| 採用 | ニコランジル錠5mg「サワイ」               |
| 採用 | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」               |
| 採用 | ニトラゼパム錠5mg「NIG」               |
| 採用 | ニトロペン舌下錠0.3mg                 |
| 院外 | ニバジール錠2mg                     |
| 院外 | ニバジール錠4mg                     |
| 院外 | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」             |
| 院外 | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」             |
| 採用 | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」            |
| 院外 | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」            |
| 採用 | ニフラン点眼液0.1%                   |
| 採用 | ニフレック配合内用剤                    |
| 採用 | 乳酸カルシウム「VTRS」原末               |
| 採用 | 乳糖水和物「ホエイ」                    |
| 院外 | ニュープロパッチ13.5mg                |
| 院外 | ニュープロパッチ2.25mg                |
| 採用 | ニュープロパッチ4.5mg                 |
| 院外 | ニュープロパッチ9mg                   |
| 院外 | ニューレプチル細粒10%                  |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 採用 | ニューレプチル錠5mg           |
| 院外 | ニューベクオ錠300mg          |
| 採用 | 尿素クリーム20%「SUN」        |
| 院外 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒        |
| 用時 | ニンラーロカプセル2.3mg        |
| 用時 | ニンラーロカプセル3mg          |
| 用時 | ニンラーロカプセル4mg          |
| 採用 | ネイサート坐剤               |
| 院外 | ネイリンカプセル100mg         |
| 用時 | ネオーラル25mgカプセル         |
| 用時 | ネオーラル50mgカプセル         |
| 用時 | ネオーラル内用液10%           |
| 院外 | ネオキシテープ73.5mg(1袋7枚包装) |
| 採用 | ネオシネジンコーワ5%点眼液        |
| 採用 | ネオ消アル「ヨシダ」            |
| 院外 | ネオフィリン錠100mg          |
| 採用 | ネオメドロールEE軟膏           |
| 用時 | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg      |
| 用時 | ネクサバール錠200mg          |
| 採用 | ネシーナ錠12.5mg           |
| 院外 | ネシーナ錠25mg             |
| 院外 | ネシーナ錠6.25mg           |
| 院外 | ネリゾナ軟膏0.1%            |
| 院外 | ノアルテン錠(5mg)           |
| 採用 | ノイロトロピン錠4単位           |
| 用時 | ノウリアスト錠20mg           |
| 院外 | ノックビン原末               |
| 採用 | ノバミン錠5mg              |
| 院外 | ノルスパンテープ10mg          |
| 院外 | ノルスパンテープ5mg           |
| 採用 | ハーフジゴキシンKY錠0.125      |
| 用時 | ハーボニー配合錠              |
| 院外 | バイアグラ錠50mg            |
| 採用 | バイアスピリン錠100mg         |
| 採用 | ハイドレアカプセル500mg        |
| 用時 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)    |
| 院外 | ハイパジールコーワ点眼液0.25%     |
| 採用 | ハイポアルコール液2%「ヤクハン」     |
| 院外 | パキシルCR錠12.5mg         |
| 院外 | パキシルCR錠25mg           |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 採用 | パキロビッドパック300(旧製品：リトナビル 識別コードNK) |
| 採用 | パキロビッドパック600(旧製品：リトナビル 識別コードNK) |
| 採用 | バクスマー一点鼻粉末剤3mg                  |
| 採用 | バクトラミン配合顆粒                      |
| 採用 | バクトラミン配合錠                       |
| 用時 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%                   |
| 採用 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)               |
| 院外 | バソメット錠1mg                       |
| 院外 | バソレーターテープ27mg                   |
| 院外 | クラシエ八味地黄丸料エキス細粒                 |
| 採用 | ハッカ油「ケンエー」                      |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化亜鉛2%                |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化アルミニウム2%            |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化金酸0.2%              |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化コバルト2%              |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化第二水銀0.05%           |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化第二スズ1%              |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化第二鉄2%               |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化白金酸0.5%             |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化パラジウム1%             |
| 用時 | パッチテスト試薬金属塩化マンガン2%              |
| 用時 | パッチテスト試薬金属三塩化インジウム1%            |
| 用時 | パッチテスト試薬金属臭化銀2%                 |
| 用時 | パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム0.5%         |
| 用時 | パッチテスト試薬金属四塩化イリジウム1%            |
| 用時 | パッチテスト試薬金属硫酸銅1%                 |
| 用時 | パッチテスト試薬金属硫酸ニッケル5%              |
| 用時 | パッチテストパネル(S)                    |
| 院外 | バナンドライシロップ5%                    |
| 用時 | パニマイシン点眼液0.3%                   |
| 院外 | バフセオ錠150mg                      |
| 院外 | バフセオ錠300mg                      |
| 採用 | バラシクロビル顆粒50%「トーワ」               |
| 採用 | バラシクロビル錠500mg「SPKK」             |
| 採用 | バラマイシン軟膏                        |
| 採用 | パラミジンカプセル300mg                  |
| 採用 | バリエース発泡顆粒                       |
| 採用 | バリキサ錠450mg                      |
| 採用 | バリテスターA240散                     |
| 院外 | ハルシオン0.25mg錠                    |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 採用 | パルタンM錠0.125mg                 |
| 院外 | バルバーサ錠3mg                     |
| 院外 | バルバーサ錠4mg                     |
| 院外 | バルバーサ錠5mg                     |
| 採用 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」         |
| 院外 | パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入 |
| 院外 | パルモディアXR錠0.2mg                |
| 院外 | パルモディアXR錠0.4mg                |
| 採用 | パルモディア錠0.1mg                  |
| 院外 | ハルロピテープ <sup>®</sup> 24mg     |
| 採用 | ハルロピテープ <sup>®</sup> 8mg      |
| 採用 | パロキセチン錠10mg「トーワ」              |
| 採用 | パロキセチン錠20mg「トーワ」              |
| 院外 | パロキセチン錠5mg「トーワ」               |
| 院外 | クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒                |
| 採用 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)            |
| 院外 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)          |
| 採用 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」           |
| 用時 | バンコマイシン眼軟膏1%                  |
| 採用 | パンテチン錠100mg「シオエ」              |
| 採用 | 調剤用パンピタン末                     |
| 採用 | ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「わかもと」     |
| 採用 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーワ」       |
| 院外 | ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」      |
| 院外 | ヒアレイン点眼液0.3%                  |
| 院外 | ヒアレインミニ点眼液0.1%                |
| 院外 | ヒアレインミニ点眼液0.3%                |
| 採用 | PA・ヨード点眼・洗眼液                  |
| 採用 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%       |
| 院外 | ピーゼットシー糖衣錠2mg                 |
| 院外 | ピートル顆粒分包250mg                 |
| 院外 | ピートルチュアブル錠250mg               |
| 採用 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6mL           |
| 用時 | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL        |
| 採用 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」           |
| 院外 | ビオスリー配合散                      |
| 採用 | ビオスリー配合錠                      |
| 院外 | ビオチン散0.2%「フソー」                |
| 採用 | ビオフィェルミンR散                    |
| 院外 | ビオフィェルミンR錠                    |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 採用 | ビカルタミドOD錠80mg「ケミファ」       |
| 院外 | ビクシリンカプセル250mg            |
| 採用 | ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」   |
| 用時 | ビジクリア配合錠                  |
| 採用 | ビスコート0.5眼粘弾剤              |
| 院外 | ビソノテープ2mg                 |
| 採用 | ビソノテープ4mg                 |
| 採用 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 |
| 採用 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」   |
| 院外 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」     |
| 採用 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」     |
| 用時 | ビタミンB6散10%「マルイシ」          |
| 院外 | ビタメジン配合カプセルB25            |
| 採用 | ビダラビン軟膏3%「SW」             |
| 院外 | ヒダントールF配合錠                |
| 院外 | ヒダントール錠25mg               |
| 採用 | ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 |
| 採用 | ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」      |
| 採用 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」    |
| 院外 | ビビアント錠20mg                |
| 採用 | ビブラマイシン錠100mg             |
| 院外 | ビベスピエアロスフィア120吸入          |
| 院外 | ビペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」         |
| 用時 | ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」          |
| 用時 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」          |
| 採用 | ビムパット錠50mg                |
| 院外 | ビムパットドライシロップ10%           |
| 院外 | ピメノールカプセル50mg             |
| 採用 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」         |
| 院外 | クラシエ白虎加人参湯エキス細粒           |
| 院外 | ビラノア錠20mg                 |
| 用時 | ビラフトビカプセル50mg             |
| 用時 | ビラフトビカプセル75mg             |
| 採用 | ピラマイド原末                   |
| 採用 | ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」         |
| 採用 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」  |
| 院外 | ビルダグリプチン錠50mg「サワイ」        |
| 院外 | ビルタサ懸濁用散分包8.4g            |
| 院外 | ヒルドイドソフト軟膏0.3%            |
| 院外 | ヒルドイドフォーム0.3%             |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 採用 | ヒルドイドローション0.3%            |
| 用時 | ビルトリシド錠600mg              |
| 院外 | ヒルナミン錠(5mg)               |
| 用時 | ピルフェニドン錠200mg「日医工」        |
| 院外 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入        |
| 採用 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入         |
| 院外 | ピレチア錠(25mg)               |
| 採用 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」    |
| 院外 | ビンダケルカプセル20mg             |
| 院外 | ビンマックカプセル61mg             |
| 用時 | ファビハルタカプセル200mg           |
| 用時 | ファムシクロビル錠250mg「トーワ」       |
| 採用 | ファモチジン散10%「サワイ」           |
| 採用 | ファモチジンD錠10mg「EMEC」        |
| 採用 | ファモチジンD錠20mg「EMEC」        |
| 院外 | ファロム錠200mg                |
| 院外 | ファロムドライシロップ小児用10%         |
| 採用 | ファンギゾンシロップ100mg/mL        |
| 採用 | フィコンパ錠2mg                 |
| 用時 | フィコンパ錠4mg                 |
| 院外 | ブイタマークリーム1%               |
| 採用 | フィブラストスプレー500             |
| 用時 | フィンテプラ内用液2.2mg/mL         |
| 院外 | フェアストーン錠40                |
| 採用 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」    |
| 採用 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」     |
| 院外 | フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」      |
| 院外 | フェノバルエリキシル0.4%            |
| 採用 | フェノバル散10%                 |
| 採用 | フェノバル錠30mg                |
| 採用 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」      |
| 採用 | フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」     |
| 院外 | フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」     |
| 院外 | フェブキソスタット錠40mg「サワイ」       |
| 採用 | フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」        |
| 採用 | フェロ・グラデュメット錠105mg         |
| 採用 | フェロベリン配合錠                 |
| 採用 | フェタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 |
| 採用 | フェタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 |
| 用時 | フェントステープ0.5mg             |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 用時 | フェントステープ1mg              |
| 用時 | フェントステープ4mg              |
| 採用 | フォシーガ錠10mg               |
| 採用 | フォシーガ錠5mg                |
| 院外 | フォゼベル錠10mg               |
| 院外 | フォゼベル錠20mg               |
| 院外 | フォゼベル錠5mg                |
| 採用 | フォリアミン錠                  |
| 用時 | ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)         |
| 採用 | ブコラム口腔用液10mg             |
| 採用 | ブコラム口腔用液2.5mg            |
| 採用 | ブコラム口腔用液5mg              |
| 採用 | ブコラム口腔用液7.5mg            |
| 採用 | フスコデ配合錠                  |
| 院外 | ブセレリン点鼻液0.15%「F」         |
| 採用 | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」  |
| 採用 | ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」      |
| 用時 | プラザキサカプセル110mg           |
| 用時 | プラザキサカプセル75mg            |
| 採用 | フラジール錠250mg              |
| 採用 | フラジール内服錠250mg            |
| 院外 | ブラダロン錠200mg              |
| 院外 | プラノバル配合錠                 |
| 院外 | プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」      |
| 院外 | プラビックス錠25mg              |
| 採用 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「FFP」 |
| 院外 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「FFP」   |
| 院外 | プランルカスト錠112.5mg「AFP」     |
| 採用 | プランルカスト錠225mg「AFP」       |
| 採用 | プランルカストDS10%「タカタ」        |
| 採用 | ブリィビアクト錠25mg             |
| 院外 | フリバスOD錠75mg              |
| 院外 | プリビナ液0.05%               |
| 院外 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「NIT」   |
| 採用 | プリモボラン錠5mg               |
| 採用 | ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ニッター」    |
| 採用 | フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」   |
| 採用 | フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」    |
| 院外 | ブルキンザカプセル80mg            |
| 採用 | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」    |

|    |   |
|----|---|
| 採用 | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」                          |
| 用時 | フルタイド100ディスクス                               |
| 院外 | フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用                  |
| 用時 | フルタイド200ディスクス                               |
| 採用 | フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用                  |
| 採用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 $\mu$ g「トーワ」56噴霧用 |
| 採用 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用                      |
| 院外 | フルティフォーム50エアゾール56吸入用                        |
| 用時 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」                           |
| 院外 | ブルフェン錠100                                   |
| 院外 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」                     |
| 採用 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」                     |
| 用時 | フルミスト点鼻液                                    |
| 院外 | フルメタ軟膏                                      |
| 院外 | フルメタローション                                   |
| 採用 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「KO」                          |
| 採用 | プレガバリンOD錠25mg「サワイ」                          |
| 採用 | プレガバリンOD錠75mg「サワイ」                          |
| 採用 | プレグランディン腔坐剤1mg                              |
| 院外 | ブレディニン錠50                                   |
| 採用 | プレドニゾロン散「タケダ」1%                             |
| 採用 | プレドニゾロン錠1mg(旭化成)                            |
| 採用 | プレドニゾロン錠2.5mg「NP」                           |
| 院外 | プレドニン眼軟膏                                    |
| 採用 | プレドニン錠5mg                                   |
| 用時 | プレバイミス錠240mg                                |
| 院外 | プレマリン錠0.625mg                               |
| 院外 | プレミネント配合錠HD                                 |
| 院外 | プレミネント配合錠LD                                 |
| 採用 | プロウベス腔用剤10mg                                |
| 院外 | プロクトセディル坐薬                                  |
| 採用 | プロクトセディル軟膏                                  |
| 採用 | プログラフカプセル0.5mg                              |
| 採用 | プログラフカプセル1mg                                |
| 院外 | プログラフ顆粒0.2mg                                |
| 院外 | フロジン外用液5%                                   |
| 院外 | プロスターールL錠50mg                               |
| 用時 | プロスターール錠25                                  |
| 採用 | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」                       |
| 採用 | プロスタンディン軟膏0.003%                            |

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 採用 | フロセミド細粒4%「EMEC」                  |
| 採用 | フロセミド錠10mg「NP」                   |
| 採用 | フロセミド錠20mg「NIG」                  |
| 採用 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」             |
| 院外 | プロトピック軟膏0.03%小児用                 |
| 採用 | プロナーゼMS                          |
| 院外 | ブロナンセリン錠4mg「アメル」                 |
| 院外 | プロノン錠150mg                       |
| 院外 | プロペシア錠0.2mg                      |
| 院外 | プロペシア錠1mg                        |
| 採用 | プロペト                             |
| 院外 | プロベラ錠2.5mg                       |
| 用時 | プロボコリン吸入粉末溶解用100mg               |
| 採用 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」             |
| 採用 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」          |
| 院外 | ブロムペリドール錠1mg「アメル」                |
| 院外 | ブロムペリドール錠3mg「アメル」                |
| 用時 | ブロメライン軟膏5万単位/g                   |
| 用時 | ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」              |
| 用時 | フロリードゲル経口用2%                     |
| 採用 | フロリード膣坐剤100mg                    |
| 院外 | フロリードDクリーム1%                     |
| 採用 | フロリネフ錠0.1mg                      |
| 院外 | ベージニオ錠100mg                      |
| 院外 | ベージニオ錠150mg                      |
| 院外 | ベージニオ錠50mg                       |
| 採用 | ベオーバ錠50mg(旧包装品)                  |
| 採用 | ベサコリン散5%                         |
| 院外 | ベザトールSR錠200mg                    |
| 用時 | ベサノイドカプセル10mg                    |
| 採用 | ベストロン点眼用0.5%                     |
| 院外 | ベセルナクリーム5%                       |
| 採用 | ベタセレミン配合錠                        |
| 院外 | ベタニス錠25mg                        |
| 院外 | ベタニス錠50mg                        |
| 採用 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」             |
| 採用 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」                |
| 院外 | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 |
| 採用 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」                |
| 採用 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」                |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 用時 | ベネクレクスタ錠100mg             |
| 用時 | ベネクレクスタ錠10mg              |
| 用時 | ベネクレクスタ錠50mg              |
| 院外 | ベネット錠17.5mg               |
| 院外 | ベネット錠75mg                 |
| 採用 | ベノキシール点眼液0.4%             |
| 採用 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」   |
| 採用 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」   |
| 採用 | ヘパンED配合内用剤                |
| 院外 | ベピオウォッシュジェル5%             |
| 院外 | ベピオローション2.5%              |
| 院外 | ベプリコール錠100mg              |
| 採用 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」         |
| 採用 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「トーワ」     |
| 採用 | ヘマンジオルシロップ小児用0.375%       |
| 採用 | ベムリディ錠25mg                |
| 採用 | ヘモポリゾン軟膏                  |
| 院外 | ベラサスLA錠60 $\mu$ g         |
| 用時 | ペラゾリン細粒400mg              |
| 採用 | ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」       |
| 採用 | ベラプロストNa錠20 $\mu$ g「VTRS」 |
| 院外 | ペリアクチンシロップ0.04%           |
| 院外 | ベリキューボ錠10mg               |
| 採用 | ベリキューボ錠2.5mg              |
| 院外 | ベリキューボ錠5mg                |
| 院外 | ベリチーム配合顆粒                 |
| 用時 | ベリプラスTPコンビセット組織接着用0.5mL製剤 |
| 院外 | ペルジピンLAカプセル20mg           |
| 院外 | ペルジピンLAカプセル40mg           |
| 採用 | ベルソムラ錠15mg                |
| 採用 | ベルソムラ錠20mg                |
| 採用 | ベルベゾロンF点眼・点鼻液             |
| 院外 | ヘルベッサ錠30                  |
| 用時 | ペルマックス錠250 $\mu$ g        |
| 用時 | ベレキシブル錠80mg               |
| 採用 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」        |
| 院外 | ベロテックエロゾル100              |
| 採用 | ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」        |
| 用時 | ペンタサ顆粒94%                 |
| 院外 | ペンタサ坐剤1g                  |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 院外 | ペンタサ注腸1g                        |
| 用時 | ペンレステープ18mg                     |
| 用時 | ボイデヤ錠50mg                       |
| 院外 | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)              |
| 院外 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)              |
| 採用 | ボースデル内用液10                      |
| 院外 | ホーリン錠1mg                        |
| 採用 | ホーリンV腔用錠1mg                     |
| 院外 | ホクナリンテープ0.5mg                   |
| 院外 | ホクナリンテープ1mg                     |
| 院外 | ホクナリンテープ2mg                     |
| 院外 | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用             |
| 採用 | ボグリボースOD錠0.2mg「ケミファ」            |
| 採用 | ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」            |
| 用時 | ボシュリフ錠100mg                     |
| 院外 | ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」     |
| 院外 | ホスミンS耳科用3%                      |
| 採用 | ボスミン外用液0.1%                     |
| 採用 | ホスリボン配合顆粒                       |
| 採用 | ボセンタン錠62.5mg「VTRS」              |
| 用時 | ボチシート20%                        |
| 採用 | クラシエ補中益気湯エキス細粒                  |
| 院外 | ボノサップパック400                     |
| 院外 | ボノサップパック800                     |
| 院外 | ボノテオ錠1mg                        |
| 院外 | ボノピオンパック                        |
| 採用 | ポビシュガーパスタ軟膏                     |
| 採用 | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」             |
| 採用 | ポピヨドンゲル10%                      |
| 採用 | ポピヨドンスクラブ7.5%                   |
| 用時 | ポマリストカプセル2mg                    |
| 用時 | ポマリストカプセル3mg                    |
| 用時 | ポマリストカプセル4mg                    |
| 院外 | ポラキス錠3                          |
| 採用 | ボラザG軟膏                          |
| 採用 | ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」             |
| 院外 | ポララミンドライシロップ0.2%                |
| 用時 | ポリコナゾール錠200mg「トーワ」              |
| 採用 | ポリコナゾール錠50mg「トーワ」               |
| 院外 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 採用 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 |
| 院外 | ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g<ハチ> |
| 採用 | ポリフル錠500mg                     |
| 院外 | ボルタレンSRカプセル37.5mg              |
| 院外 | ボルタレンサポ25mg                    |
| 採用 | ボルタレンローション1%                   |
| 採用 | ボルヒール組織接着用(3mL)                |
| 採用 | ボルヒール組織接着用(5mL)                |
| 院外 | ボンアルファクリーム2 $\mu$ g/g          |
| 院外 | ボンアルファ軟膏2 $\mu$ g/g            |
| 院外 | ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g/g         |
| 院外 | ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g      |
| 院外 | ボンアルファローション2 $\mu$ g/g         |
| 用時 | ボンゾール錠100mg                    |
| 院外 | ポントールシロップ3.25%                 |
| 院外 | マーデュオックス軟膏                     |
| 院外 | マイコスポールクリーム1%                  |
| 院外 | マイザークリーム0.05%                  |
| 採用 | マイザー軟膏0.05%                    |
| 院外 | マイスタン細粒1%                      |
| 院外 | マイスタン細粒1%                      |
| 採用 | マイスタン錠5mg                      |
| 用時 | マイテラーゼ錠10mg                    |
| 用時 | マイトマイシン眼科外用液用2mg               |
| 用時 | マヴィレット配合錠                      |
| 院外 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)               |
| 採用 | マキサカルシトール軟膏25 $\mu$ g/g「タカタ」   |
| 院外 | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用)             |
| 採用 | マグコロール散68%分包50g                |
| 用時 | 0.02W/V% マスキン水                 |
| 採用 | マスキンスクラブ4%                     |
| 院外 | マドパー配合錠L100                    |
| 用時 | マブリン散1%                        |
| 院外 | マリゼブ錠12.5mg                    |
| 院外 | マリゼブ錠25mg                      |
| 採用 | ミオコールスプレー0.3mg                 |
| 院外 | ミオピン点眼液                        |
| 院外 | ミカトリオ配合錠                       |
| 院外 | ミカムロ配合錠AP                      |
| 院外 | ミカムロ配合錠BP                      |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 院外 | ミグシス錠5mg              |
| 採用 | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」    |
| 採用 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」    |
| 用時 | 小児用ミケラン細粒0.2%         |
| 院外 | ミケルナ配合点眼液             |
| 用時 | ミコブティンカプセル150mg       |
| 院外 | ミコンビ配合錠AP             |
| 院外 | ミコンビ配合錠BP             |
| 採用 | ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」  |
| 用時 | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU  |
| 用時 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU   |
| 採用 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」    |
| 採用 | ミドリンP点眼液              |
| 用時 | ミニプレス錠0.5mg           |
| 院外 | ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g |
| 院外 | ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g  |
| 院外 | ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g  |
| 採用 | ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g  |
| 院外 | ミネブロOD錠1.25mg         |
| 院外 | ミネブロOD錠2.5mg          |
| 院外 | ミネブロOD錠5mg            |
| 採用 | ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」      |
| 採用 | ミヤBM細粒                |
| 採用 | ミヤBM錠                 |
| 院外 | ミラベックスLA錠0.375mg      |
| 院外 | ミラベックスLA錠1.5mg        |
| 採用 | ミルタザピン錠15mg「明治」       |
| 採用 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」  |
| 採用 | ミレーナ52mg              |
| 採用 | ミンクリア内用散布液0.8%        |
| 院外 | ムコスタ点眼液UD2%           |
| 院外 | ムコソルバン錠15mg           |
| 院外 | ムコフィリン吸入液20%          |
| 用時 | ムルプレタ錠3mg             |
| 用時 | ムンデシンカプセル100mg        |
| 院外 | メイラックス錠1mg            |
| 用時 | メーゼント錠0.25mg          |
| 用時 | メーゼント錠2mg             |
| 採用 | メキシチールカプセル100mg       |
| 採用 | メキシチールカプセル50mg        |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 用時 | メクトビ錠15mg                    |
| 採用 | メコバラミン錠500「トーワ」              |
| 院外 | メサデルム軟膏0.1%                  |
| 院外 | メサデルムローション0.1%               |
| 採用 | メサラジン錠500mg「ケミファ」            |
| 採用 | メスチノン錠60mg                   |
| 院外 | メソトレキセート錠2.5mg               |
| 院外 | メタルカプターゼカプセル100mg            |
| 院外 | メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」          |
| 院外 | メトアナ配合錠HD                    |
| 院外 | メトアナ配合錠LD                    |
| 院外 | メトグルコ錠500mg                  |
| 採用 | メトクロプラミド錠5mg「NIG」            |
| 採用 | メトトレキサート錠2mg「タナベ」            |
| 用時 | メトピロンカプセル250mg               |
| 院外 | メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NIG」        |
| 採用 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」       |
| 用時 | メドロール錠2mg                    |
| 院外 | メドロール錠4mg                    |
| 院外 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」  |
| 院外 | メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」        |
| 院外 | メノエイドコンビパッチ                  |
| 採用 | メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回      |
| 院外 | メプチンキッドエア-5 $\mu$ g吸入100回    |
| 採用 | メプチン吸入液ユニット0.3mL             |
| 採用 | メプチン吸入液ユニット0.5mL             |
| 採用 | メプチンスイングヘラー-10 $\mu$ g吸入100回 |
| 採用 | メプチンドライシロップ0.005%            |
| 院外 | メプチンミニ錠25 $\mu$ g            |
| 院外 | メペンゾラート臭化物錠7.5mg「ツルハラ」       |
| 院外 | メホビル配合錠HD「TCK」               |
| 院外 | メホビル配合錠HD「トーワ」               |
| 院外 | メホビル配合錠HD「日新」                |
| 院外 | メホビル配合錠HD「日新」                |
| 院外 | メホビル配合錠LD「TCK」               |
| 院外 | メホビル配合錠LD「トーワ」               |
| 院外 | メホビル配合錠LD「日新」                |
| 院外 | メホビル配合錠LD「日新」                |
| 採用 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」          |
| 採用 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」           |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 院外 | メラトベル顆粒小児用0.2%               |
| 採用 | メルカゾール錠5mg                   |
| 院外 | メロキシカム錠10mg「NP」              |
| 院外 | メンタックスクリーム1%                 |
| 用時 | モイゼルト軟膏0.3%                  |
| 用時 | モイゼルト軟膏1%                    |
| 採用 | モーラステープL40mg                 |
| 院外 | モーラスパップXR120mg               |
| 院外 | モーラスパップXR120mg               |
| 院外 | モーラスパップXR240mg               |
| 採用 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」         |
| 採用 | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」           |
| 採用 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「トーワ」          |
| 院外 | モディオダール錠100mg                |
| 院外 | モディオダール錠100mg                |
| 院外 | モビコール配合内用剤HD                 |
| 採用 | モビコール配合内用剤LD                 |
| 採用 | モビプレップ配合内用剤                  |
| 採用 | モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「トーワ」56噴霧用 |
| 用時 | 【倍散】モルヒネ塩酸塩水和物散1%(10mg/g)    |
| 用時 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」            |
| 用時 | モルヒネ塩酸塩水和物「第一三共」原末           |
| 採用 | モンテルカストOD錠10mg「サワイ」          |
| 採用 | モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」            |
| 採用 | モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」        |
| 院外 | ヤーズフレックス配合錠                  |
| 院外 | ヤクバンテープ60mg                  |
| 採用 | 薬用炭「日医工」                     |
| 院外 | ユーエフティ配合カプセルT100             |
| 院外 | ユーゼル錠25mg                    |
| 用時 | ユービット錠100mg                  |
| 院外 | ユニシア配合錠HD                    |
| 院外 | ユニシア配合錠LD                    |
| 院外 | ユビデカレノン錠10mg「トーワ」            |
| 採用 | ユベラNソフトカプセル200mg             |
| 院外 | ユベラ軟膏                        |
| 院外 | ユリス錠0.5mg                    |
| 採用 | ユリス錠1mg                      |
| 院外 | ユリス錠2mg                      |
| 採用 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」            |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 採用 | ヨウ化カリウム「コザカイ・M」        |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-1号        |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-30号       |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-3号        |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-50号       |
| 用時 | ヨウ化ナトリウムカプセル-5号        |
| 採用 | ヨウ素「コザカイ・M」            |
| 用時 | ヨードカプセル-123            |
| 採用 | 複方ヨード・グリセリン「コザカイ・M」    |
| 用時 | タマガワヨードホルムガーゼ          |
| 院外 | ヨクイニンエキス散「コタロー」        |
| 院外 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」        |
| 採用 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)       |
| 院外 | クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒      |
| 採用 | ラキソベロン錠2.5mg           |
| 採用 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」     |
| 採用 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g       |
| 採用 | ラゲブリオ錠400mg            |
| 採用 | ラコールNF配合経腸用液           |
| 院外 | ラジカット内用懸濁液2.1%         |
| 院外 | ラシックス錠40mg             |
| 院外 | ラジレス錠150mg             |
| 用時 | ラストットSカプセル25mg         |
| 採用 | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 |
| 採用 | ラツーダ錠20mg              |
| 採用 | ラックビー微粒N               |
| 院外 | ラピフォートワイプ2.5%          |
| 採用 | ラフチジン錠10mg「トーワ」        |
| 採用 | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」    |
| 院外 | ラベプラゾールNa錠5mg「サワイ」     |
| 院外 | ラミクタール錠100mg           |
| 院外 | ラミシールクリーム1%            |
| 採用 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」       |
| 採用 | ラモトリギン錠25mg「トーワ」       |
| 用時 | ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」     |
| 院外 | ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」     |
| 採用 | ラリキシンドライシロップ小児用20%     |
| 院外 | ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」   |
| 採用 | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」   |
| 採用 | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」   |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 院外 | ランツジールコーワ錠30mg         |
| 院外 | リアルダ錠1200mg            |
| 採用 | リーバクト配合顆粒              |
| 院外 | リーバクト配合経口ゼリー           |
| 採用 | リーマス錠100               |
| 院外 | リーマス錠200               |
| 採用 | リオナ錠250mg              |
| 採用 | リオレサル錠5mg              |
| 採用 | リクシアナOD錠30mg           |
| 採用 | リクシアナOD錠60mg           |
| 院外 | リクシアナ錠15mg             |
| 院外 | リザトリプタンOD錠10mg「VTRS」   |
| 院外 | リザベンカプセル100mg          |
| 用時 | リザベン細粒10%              |
| 院外 | リスパダール錠1mg             |
| 採用 | リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」    |
| 採用 | リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」   |
| 院外 | リスミー錠1mg               |
| 院外 | リスモダンR錠150mg           |
| 院外 | リスモダンカプセル50mg          |
| 院外 | リズモンTG点眼液0.5%          |
| 採用 | リタリン錠10mg              |
| 採用 | リタロクス懸濁用配合顆粒           |
| 採用 | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)      |
| 院外 | リットフーロカプセル50mg         |
| 用時 | リティンパ耳科用250 $\mu$ gセット |
| 採用 | リドカインテープ18mg「NP」       |
| 採用 | リトドリン塩酸塩錠5mg「F」        |
| 院外 | リドメックスコーワクリーム0.3%      |
| 採用 | リドメックスコーワ軟膏0.3%        |
| 院外 | リドメックスコーワローション0.3%     |
| 用時 | リネゾリド錠600mg「サワイ」       |
| 採用 | リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」  |
| 採用 | リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」  |
| 採用 | リパクレオン顆粒300mg分包        |
| 院外 | リバスチグミンテープ13.5mg「ニプロ」  |
| 院外 | リバスチグミンテープ18mg「ニプロ」    |
| 採用 | リバスチグミンテープ4.5mg「ニプロ」   |
| 採用 | リバスチグミンテープ9mg「ニプロ」     |
| 院外 | リバゼブ配合錠HD              |

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 院外 | リバゼブ配合錠LD                    |
| 院外 | リバルエンLAパッチ25.92mg            |
| 院外 | リバルエンLAパッチ51.84mg            |
| 採用 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」        |
| 採用 | リフキシマ錠200mg                  |
| 院外 | リフヌア錠45mg                    |
| 院外 | リベルサス錠14mg                   |
| 採用 | リベルサス錠3mg                    |
| 院外 | リベルサス錠7mg                    |
| 採用 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用        |
| 採用 | リボトリール細粒0.1%                 |
| 採用 | リボトリール錠0.5mg                 |
| 採用 | リボフラビン酪酸エステル錠20mg「杏林」        |
| 院外 | リマチル錠100mg                   |
| 院外 | リマチル錠50mg                    |
| 採用 | リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」 |
| 院外 | リムパーザ錠100mg                  |
| 院外 | リムパーザ錠150mg                  |
| 院外 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)           |
| 採用 | リルゾール錠50mg「AA」               |
| 院外 | リレンザ                         |
| 院外 | リンヴォック錠15mg                  |
| 院外 | リンヴォック錠7.5mg                 |
| 院外 | リンゼス錠0.25mg                  |
| 院外 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏                |
| 院外 | リンデロン坐剤0.5mg                 |
| 院外 | リンデロン坐剤1.0mg                 |
| 採用 | リンデロンシロップ0.01%               |
| 採用 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%           |
| 採用 | リンデロン-Vクリーム0.12%             |
| 採用 | リンデロン-VGローション                |
| 採用 | リンデロン-V軟膏0.12%               |
| 院外 | リンデロン-Vローション                 |
| 院外 | リンラキサー錠125mg                 |
| 院外 | ルコナック爪外用液5%                  |
| 院外 | ルジオミール錠10mg                  |
| 院外 | ルジオミール錠25mg                  |
| 院外 | ルセフィ錠2.5mg                   |
| 院外 | ルセフィ錠5mg                     |
| 院外 | ルナベル配合錠LD                    |

|    |                        |
|----|------------------------|
| 院外 | ルナベル配合錠ULD             |
| 院外 | ルパフィン錠10mg             |
| 採用 | ルプキネスカプセル7.9mg         |
| 院外 | ルミガン点眼液0.03%           |
| 採用 | ルリクールVG軟膏0.12%         |
| 院外 | ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」     |
| 院外 | ルリコン軟膏1%               |
| 院外 | ルリッド錠150               |
| 院外 | レイボー錠100mg             |
| 院外 | レイボー錠50mg              |
| 院外 | レキサルティOD錠0.5mg         |
| 採用 | レキサルティOD錠1mg           |
| 院外 | レキソタン錠1                |
| 院外 | レキソタン錠2                |
| 院外 | レキソタン錠5                |
| 院外 | レキップCR錠8mg             |
| 院外 | レクタブル2mg注腸フォーム14回      |
| 院外 | レクチゾール錠25mg            |
| 院外 | レグテクト錠333mg            |
| 用時 | レグナイト錠300mg            |
| 院外 | レザルタス配合錠HD             |
| 院外 | レザルタス配合錠LD             |
| 院外 | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏      |
| 採用 | レスタミンコーワクリーム1%         |
| 院外 | レトロゾール錠2.5mg「トーワ」      |
| 採用 | レナジェル錠250mg            |
| 採用 | レナデックス錠4mg             |
| 採用 | レナリドミドカプセル5mg「FNK」     |
| 採用 | レパグリニド錠0.25mg「サワイ」     |
| 院外 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」      |
| 採用 | レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」      |
| 採用 | レバミピド錠100mg「EMEC」      |
| 用時 | レブラミドカプセル5mg           |
| 採用 | レベチラセタム錠250mg「トーワ」     |
| 採用 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」     |
| 院外 | レベチラセタムDS50%「トーワ」      |
| 用時 | レベトールカプセル200mg         |
| 院外 | レボカバステチン点眼液0.025%「サワイ」 |
| 採用 | レボカルニチンFF内用液10%「アメル」   |
| 採用 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」    |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 採用 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」    |
| 採用 | レボフロキサシン錠250mg「杏林」          |
| 採用 | レボフロキサシン錠500mg「杏林」          |
| 院外 | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」         |
| 院外 | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」         |
| 院外 | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」         |
| 採用 | レボレード錠12.5mg                |
| 院外 | レルパックス錠20mg                 |
| 院外 | レルベア100エリプタ14吸入用            |
| 院外 | レルベア100エリプタ30吸入用            |
| 院外 | レルベア200エリプタ14吸入用            |
| 採用 | レルベア200エリプタ30吸入用            |
| 院外 | レルミナ錠40mg                   |
| 用時 | レンビマカプセル10mg                |
| 用時 | レンビマカプセル4mg                 |
| 用時 | ロイケリン散10%                   |
| 院外 | ロイコン錠10mg                   |
| 院外 | ローコール錠20mg                  |
| 用時 | ローブレナ錠100mg                 |
| 院外 | ロキソニンパップ100mg               |
| 採用 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」(旧製品)    |
| 採用 | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」 |
| 採用 | ロケルマ懸濁用散分包10g               |
| 採用 | ロケルマ懸濁用散分包5g                |
| 院外 | ロコアテープ                      |
| 院外 | ロコイド軟膏0.1%                  |
| 院外 | ロコルナール錠100mg                |
| 採用 | ロサルタンK錠25mg「トーワ」            |
| 院外 | ロソーゼット配合錠HD                 |
| 院外 | ロソーゼット配合錠LD                 |
| 採用 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」        |
| 採用 | ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」          |
| 用時 | ロズリートレクカプセル100mg            |
| 用時 | ロズリートレクカプセル200mg            |
| 院外 | ロゼックスゲル0.75%                |
| 用時 | ロタテック内用液                    |
| 採用 | ロタリックス内用液                   |
| 採用 | ロドピン錠25mg                   |
| 院外 | ロナセンテープ20mg                 |
| 院外 | ロナセンテープ30mg                 |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 採用 | ロナセンテープ40mg             |
| 用時 | ロピニロールOD錠0.25mg「アメル」    |
| 院外 | ロピニロールOD錠1mg「アメル」       |
| 採用 | ロピニロール徐放錠2mg「KMP」       |
| 採用 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」    |
| 院外 | ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」 |
| 採用 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」        |
| 採用 | ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」      |
| 院外 | ロラメット錠1.0               |
| 院外 | ロルノキシカム錠4mg「KO」         |
| 院外 | ロレルコ錠250mg              |
| 院外 | ロンサーフ配合錠T15             |
| 院外 | ロンサーフ配合錠T20             |
| 採用 | ワーファリン錠0.5mg            |
| 採用 | ワーファリン錠1mg              |
| 用時 | ワコビタール坐剤30              |
| 院外 | ワントラム錠100mg             |